

BIBLIOTECA NAZ.  
Vittorio Emanuele III


LX1

B

5


NAPOLI


LXI. B. 57


















J. v. Gouwen fecit.

# HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES.

ANNEE MDCCI.

Avec les Memoires de Mathematique &  
de Physique, pour la même Année,

*Tirez des Registres de cette Academie.*



A AMSTERDAM,  
Chez GERARD KUYPER, Marchand  
Libraire à côté de la Maison de Ville.

M DCC VII.

*Avec Privilege de N. S. les Etats de Hollande & de West-Fr.*







A MONSIEUR  
SERRURIER

*Docteur en Médecine & Professeur en  
Philosophie, & en Mathématique,  
dans l'Academie d'Utrecht.*

**M**ONSIEUR,

J'AI crû ne pouvoir présenter  
la suite de l'*Histoire de l'Acade-  
mie Royale des Sciences*, à per-  
sonne, qui en pût mieux juger,  
que Vous. Il s'agit ici de matie-  
res de Physique, de Médecine  
& de Mathématique; & tout le  
monde fait avec quel soin vous  
avez touûjours étudié & cultivé  
ces Sciences. C'est aussi ce qui  
a fait que la fameuse Academie

\* 2 d'U-

## E P I T R E.

d'*Utrecht* n'a pas crû pouvoir trouver une personne plus propre à former l'esprit de la Jeunesse, & à la conduire dans l'étude de la Philosophie & des Mathématiques, que Vous, & elle commence à recueillir des fruits de vos travaux en voyant les progrès de ceux qui ont l'avantage d'étudier sous un Maître si éclairé & si habile. On avoit, comme le croient bien des gens, été un peu trop long-temps attaché aux idées des Scholastiques; qui, comme je l'entends dire aux Connaisseurs, ne servoient presque de rien ni à éclairer l'esprit, ni à le rendre plus étendu, & plus exact dans ses jugemens. Il étoit temps qu'on ouvrît les yeux, & que l'on donnât lieu à une meilleure-

## E P I T R E.

leure maniere d'instruire la Jeunesse, qui par une Philosophie plus éclairée, plus sûre & plus exacte, s'accoutume à examiner les choses, comme elle le doit, pour n'être pas trompée, à ne supposer rien que de clair, ou de bien prouvé, à ranger mieux ses pensées, à tirer des conséquences plus assurées, & à ne se rendre en matieres philosophiques, qu'aux marques incontestables de la Verité, c'est à dire qu'à l'évidence. Il auroit été fâcheux qu'une Academie aussi célèbre qu'*Utrecht* fut demeurée plus long-temps privée de semblables lumieres, & n'en eût pas profité, comme ont fait les autres Academies de ces Provinces, ou plutôt toutes celles de l'*Europe*,

## E P I T R E.

si l'on en excepte les lieux, où l'on a peur de l'augmentation des Sciences, pour des raisons qu'il n'est pas besoin que je dise. Aussi sont-ce des choses, qui sont au-dessus de ma portée; mais je ne fais que parler ici, sur ce que j'entends dire à tout le monde, & que rapporter le jugement des habiles gens. Je prie Dieu qu'il veuille conserver long-temps tous ceux qui sont capables de servir utilement le Public, & Vous en particulier, MONSIEUR, qui le faites avec tant d'honneur & de fruit. Je suis, avec respect,

MONSIEUR,

*Vôtre très-humble & très-  
obeïssant Serviteur.*

GERARD KUYPER.

# PRIVILEGIE.

**D**E Staten van Hollandt ende West-  
 Vrieslandt, *Doen te weten*, Alsoo Ons vertoont  
 is by GERRIT KUYPER, Boekverkooper tot  
 Amsteldam, hoe dat hy Suppliant besig was met groote  
 koste en veele moeyte te drukken seker Boek, genaamt  
*Historia Academia Regia Scientiarum Auctore J. B. du Ha-*  
*mel, & Histoire de l'Academie Royale des Sciences, avec les*  
*Memoires de Mathematique & de Physique, tirez des Re-*  
*gistres de cette Academie, commencee avec l'Année 1699.*  
 met alle de volgende Deelen, in soo veel Deelen, Taa-  
 len en Formate als de Suppliant sal goet vinden: Ende de  
 Suppliant beducht zynde dat sommige baatsoekende men-  
 schen, soo ras het Boek soude zyn in 't licht gebracht,  
 aanstonts souden trachten naar te drukken, ofte doen  
 drukken, tot groote schade van de Suppliant, Soo dan  
 omme daar inne te weesen gesecureert, soo keerd hy  
 Suppliant sich tot Ons, versoekende ten eynde Wy aan  
 hem gunstelyk geliefden te verleenen Oôtrooy omme het  
 voorsz. Boek, genaamt *Historia Academia Regia Scientia-*  
*rum Auctore J. B. du Hamel, & Histoire de l'Academie*  
*Royale des Sciences, avec les Memoires de Mathematique &*  
*de Physique, tirez des Registres de cette Academie, com-*  
*mencee avec l'Année 1699.* in sulken Formaat, en in soo  
 veel Deelen en Taalen, als hy den Suppliant sould goet  
 gevonden werden, voor den tyd van Vyftien eerst achter  
 een volgende Jaaten, alleen ende met uytfluytinge van  
 alle anderen binnen dese Provintie te mogen drukken,  
 doen drukken, ende verkopen; Ende op sodanige Poene  
 als Wy daar toe soude gelieven te statuëren; **SOO IS 'T**,  
 dat Wy de zaake en 't versoeck voorsz. overgemerkt heb-  
 bende, ende genegen wesende ter bede van den Suppliant,  
 uyt Onse regte wetenschap, Souveraine magt ende autho-  
 riteyt, den selven Suppliant geconsenteert, geaccordeert  
 ende geoôtroeyert hebben; consenteren, accorderen ende  
 oôtroyeren hem mits desen, dat hy gedurende den tyd  
 van Vyftien eerst agter een volgende Jaren, het voorsz.  
 Boek, genaamt *Historia Academia Regia Scientiarum Auc-*  
*tore J. B. du Hamel, & Histoire de l'Academie Royale des*  
*Sciences, avec les Memoires de Mathematique & de Physique,*  
*tirez des Registres de cette Academie, commencee avec l'An-*  
*née 1699.* binnen den voorschreven Onsen Landen alleen  
 sal mogen drukken, uytgeven ende verkopen; Verbieden-  
 de daarom allen ende een yegelyken, het selve Boek, in 't  
 geheel, ofte ten deel naar te drukken, ofte elders naar  
 gedrukt, binnen den selven Onsen Lande te brengen, uyt

## P R I V I L E G I E.

te geven, ofte te verkopen, op de verbeurte van alle de naargedrukte, ingebragte, ofte verkogte Exemplaren, ende een boete van drie hondert guldens daar-en-boven te verbeuren, te appliceren een derde part voor den Officier, die de Calange doen sal, een derde part voor den Armen der plaarse daar het Casus voorvallen sal, ende het restteerende derde part voor den Suppliant. Alles in dien verstande, dat Wy den Suppliant met desen Onsen Oetroye alleen willende gratificeren, tot verhoedinge van syns schade, door het naardrukken van het voorschreve Boek, daar door in gecnigen deele verstaan, den inhouden van dien te autoriseeren, ofte te advoueren, ende veel min deselve onder Onse Protectie ende bescherminge eenig meerder Credit, Aansien, ofte Reputatie te geven; nemaar den Suppliant, in cas daar inne iets onbehoorlyks zoude mogen influenceeren, alle het selve tot zynen laste sal gehouden wesen te verantwoorden; tot dien eynde wel expresselyk begerende, dat by aldiën hy desen Onsen Oetroye voor het selve sal willen stellen, daar van geen geabrevieerde, ofte gecontraheerde mentie sal mogen maken, nemaar gehouden sal wesen het selve Oetroy, in 't geheel, en sonder eenige Omisfie daar voor te drukken, ofte te doen drukken, ende dat hy gehouden zal zyn een Exemplaar van het voorschreve Boek, gebonden en wel geconditioneert, te brengen in de Biblioteecq van Onse Universiteyt tot Leyden, ende daar van behoorlyk te doen blyken. Alles op pœne van het effect van dien te verliefen. Ende ten eynde den Suppliant desen Onsen Consente ende Oetroye mogen genieten als naar behoren; Lasten Wy allen ende een yegelyken, dat zy den Suppliant van den inhoute van desen, doen, laten ende gedogen, rustelyk, vredelyk ende volkomentlyk genieten ende gebruyken; cesserende alle belet en wederleggen ter contrarie. Gedaan in den Hage, onder Onsen grooten Zegele hier aan gehangen, op den twee-en-twintigsten January, in 't Jaar Onses Heeren ende Zaligmakers seventien-hondert en ses.

A. H E I N S I U S.

Ter Ordonnantie van de Staten

SIMON van BEAUMONT.

T A-

# T A B L E

## P O U R

### L' H I S T O I R E.

---

#### P H Y S I Q U E G E N E R A L E.

<i>Sur le Phosphore du Barometre.</i>	Pag. 1
<i>Sur la Mesure &amp; sur la Pesanteur de l'Eau.</i>	10
<i>Sur la Declinaison de l'Aiman.</i>	11
<i>Sur le Flux &amp; le Reflux.</i>	14
<i>Sur la Continuation du Mouvement.</i>	17
<i>Diverses Observations de Physique générale.</i>	19

---

#### A N A T O M I E.

<i>Sur un Embryon.</i>	23
<i>Sur un Fœtus extraordinaire.</i>	27
<i>Sur une Mort subite.</i>	32
<i>Sur une autre mort subite.</i>	35
<i>Sur une autre Mort subite après une Medecine de précaution.</i>	38
<i>Sur une nouvelle route des Urines.</i>	43
<i>Sur la Circulation du sang dans le Fœtus.</i>	45
<i>Sur la Génération de l'Homme par des œufs.</i>	48
<i>Sur la Circulation du sang dans les Poissons.</i>	57
<i>Diverses Observations Anatomiques.</i>	64

# T A B L E

---

## C H I M I E.

<i>Analyses de la Coloquinte, du Jalap, de la Gomme-gutte &amp; de l'Ellebore noir.</i>	72
<i>Sur les Eaux de Passy.</i>	78
<i>Sur les Fermentations.</i>	83
<i>Sur les Analyses des Plantes.</i>	86
<i>Sur les Sels Volatils des Plantes.</i>	88
<i>Diverses Observations Chimiques.</i>	90

---

## B O T A N I Q U E.

<i>Sur la fécondité des Plantes.</i>	94
<i>Sur l'Yquetaya.</i>	97

---

## G E O M E T R I E.

<i>Sur la Quadrature de la Lunule d'Hippocrate de Chio.</i>	98
<i>Sur les Forces centrales.</i>	100
<i>Sur la Rectification des Courbes.</i>	104
<i>Sur la Resolution d'un Problème proposé dans le Journal de Trevoux, ou, sur une propriété nouvelle de la Parabole.</i>	106

---

## A S T R O N O M I E.

<i>Methode pour observer la difference de Declinaison, &amp; d'Ascension droite de deux Astres peu éloignez.</i>	113
<i>Sur</i>	



## DE L'HISTOIRE.

<i>Sur un nouveau Reticule.</i>	115
<i>Sur la Meridienne.</i>	119
<i>Sur un nouvel Astrolabe universel.</i>	122
<i>Sur les Taches du Soleil.</i>	127
<i>Sur le Calendrier.</i>	134
<i>Diverses Observations Astronomiques.</i>	139

---

## GNOMONIQUE. 146

---

## GEOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE.

<i>Sur un projet d'un nouveau Portulan pour la Méditerranée.</i>	152
--	-----

---

## ACOUSTIQUE.

<i>Sur un nouveau Système de Musique.</i>	155
---	-----

---

## MECHANIQUE.

<i>Sur la position de l'Axe des Moulins à vent à l'égard du vent.</i>	175
<i>Machines approuvées par l'Académie des Sciences en 1701.</i>	180

# T A B L E

## P O U R L E S

### M E M O I R E S.

**N**ouveau Phosphore, Par M. BERNOULLI Professeur à Groningue. *Extrait d'une de ses Lettres écrite de Groningue le 6. Novembre 1700.* Pag. 1

Observations sur l'eau de pluie qui est tombée à l'Observatoire Royal pendant toute l'année 1700. avec quelques remarques sur le Thermometre & sur le Barometre, Par M. DE LA HIRE. 12

Observations Analytiques de la Coloquinthe, Par M. BOULDUK. 15

La Quadrature absolue d'une infinité de portions moyennes, tant de la Lunule d'Hippocrate de Chio, que d'une autre nouvelle espece, Par M. LE MARQUIS DE L'HOPITAL. 22

Autre Regle générale des Forces Centrales, avec une maniere d'en deduire & d'en trouver une infinité d'autres à la fois, dépendemment & indépendemment des Rayons Osculateurs, qu'on va trouver aussi d'une maniere infiniment générale, Par M. VARIGNON 26

Observations des Taches du Soleil qui ont paru vers les derniers jours du mois de Decembre de l'année dernière 1700. Par M. DE LA HIRE. 50

Observations sur le Rafinage de l'Argent, Par M. HOMBERG. 52

Re-

# TABLE DES MEMOIRES.

<i>Remarques sur l'Eclipse de Lune arrivée le 22. Fevrier 1701. Par M. DE LA HIRE.</i>	57
<i>Observation d'Aldebaram caché par la Lune, à Marseille le 26. Fevrier 1701. au soir.</i>	60
<i>Remarques sur une Comete observée à Pekin le mois de Fevrier de l'année 1699. Par LE P. DE FONTENAY, de la Compagnie de Jesus.</i>	ibid.
<i>Comparaison des Observations de la Comete de 1699. faites à la Chine par le R. P. Fontenay, rapportées à l'Academie par le R. P. Gouye le 12. Mars 1701. avec celles qui en furent faites à l'Observatoire Royal de Paris, Par MRS. CASSINI &amp; MARALDI.</i>	63
<i>Description des quatre Etoiles proche du Cercle Polaire, avec lesquelles on comença de voir cette Comete à Paris.</i>	74
<i>Observation de la conjonction de la Lune avec l'œil du Taureau Aldebaram, le 19. Août 1699. Par M. CASSINI.</i>	75
<i>Observation des passages de la Lune &amp; de l'œil austral du Taureau par le Meridien, le 18. &amp; le 19. Août 1699.</i>	77
<i>Observations d'Aldebaram joint à la Lune, faites à Marseille &amp; à Bologne, rapportées à notre figure.</i>	80
<i>Observation de l'Eclipse de Lune du 22 Fevrier 1701.</i>	81
<i>Comparaison des Phases principales de l'Eclipse de Lune du 22. Fevrier de cette année 1701. observées en diverses Villes d'Europe, rapportées à l'Academie le 25. Juin, Par M. CASSINI.</i>	86
<i>Eclipsis Lunæ, Anno 1701. die 22 &amp; 27. Februarii vesperi &amp; mane observata Berolini, à Godfido Kirchio.</i>	91
	Lu-

# T A B L E

Lunæ Eclipsis partialis Norimbergæ observata, anno 1701. die 22. Februarii à J. P. Wur- zelbaur.	96
Taches dans le Soleil observées le 29. Mars 1701. Par Mrs. CASSINI & MARALDI à Mont- pellier, envoyé à M. l'Abbé Bignon, & rap- porté à l'Academie le 9. Avril.	101
Comparaison de diverses Observations de l'Eclip- se du Soleil du 23. Septembre 1699. faites en diverses Villes d'Europe.	103
Differences des Longitudes de plusieurs Villes de la France, tirées des Observations de l'Eclip- se du Soleil du 12. Juillet 1684.	112
Observations sur un Fœtus humain monstrueux, Par M. LITRE.	115
Observations sur quelques effets des Fermenta- tions, Par M. HOMBERG.	124
Methodes générales pour trouver la difference en Declinaison & en Ascension droite de deux Af- tres qui sont peu éloignez l'un de l'autre, en se servant du Micrometre ordinaire, Par M. DE LA HIRE.	130
Observations Analytiques du Jalap, Par M. BOULDU.	139
Observations sur les Ovaires & les Trompes d'u- ne femme, & sur un Fœtus trouvé dans l'un de ses Ovaires, Par M. LITRE.	143
Observations sur les Analyses des Plantes, Par M. HOMBERG.	148
Construction & usage d'un nouveau Reticule pour les Observations des Eclipses du Soleil & de la Lune, & pour servir de Micrometre, Par M. DE LA HIRE.	154
Remarques sur la nature de la Gomme-gutte, & ses différentes Analyses, Par M. BOULDU.	172
	Let-

# DES MEMOIRES.

- Lettre de M. Bernoulli Professeur à Groningue, touchant son nouveau Phosphore.* 178
- Observations d'Anatomie & de Chirurgie sur plusieurs especes d'Hydropisie, Par M. DU VERNEY le jeune.* 193
- Methode pour la rectification des Lignes Courbes par les Tangentes, Par M. CARRE.* 207
- Rectification de la Cycloïde, Par M. CARRE.* 212
- Remarques sur la mesure & sur la pesanteur de l'Eau, Par M. DE LA HIRE.* 221
- De la Meridienne de l'Observatoire Royal prolongée jusqu'aux Pirenées; Par M. CASSINI.* 223
- Observations Anatomiques, faites sur des Ovaires de Vaches & de Brebis, Par M. DU VERNEY le jeune.* 240
- Observations sur les effets de l'Ypecacuanba, Par M. BOULDU.* 249
- Projet d'un Système touchant les passages de la Boisson & des Urines, Par M. MORIN.* 258
- Dissertation sur une Plante nommée dans le Bresil, Yquetaya, laquelle sert de correctif au Séné, & sur la préférence que nous devons donner aux Plantes de nôtre pais, pardessus les Plantes étrangères, Par M. MARCHANT.* 275
- Observations sur une Comete, faites à Pau le 28. & le 31. d'Octobre par le P. Pallu de la Compagnie de Jesus, & rapportées à l'Academie, Par M. DE LA HIRE.* 287
- Observations sur les Sels volatils des Plantes, Par M. HOMBERG.* 288
- Memoire sur la Circulation du sang des Poissons qui ont des Ouies, & sur leur respiration, Par M. DU VERNEY l'aîné.* 294
- Second Memoire sur la fécondité des Plantes. Con-*  
*jec-*

# T A B L E

<i>jectures sur ce sujet, Par M. DODART.</i>	315
<i>Construction d'un nouvel Astrolabe universel, Par M. DE LA HIRE.</i>	336
<i>Des Taches observées dans le Soleil au mois de Novembre de l'année 1700 au mois de Mai, à la fin d'Octobre, &amp; au mois de Novembre de cette année 1701. Par M. CASSINI, le Fils.</i>	343
<i>Solution du Problème proposé aux Géometres dans les Memoires de Trevoux, des mois de Septembre &amp; Octobre 1701. Par M. CARRE.</i>	351
<i>Observations sur les Hernies, Par M. MERY.</i>	356
<i>Essay d'une Methode pour trouver les Rayons des Developpées, les Tangentes, les Quadratures, &amp; les Rectifications de plusieurs Courbes, sans y supposer aucune grandeur infiniment petite, Par M. DE TSCHIRNHAUS.</i>	380
<i>Observations sur le Corps d'une Femme grosse de huit mois de son premier Enfant, morte subitement d'une chute, Par M. LITTRE.</i>	383
<i>Observation de l'Eclipse de l'Etoile Aldebaram ou Oeil du Taureau par la Lune, à l'Observatoire le 23. Septembre au matin 1701. Par M. DE LA HIRE.</i>	388
<i>Système général des Intervalles des Sons, &amp; son application à tous les Systèmes &amp; à tous les Instrumens de Musique, Par M. SAUVEUR. Preface.</i>	390
<i>SECTION I. Du Rapport des Sons, &amp; des Intervalles.</i>	394
<i>SECT. II. Explication de la premiere partie des Tables du Système général des Intervalles, &amp; des Raports des Sons.</i>	401
<i>SECT. III. Explication des Tables du Système gé-</i>	

# DES MEMOIRES.

<i>général des Intervalles &amp; des Raports des Sons.</i>	405
SECT. IV. <i>Division &amp; usage de l'Echometre général.</i>	415
SECT. V. <i>Application du Système &amp; de l'Echometre général à tous les Systèmes de Musique.</i>	422
SECT. VI. <i>Application du Système &amp; de l'Echometre général aux Voix &amp; aux Instrumens de Musique.</i>	433
SECT. VII. <i>Application du Système général au Plainchant.</i>	442
SECT. VIII. <i>Application du Système général à la Musique.</i>	449
SECT. IX. <i>Des Sons harmoniques.</i>	459
SECT. X. <i>Application du Système général à la Trompette Marine, au Cor de chasse, &amp; aux grands Instrumens à vent.</i>	468
SECT. XI. <i>Des Intervalles reciproques des Sons d'un Système &amp; d'un Instrument de Musique.</i>	469
SECT. XII. <i>Maniere de trouver le Son fixe.</i>	473
<i>Addition à la Section VI.</i>	477
<i>De la Correction Gregorienne des Mois Lunaires Ecclesiastiques, Par M. CASSINI.</i>	483

APPROBATION  
DE M<sup>R</sup>. ANDRY, CONSEILLER  
*Lecteur Professeur Royal, Docteur  
Regent de la Faculté de Me-  
decine de Paris.*

**J'**Ai examiné par ordre de Monseigneur  
le Chancelier, l'*Histoire de l'Academie  
Royale des Sciences, année 1701. avec les  
Memoires de Mathematique & de Physique  
pour la même année, tirez des Registres de  
cette Academie.* Tout ce qui est contenu  
dans cette Histoire & dans ces Memoires  
m'a paru digne & de l'Historien, & de  
l'Academie, & du Public. Fait à Paris ce  
8. Novembre 1703.

ANDRY.

---

*Avis au Relieur.*

Le Relieur prendra garde que le papier qui est à côté des Figures doit être conservé pour faire déborder les Figures hors du Livre.

---

*Den Boekbinder zy gewaarschout het papier ter zyde de  
Figure niet af te snyden : maar zodanig in te setten,  
dat deselve buiten het Boek uitslaan.*

H I S-



# HISTOIRE

## DE

### L'ACADEMIE ROYALE

### DES SCIENCES.

ANNE'E M. DCCI.

## PHYSIQUE.

~~~~~

## PHYSIQUE GENERALE.

*Sur le Phosphore du Barometre.*



ELON le Système que M. Bernoulli \* Professeur en Mathematique à Groningue, s'étoit fait de la Lumiere du Barometre, † elle ne devoit point paroître, lorsqu'il se formoit sur la surface du Mercure une Pellicule, ou une Poussiere fine, qui rompoit l'impetuosit  avec laquelle la matiere

HIST. 1701. A sub-

\* Voyez les Memoires, pag. 1. & 178.

† V. l'Hist. de 1703. pag. 7.

subtile, ou du premier Element, sortoit des pores étroits de ce Mineral fortement agité par les secousses qu'on lui donnoit. En ce cas cette matiere subtile ne choquoit plus avec assez de force une autre matiere plus grossiere, ou du second Element qui entroit par les pores du verre dans le haut du tuyau, quand le vuide en étoit augmenté précisément dans les instans où le Mercure secoué descendoit au dessous du point de son équilibre. Aussi n'étoit-ce par les observations de M. *Bernoulli*, que dans ces momens de la descente, où l'on voioit la lumiere.

De plus, il étoit nécessaire que le vuide du Barometre fût le plus parfait qu'il pût être; car il falloit que le choc de la matiere du premier Element contre celle du second, ne fût point affoibli par le mélange de l'air, qui étant en comparaison d'elles fort grossier, & fort lent, auroit fait l'effet d'un sac de laine qui reçoit un coup de Canon.

La pellicule devoit se former des impuretez, & des saletez du Mercure, & non seulement de celles qu'il pouvoit contenir en lui-même par le mélange de quelque matiere heterogene, soit metallique ou autre, mais encore de celles qu'il contractoit subitement ou étant simplement exposé à l'air, ou en passant par l'air, lorsqu'on le versoit dans le tuyau pour la construction ordinaire du Barometre.

M. *Bernoulli* avoit observé qu'une seule goutte de Mercure bien nette, tombant sur une superficie de Mercure bien nette aussi, y laissoit une tache, qui ne pouvoit venir que des impuretez qu'elle avoit amassées par son passage dans l'air, quoique si prompt, & si court.

L'Au-

L'Auteur du Systême exigeoit donc , 1°. Que le Mercure fût extrêmement pur. 2°. Que le Barometre fût construit de maniere que le Mercure y entrât sans traverser l'air. 3°. Que le vuide du haut du tuyau fût aussi parfait qu'il le pût être.

Toutes ces conditions ayant été exactement observées dans les Experiences de l'Academie, plusieurs Barometres ne réussirent point. Quelques uns donnerent de la lumiere , mais qui s'affoiblissoit d'une secousse à l'autre , ce qui ne répondoit ni aux observations de M. *Bernoulli* , dont les Barometres étoient des Phosphores toujours égaux , ni à son Systême qui demandoit qu'ils le fussent , puisque les pores du Mercure devoient toujours renfermer une matiere du premier Element , qui devoit toujours rencontrer au haut du tuyau celle du second. De simples phioles où l'on avoit mis du Mercure , car elles devoient faire le même effet que des tuyaux de Barometre & étoient plus commodes , ayant été ensuite bien vidées d'air , & bien secouées , ou ne furent point lumineuses , ou le furent moins qu'elles ne devoient l'être selon M. *Bernoulli*.

D'ailleurs , des Barometres anciennement faits , & sans toutes ces précautions , rendoient beaucoup de lumiere , mais à la verité , incomparablement plus dans un temps que dans un autre.

Sur cette contrariété , ou du moins sur cette extrême difference des Experiences de *Groningue* , & de celles de *Paris* , que l'on comptoit pour également vraies , & sur toutes ces biffareries apparentes , auxquelles les Observateurs de la Nature sont trop accoutumés pour s'en

rebuter, on soupçonna que le Mercure dont M. *Bernoulli* se servoit, & celui des Barometres luisans de *Paris*, devoit avoir quelque chose de particulier, & ressembler par quelque accident étranger à du Mercure que l'on auroit rendu lumineux en y mêlant, comme on l'a fait quelquefois, du Phosphore liquide.

Tout Mercure, ainsi que tout or ou tout argent, de quelque endroit du monde qu'il vienne, est parfaitement semblable, pourvu qu'il soit pur, & sans mélange, & M. *Homberg* jugeoit que puisque dans des experiences faites de la même maniere, un Mercure étoit lumineux, & l'autre non, l'un des deux étoit mêlé.

Il ajoûtoit que souvent pour nettoyer du Mercure il s'étoit servi de la Chaux vive préféablement à la limaille de fer, qu'alors le Mercure qui s'élevant dans la distillation, s'étoit criblé au travers de cette matiere, pouvoit en avoir emporté des parties capables par leur extrême délicatesse de se loger dans ses interstices; & que comme la chaux vive retient toujours quelques particules ignées, il étoit possible que ces particules agitées dans un lieu vuide d'air, où elles nageoient librement, & sans être étouffées par aucune matiere grossiere, produisissent cet éclat qui frapoit nos yeux; & en effet plusieurs Barometres qu'il avoit faits d'un Mercure ainsi nettoyé, étoient lumineux, & entre autres celui de M. l'Abbé *Bignon*.

M. *Homberg* ne donnoit cette idée que pour la plus legere de toutes les conjectures, mais il appuyoit davantage sur le peu de nécessité des trois conditions que prescrivait M. *Bernoulli*.

Car 1°. De ce que *M. Bernoulli* rapportoit lui-même, on en pouvoit conclurre que son Mercure n'étoit nullement pur. Il disoit qu'étant exposé à l'air, il se couvroit aussi-tôt d'une pellicule, & même qu'étant bien nettoyé, il se formoit une tache sur sa superficie, quand on y versoit d'enhaut une goutte du même Mercure. Or *M. Homberg* fit voir à la Compagnie que cela n'arrivoit point à du Mercure bien purgé de toute matiere metallique étrangere.

2°. Dans les Barometres lumineux anciennement faits, le Mercure y étoit entré à l'ordinaire en traversant l'air, & en s'y éparpillant.

3°. Une des manieres dont *M. Bernoulli* avoit fait un Barometre lumineux, étoit qu'il avoit renfermé dans la Machine Pneumatique un tuyau rempli seulement d'air, & qui par son bout ouvert trempoit le moins qu'il étoit possible dans un vaisseau plein de Mercure. Il avoit ensuite tiré l'air du Recipient de la Machine, & celui qui étoit contenu dans le tuyau de Barometre, étoit sorti en même temps, en soulevant par la force de son ressort le tuyau où il étoit enfermé, & en se coulant entre l'extrémité soulevée de ce tuyau, & la surface du Mercure; car le ressort de cet air commençoit à jouer dès qu'il n'étoit plus comprimé & contraint par tout le poids de l'air qui remplissoit le reste du Recipient. Mais comme sur la fin de l'operation, l'air qui restoit dans le tuyau étoit trop rarefié & trop foible pour le pouvoir soulever, & en surmonter la pesanteur, il n'en sortoit plus, quoiqu'il y eût encore. Après cela on laissoit rentrer l'air

l'air dans la Machine, & son poids élevoit le Mercure dans le tuyau du Barometre, mais moins haut qu'à l'ordinaire, parce qu'il y reste par cette construction plus d'air que par les autres. Cependant M. *Bernoulli* avoit vu de la Lumiere à ce Barometre; & M. *Homberg* en tiroit cette conséquence, qu'il n'étoit donc pas si necessaire que le vuide du Barometre fût bien parfait.

On fit savoir à M. *Bernoulli* le succès des experiences de l'Academie, & les Remarques de M. *Homberg*, & quelque temps après on reçût de lui avec plaisir des Lettres pleines d'observations nouvelles, & de nouvelles preuves de son Systeme.

Il soutenoit toujours que le Mercure le plus pur est le meilleur pour le Phosphore du Barometre; il avoit trouvé le secret de le purifier si parfaitement, que même étant exposé à l'air, & fortement agité, il ne se troubloit plus. Ce secret est fort simple, & ne consiste qu'à faire des lotions du Mercure avec de l'eau ou de l'esprit de vin, & à les réiterer jusqu'à ce que ces liqueurs ne se noircissent plus, après quoi on seche bien le Mercure, en le faisant passer plusieurs fois par un linge bien net. L'esprit de vin le nettoye plus promptement que l'eau.

Le Phosphore fait d'un Mercure ainsi préparé étoit beaucoup plus beau que les autres, il jettoit une lumiere toujours égale, & M. *Bernoulli* assûroit que dans un semblable Phosphore qu'il avoit depuis un an, & que l'on peut aisément croire qu'il avoit souvent éprouvé, il n'avoit encore apperçû nulle diminution d'éclat.

Comme pour répondre au soupçon qu'on avoit

avoit eu que M. *Bernoulli* n'avoit employé que le même Mercure, qui par quelque accident particulier avoit toujours eu le même privilege de produire de la lumiere, il en avoit employé de cinq ou six sortes qui venoient de differens endroits; il trouva que le secret des lotions rendoit lumineux des Mercures, qui sans cela ne-le pouvoient devenir, de quelque maniere que l'on construisit les Barometres. Il eut un Mercure entre autres, qu'il soupçonna de contenir quelque matiere huileuse, parce qu'à l'examiner de près, il ne paroissoit pas assez fluide, & il ne put effectivement le reduire à devenir Phosphore, qu'à force de lotions d'esprit de vin. Il ne manqua pas de juger que les Mercures qui n'avoient pas réussi à l'Academie étoient de la même nature, ou en approchoient fort. Mais il se tenoit si sûr de ses lotions qu'il demanda qu'on lui envoiât ces Mercures avec toutes les precautions qu'on voudroit, & s'offrit de les renvoyer lumineux. La confiance qu'on eut à sa parole empêcha l'execution de ce qu'il proposoit.

Puisque le Mercure nettoyé à la maniere de M. *Bernoulli* faisoit un Phosphore qui ne s'affoiblissoit point, du moins pendant l'espace d'une année, on n'en pouvoit plus rapporter la cause à des particules ignées de Chaux vive, qui apparemment se seroient épuisées par le grand nombre de secousses faites pendant un si long-temps; car la matiere ignée ne demeureroit pas tout ce temps-là unie à la Chaux vive, & quand elle s'en seroit une fois séparée, elle s'envoleroit sans peine au travers des pores du verre. Et d'ailleurs ces particules ignées ne devroient pas moins s'enflammer & luire lorsque

### 8 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

le Mercure monte dans les secouffes que lorsqu'il descend, puisque dans ces deux mouvemens contraires, elles flotent également sur sa superficie, & ont une égale vitesse. Mais dans la supposition du choc de la matiere du premier Element contre celle du second, on voit aisément & que le Phosphore doit être perpétuel, puisque le Mercure ne fait que prêter ses pores à une matiere qui remplace toujours celle qui en est sortie, & que la lumiere ne doit paroître que dans la descente du Mercure, puisque ce n'est qu'alors qu'il se forme un plus grand vuide que la matiere du premier Element contenue dans les pores du Mercure, & celle du second venue de dehors le tuyau, sont obligées de remplir.

Il est vrai que la Pellicule, que M. *Bernoulli* avoit d'abord imaginée comme un obstacle à la sortie impetueuse de la matiere subtile, ne paroît plus guere entrer dans ce Systême, & qu'il suffit pour empêcher la lumiere que les interstices du Mercure occupez en partie & embarrassez de quelque matiere étrangere qui ne s'en dégage pas facilement, contiennent trop peu de matiere subtile. Aussi la Pellicule fit-elle toujours de la peine à l'Academie; mais vraie ou non, on lui a toujours l'obligation d'avoir été la premiere pièce de l'ingenieux Systême de M. *Bernoulli*, & de l'avoir conduit à tout le reste.

Il éprouva que le Mercure bien nettoyé rendoit de la lumiere, même dans une phiole pleine d'air, mais, à la verité, une lumiere moins vive, & interrompue, que l'on ne voyoit qu'en forme d'étincelles séparées, qui naissoient & perissoient dans le même instant. Il est clair, se-



selon l'idée de *M. Bernoulli*, que l'air par lui-même rompt le choc de la matière du premier Element contre celle du second, c'est-à-dire qu'il empêche la lumière; & lors qu'il ne fait que l'affoiblir, c'est que la grande quantité de matière subtile qui sort du Mercure bien pur, repare en partie la résistance de l'air. Sur cet exemple, on peut croire que l'air où nous vivons est un obstacle à l'effusion de la lumière du Soleil, mais que cet obstacle est pour la plus grande partie surmonté & par la grande abondance de la matière subtile, & par l'extrême rapidité que le Soleil lui imprime.

Par là, s'expliquent sans peine les Baromètres qui n'ont pas laissé d'être lumineux, quoi que le vuide n'en fût pas parfait. Par là aussi il est visible qu'en laissant rentrer un peu d'air dans un des meilleurs Phosphores de cette espèce, il doit s'affoiblir d'autant.

Et non seulement l'air affoiblit ces Phosphores par lui-même, mais souvent encore par l'humidité qu'il porte avec lui. Toutes ces lumières, qui sont, pour ainsi dire, artificielles, sont extrêmement délicates. Il n'est pas sûr qu'en maniant une phiole, la sueur de la main ne passe, quoi qu'en très-petite quantité, au travers les jointures du bouchon, & ne nuise à la lumière. On ne peut trop avertir ceux qui feront ces expériences, d'être scrupuleux, déliés, & en quelque sorte superstitieux.

*M. Bernoulli* rapporta un exemple remarquable de l'extrême délicatesse de ces Phosphores. Il avoit une Phiole qui luisoit parfaitement & également depuis six semaines. Une miette du liège qui la bouchoit, s'étoit détachée, & étoit tombée sur la surface du Mercure, où

elle nageoit. *M. Bernoulli* avec un verre convexe qu'il exposa au Soleil, & dont il fit tomber le foier sur cette miette de liege, la brûla, & le peu de fumée qui en sortit diminua très-considérablement & sans retour la vivacité du Phosphore, où il n'étoit arrivé nul autre changement. Cette pureté dont la lumière a besoin fut souillée.

Le Mercure n'a aucun autre don pour la production de la lumière que la petitesse de ses pores, où la matière subtile peut seule être admise. Toute autre liqueur dont la pesanteur ferreroit autant les parties, & rendroit les pores aussi petits, seroit aussi propre à être Phosphore. Mais comme nous n'en avons aucune qui soit aussi pesante, le Mercure demeurera apparemment le seul Phosphore de son espèce, & en même temps il sera le premier de tous, si selon les espérances de *M. Bernoulli*, & même selon plusieurs apparences physiques, il est inalterable, & perpétuel; ce sera un Phosphore semblable en quelque sorte aux Phosphores célestes.

## SUR LA MESURE

### ET SUR LA PESANTEUR DE L'EAU.

\* QUAND on a des Eaux à élever, à conduire, à partager, enfin quand on a quelque grand travail à faire sur des Eaux, il est important d'en connoître exactement la mesure

\* Voyez les Mémoires, p. 221.

sure & la pesanteur, & d'autant plus important que le travail est plus considerable; car l'erreur de la premiere mesure sur laquelle on se feroit réglé, se multiplieroit davantage. Mais c'est un soin plus pénible qu'on ne croiroit que de mesurer ou de peser avec toute la précision necessaire, un ponce d'eau, ou une Pinte; il faut descendre à des minuties très-fatigantes, & dont on ne peut esperer guere d'honneur, & ceux qui sont capables de choses plus éclatantes, ont du merite à ne pas dédaigner ces sortes de recherches. On verra dans le Mémoire de M. de la Hire quel est son Calcul sur l'Eau, & de quelle maniere il s'y est pris.

---

## S U R L A D E C L I N A I S O N D E L' A I M A N.

**M**onsieur *Halley*, savant *Anglois*, ayant fait un Voyage aux *Terres Australes*, en rapporta, entre autres richesses philosophiques, un Système général de la Déclinaison de l'Aimant.

Dans cette grande Mer qui sépare l'*Europe*, & l'*Afrique* d'avec l'*Amerique*, il trouva en quatre endroits differens que l'Aiguille ne déclinoit point.

1. à 18 degrez  $\frac{1}{2}$  de Longitude Occidentale,  
à 2 degrez de Latitude Septentrionale.

## 12 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

2. à  $4^{\circ}$  de Long. Oc. à  $37^{\circ} \frac{1}{2}$  de Lat. Mer.

3. à  $10^{\circ} \frac{1}{2}$  de Long. Oc. à  $16^{\circ} \frac{3}{4}$  de Lat. Mer.

4. à  $64^{\circ}$  de Long. Oc. à  $31^{\circ} \frac{1}{2}$  de Lat. Sep.

Il faut remarquer que M. *Halley* compte les Longitudes du Meridien de *Londres*.

Ayant ces quatre points il conçut qu'ils pouvoient être compris dans une Ligne courbe, qui embrasseroit le Globe terrestre, sous laquelle l'Aiguille n'auroit point de déclinaison, & qui auroit à un de ses côtez les lieux où la déclinaison seroit orientale, & à l'autre ceux où elle seroit occidentale.

Une idée si nouvelle, & si agréable à l'Esprit par l'ordre qu'elle établit dans une matiere, où jusques là il en paroissoit assez peu, seroit encore extrêmement utile pour les navigations de long cours, où il est fort incommode d'être dans une défiance perpétuelle de l'Aiguille aimantée, & de n'oser entièrement s'assurer sur les Calculs qui en dépendent.

M. *Halley* eut la satisfaction de voir, que toutes ses autres observations pendant son voyage, convenoient à son idée; c'est-à-dire que la déclinaison étoit ou orientale, ou occidentale, & plus ou moins grande selon que les lieux étoient d'un côté ou de l'autre de cette Ligne courbe exempte de déclinaison, & qu'ils en étoient plus ou moins éloignez.

Mais M. *Cassini* le fils, qui en travaillant dans les Provinces Meridionales de la France à la prolongation de la Meridienne, avoit en même temps observé les différentes déclinaisons de l'Aiman en differens lieux, ne les trouva pas telles qu'il eût dû les trouver en suivant M. *Halley*, & en prolongeant dans les Terres

&

& dans la Méditerranée les Lignes que l'Auteur *Anglois* avoit tracées sur l'Océan par ses observations. La déclinaison dans le Golphe de *Lyon*, par exemple, est plus grande de deux degrez que ne la donnoit cette nouvelle hypothese. Mais peut-être de l'Océan aux grands Continents, & aux Mers qui y sont enfermées, les regles de la déclinaison changent-elles, & ce seroit une chose à observer avec soin que ce défaut d'uniformité, & la mesure de cette variation dans le Système de *M. Halley*, supposé que ce soit d'ailleurs un Système. Il est toujours certain, qu'il faut, autant que la nature le permettra, favoriser une si belle découverte, & n'y renoncer que le plus tard qu'on pourra.

Si elle est vraie, la Ligne sans déclinaison sera mobile sur la surface de la Terre, puisqu'il y a dans les mêmes lieux la déclinaison change de 11 à 12 minutes par an. Mais aussi comme cette variation paroît devoir être renfermée entre des bornes, car pendant tout le temps que l'on a connu la direction de l'Aiguille vers le Nort, sans connoître sa déclinaison, elle a assez peu varié pour laisser les Observateurs dans l'erreur de la croire dirigée précisément au Nort, il y a apparence que le mouvement de la Ligne sans déclinaison de *M. Halley* sera compris entre des especes de Tropiques.

# S U R L E F L U X E T L E R E F L U X.

**Q**Uoique le Flux & le Reflux ait passé pour une merveille impénétrable à l'Esprit humain, peut-être la Cause en est-elle découverte, & tout l'honneur en seroit dû à *M. Descartes*. Mais ce qui pourra paroître surprenant, on peut plutôt se flater d'avoir le Système, que s'assurer d'avoir les Phenomenes avec assez d'exaëtitude. L'Academie songea donc à tirer de differens endroits des Observations sur le Flux & le Reflux, faites par des gens habiles, & à profiter d'un avantage qu'elle avoit pour cela, le plus grand qu'elle pût jamais souhaiter. M. le Comte de *Pontchartrain* est toujours prêt à favoriser tous les desseins qu'elle a pour l'avancement des Sciences, & il a la Marine dans son Département. Il ne fut donc question que de dresser un Mémoire sur la maniere d'observer, qui seroit envoyé sous son autorité dans tous les Ports de *France*; & le voici tel qu'il fut rédigé par le *P. Gouye*, & par *M. de la Hire* sur les vûes de toute la Compagnie.

## M E M O I R E

*De la maniere d'observer dans les Ports le  
Flux & le Reflux de la Mer.*

## I.

ON choisira dans le Port un lieu à l'abri , & où la Mer n'ait d'autre mouvement que celui du Flux & du Reflux. On y plantera un Poteau qui surpasse la plus grande hauteur , où , au raport des Mariniers , la Mer puisse monter en ce lieu-là.

## II.

Ce Poteau sera gradué de demi-pouce en demi-pouce , à commencer à compter depuis la Ligne du terrain , & l'on y marquera à chaque division des Lignes paralleles.

## III.

A chaque Marée on marquera dans un Journal à quelle Ligne du Poteau la Mer tout-à-fait haute ou tout-à-fait basse , aura donné ; & si elle a donné entre deux Lignes , on estimera à peu près cet intervalle.

## IV.

On marquera aussi par le moien d'une Montre bien réglée à quelle heure & à quelle minute la Mer aura paru sur le Poteau tout-à-fait haute ou tout-à-fait basse.

## V.

Si la Mer basse se retiroit du Poteau , on se contentera de marquer tous les jours la Ligne , où la Mer la plus haute aura monté , & le temps.

## VI.

## VI.

On observera quand on le pourra, le temps précis où la Mer aura donné à la même ligne, tant en montant qu'en descendant.

## VII.

On observera le vent qui regnera pendant que la Mer montera, & qu'elle descendra, & à quel air de vent porte la Marée, soit en montant, soit en descendant.

## VIII.

On marquera le vent Traversier de la Rade, & celui qui enfile l'entrée du Port.

## IX.

Quelquefois dans l'année on observera en Rade, si entre le temps où la Mer monte, & celui où elle descend, il y a quelque repos. Pour cette Observation une Chaloupe mouillera en Rade de temps calme; on placera sur les bords de la Chaloupe en travers un petit Essieu de bois bien arrondi, & propre à tourner aisément. Il y aura à chaque bout de cet Essieu un petit Moulinet, dont les ailes entre-ront de 5 ou 6 pouces dans l'Eau.

On marquera, si entre les deux mouvemens contraires de la Mer, ce Moulinet est quelque temps sans tourner, & combien dure ce repos, en cas qu'il y en ait un.

Neuf ou dix mois après que ce Mémoire circulaire eut été envoyé, M. *Baert* Professeur en Hydrographie à *Dunkerque* y répondit par des Observations très-exactes qu'il avoit commencées aussi-tôt qu'il l'avoit reçu, & il fut le premier à satisfaire la curiosité de l'Académie.



---

SUR LA  
CONTINUATION  
DU MOUVEMENT.

**L**Es premières notions de la Physique, l'essence de la Matière, par exemple, & la nature du Mouvement, quoique les plus simples en elles-mêmes, ne sont pas les plus claires; & ces Principes qu'il sembleroit qu'on devroit connoître parfaitement, avant que d'aller plus loin, demeurent cependant assez peu connus, & on ne laisse pas d'avancer.

Pourquoi une Pierre qu'une main jette en haut, continue-t-elle à se mouvoir après que la main l'a quittée? Cette question n'est pas facile, & peut-être trouveroit-on plus aisément la cause du Flux & du Reflux.

*M. Descartes* a dit que le Mouvement est une manière d'être qui par sa nature doit toujours durer aussi bien que le Repos; & que la Pierre une fois en mouvement y seroit toujours, si elle ne communiquoit pas de son mouvement à tous les corps qu'elle rencontre, & ne cessoit pas enfin d'en avoir, du moins sensiblement, par cette communication continuelle.

Un Auteur dont on a imprimé les Dissertations sur cette matière dans les Journaux de *Trevoux*, Mois de Septembre & Octobre 1701. n'a pas approuvé ce Système de *M. Descartes*; & après l'avoir combattu ingénieusement,

ment, il en a voulu substituer un autre.

Il dit, que dans le temps que la main se meut & s'éleve en tenant la Pierre, il descend une Colonne d'air pour prendre la place de la main qui s'éleve, que cette Colonne en descendant doit accélérer son mouvement comme font tous les autres corps, que cette accélération de mouvement dure après que la cause du mouvement a cessé d'agir, & que par conséquent la Pierre étant hors de la main, continue à monter, non parce qu'elle a été poussée par la main, mais parce que l'air qui tient sa place continue de descendre.

Mais M. de la Hire remarqua qu'un corps pesant n'est pesant dans le liquide où il nage, que parce que le liquide est plus léger, que par conséquent un volume d'air n'est point pesant dans un air de même nature, qu'il ne s'y meut & n'y tombe qu'autant qu'il est poussé par une force étrangere, que dès qu'il en est abandonné il n'a plus de mouvement, & qu'enfin il n'y a point de lieu à l'accélération dès que ce n'est point la pesanteur qui agit.

M. Parent attaqua aussi le nouveau Système par un grand nombre de difficultez qui en naissent. Par exemple, quelle seroit la cause du mouvement horisontal ? il n'y a point alors d'accélération d'air qui tombe. Quand le mouvement est horisontal, & circulaire, comme quand une boule attachée à une verge horisontale a été frappée d'un seul coup perpendiculaire à la verge, pourquoi tourne-t-elle ? l'air n'a point été mis circulairement, mais seulement en ligne droite. Si cette boule s'échapoit de la verge, elle continueroit à se mouvoir selon la tangente du point de la circonference circulaire,

re, où elle se trouvoit alors ; l'air décrivoit-il cette tangente, ou plutôt toutes les tangentes possibles selon lesquelles la boule continueroit à se mouvoir, si elle s'échapoit ? Quelle seroit dans cette hypothèse la cause de la réflexion ? Apparemment l'air qui marche devant le mobile, s'étant réfléchi à la rencontre de l'obstacle, entraîne ensuite avec lui le mobile. Mais si on ôtoit l'obstacle après que l'air l'a touché, & avant que le corps le touche, ce corps se réfléchiroit donc encore ?

---

## D I V E R S E S O B S E R V A T I O N S DE PHYSIQUE GÉNÉRALE.

### I.

**M**onsieur *Homborg* lût une Lettre dattée du 24. Janvier 1701. qu'il avoit reçue de *Paramaribo*, dans la Province de *Surinam*, sur la Côte Septentrionale de l'*Amerique Méridionale*. *Paramaribo* est une Colonie *Hollandaise*. Cette Lettre contenoit une remarque singulière pour l'Histoire naturelle. Il y a en ce pays-là des Fourmis que les *Portugais* appellent *Fourmis de visite*, & avec raison. Elles marchent en troupe, & comme une grande Armée. Quand on les voit paroître, on ouvre tous les Coffres, & toutes les Armoires des maisons ; elles entrent, & exterminent Rats, Souris, Cackerlacs qui sont des Insectes du Pays, enfin tous les Animaux nuisibles ; comme  
si

si elles avoient une mission particulière de la nature; pour les punir & pour en défaire les hommes. Si quelqu'un étoit assez ingrat pour les fâcher, elles se jeteroient sur lui, & mettroient en pièces ses bas & ses souliers. Le mal est qu'elles ne tiennent pas, pour ainsi dire, leurs grands jours assez souvent; on voudroit les voir tous les mois, & elles sont quelquefois trois ans sans paroître.

## II.

M. *Geoffroy* étant en *Italie* ne négligea pas d'observer un Sable noir que l'on y met communément sur le papier où l'on écrit. Il est fort mêlé de petites parcelles plates & brillantes, semblables à de l'émail; toutes les autres qui le composent sont sans nul éclat. En approchant de ce Sable une Pierre d'Aiman, M. *Geoffroy* vit qu'il n'y avoit que les petites parcelles obscures qui s'y attachassent; d'où il jugea qu'elles étoient de fer, ou d'Aiman; & il s'assura qu'elles n'étoient pas d'Aiman, parce que le fer ne les attiroit point. Pour les parcelles brillantes, il crut que c'étoit une poudre talqueuse noire, & en effet on trouve du Talc en plusieurs endroits d'*Italie*; & M. *Geoffroy* a remarqué qu'aux environs de *Rome*, quand le Soleil vient à paroître après une pluie, tous ces petits atomes de talc qui viennent d'être lavés, luisent, & font un effet assez agréable.

Les particules ferrugineuses du sable noir, jettées dans le feu, ne s'enflamment point, comme elles devroient faire, & comme fait la limaille de fer. Cela vient de ce qu'elles sont à demi-vitrifiées, & enduites d'un peu de bitume fort terrestre, qui leur sert de vernis, & les défend de l'action du feu.

\* La grande quantité de Sable noir que l'on trouve en *Italie*, est sur la surface de la Terre comme un indice de sa constitution intérieure, & les Volcans qui y font tant de ravages tiennent aux mêmes causes que ces parcelles ferrugineuses mêlées d'un peu de bitume, & à demi vitrifiées. Nous avons parlé dans l'Histoire de 1700. \* des effets de la limaille de fer, & du soufre.

## III.

Un autre Sable ramassé sur la Montagne de *Pésaro*, attira aussi la curiosité de M. *Geoffroy*. Il est par son extrême dureté très-commode pour travailler des Verres de Lunette, car il résiste long-temps à cet ouvrage, au lieu que d'autre sable se réduit bien vite à une poudre si fine qu'il ne mord plus sur le verre, & qu'on est obligé à en changer très-souvent. Ce Sable de *Pésaro* est mêlé de petites parcelles, les unes claires comme du Crystal, les autres vertes comme des Emeraudes, les autres semblables aux Amethystes, aux Topases, aux Hyacinthes; & quand on voit cette poussière avec le Microscope, c'est un assemblage surprenant de Pierres précieuses. Il y entre pourtant une quantité assez considérable de parcelles de fer, comme dans le Sable noir de *Rome*.

## IV.

Il y a dans la Ville de *Rennes* proche la Porte *Morlaix*, un Puits fait depuis trois ou quatre ans, dans lequel un Masson, qui travailloit auprès, laissa tomber son marteau. Un Homme de journée qui voulut le repêcher, y étant descendu, fut étouffé en approchant de l'eau.

l'eau. Un second qui y alla pour tirer le corps mort, eut la même destinée, & pareillement un troisième. Enfin on y en descendit un quatrième à demi yvre, & bien lié, à qui on avoit bien recommandé de crier dès qu'il sentiroit quelque chose qui l'incommoderoit. Il cria en effet dès qu'il fut auprès de l'eau, & on le retira promptement, mais il mourut trois jours après. On fut de lui qu'il avoit senti une chaleur qui lui brûloit les entrailles. On y descendit un Chien qui cria au même endroit, & mourut après avoir été retiré. Quand on jetoit de l'eau sur ce Chien mourant, il revenoit comme ceux qui ont été jettez dans la fameuse Grotte du Chien près de *Naples*. On a retiré avec des Crocs les trois cadavres, on les a ouverts, & on n'y a pû reconnoître aucune cause de leur mort. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que ce ne sont point des terres nouvellement remuées, qui causent des accidens si funestes, & que l'on boit tous les jours de l'eau de ce Puits sans incommodité. Cette Histoire a été écrite de *Rennes* au P. *Louvard* Religieux Benedictin de l'Abbaie de *S. Denis*, qui en fit part à M. *Varignon* pour la communiquer à l'Académie.

---

\* **M.** *De la Hire* donna à son ordinaire le Journal de ses Observations de l'année 1700.

A cette occasion M. *Morin* fit voir à la Compagnie un Journal qu'il tient aussi de tous les Changemens de l'air, très-ample, très-exact, &

\* Voyez les Memoires, pag<sup>e</sup> 12.

& où une grande quantité de choses sont renfermées avec beaucoup d'ordre, & en peu d'espace ; ce qui est le grand art de ces sortes d'Ouvrages. Toute l'Histoire de l'air depuis 33 ans est contenue dans le Journal de M. *Morin*, jusqu'aux moindres particularitez.

~~~~~

## ANATOMIE.

### SUR UN EMBRYON.

**L**A premiere formation des Animaux, qui sortent vivans du sein de leurs Meres, semble avoir été conduite par la Nature avec plus de secret, que celle des autres Animaux, dont nous pouvons voir l'origine, & les differens degrez d'accroissement, en considerant des Oeufs qui aient été couvez pendant des temps inegaux. Sur tout à l'égard de l'Homme, la difficulté de l'observation est plus grande, parce qu'il faut se contenter de quelques Fœtus de differens âges, que le hazard peut donner. Ceux qu'il donne le plus rarement, ce sont les plus proches du temps de la conception ; & cependant ce seroient les plus necessaires pour étudier la premiere formation de l'Homme.

Par cette recherche, on reconnoîtroit selon quel ordre se dévelopent les parties de la petite Machine, lesquelles sont les plus importantes, car il y a tout sujet de croire que ce sont les premieres développées, quel est l'usage de  
cer-

certaines parties comparé à l'usage de quelques autres, qui paroissent ou auparavant, ou après; enfin, ce qui est encore plus utile, quelles sont les causes des differens accidens, qui arrivent dans les accouchemens à differens termes.

Ainsi ce n'étoit pas une étude à négliger pour M. *Dodart* que celle d'un petit Embryon qui lui fut mis entre les mains par M. *Cottin* Chirurgien de *Versailles*. On étoit très-sûr par des circonstances particulieres qu'il étoit de 4 jours ou de 21, & sa grandeur décidoit absolument pour 21.

Il avoit été détaché de son Placenta par mégarde, & il ne restoit qu'une petite partie des Envelopes. Mais à remettre les choses à peu près dans l'état où elles avoient dû être, M. *Dodart* jugea que l'Ovale formée des Envelopes & du Placenta, avoit été au moins d'un pouce & demi de diametre. Le Placenta devoit avoir été bien plus de la moitié du tout, & lors qu'on l'étendoit à plat, il avoit presque deux pouces en tout sens.

On voit par là qu'à mesure que le Fœtus est moins éloigné du moment de la conception, le Placenta est plus grand par rapport aux Envelopes, & au Fœtus, & fait une plus grande partie du tout où il est compris.

Il est aisé de conjecturer que comme le Placenta est destiné à nourrir tout, il faut que dans le premier développement de l'Oeuf, cette partie se trouve la plus formée, & la plus avancée; & quoique dans la suite elle se nourrisse elle-même & croisse, tandis qu'elle nourrit & fait croître le Fœtus, elle ne conserve pourtant pas son premier avantage de grandeur,  
par-



parce qu'elle nourrit un Fœtus toujours plus grand & plus fort, qui tire toujours plus de lacs, & par conséquent, dessèche & épuise d'autant plus son Placenta.

C'est donc quand le Fœtus est à terme, que le Placenta, plus petit à proportion du Fœtus, a plus de facilité à sortir après lui. Delà vient que les accouchemens avant terme, quoique plus faciles par la petitesse du Fœtus, sont cependant plus dangereux. Car le Fœtus qui a fait une issue suffisante pour lui, peut ne l'avoir pas faite suffisante pour son Placenta qui le doit suivre.

L'Embryon que M. *Dodart* observa n'avoit que 7 lignes de long, du sommet de la tête, jusqu'au bas de l'épine du dos, où il se terminoit. Les Cuisses n'étoient point encore développées; ce n'étoient que deux petites verues, qui paroissent au bas du ventre. Les bras étoient deux autres petites verues, placées à l'endroit des bras.

La tête avoit au moins le tiers de toute cette longueur de 7 lignes. Deux petits points noirs qu'on y voyoit auroient été un jour des yeux. La bouche étoit déjà très-grande, & peut-être est-ce là une marque que le Fœtus se nourrit par la bouche. Il ne paroissoit nulle éminence à l'endroit du nez, seulement deux marques comme des fossettes imperceptibles annonçoient les deux trous des narines. L'endroit des épaules étoit la plus grande dimension en large, on n'y trouva guère moins de 4 lignes.

Les Peintres donnent 8 fois la mesure de la tête à la hauteur d'un homme de belle taille, & 4 fois cette même mesure à la hauteur d'un jeune Enfant. Le Fœtus dont nous parlons n'a-

voit que 3 fois la mesure de sa tête, d'où il suit que moins le Fœtus est âgé, plus la tête est grande à proportion du reste. Les parties qui en sont plus proches, sont aussi plus grandes par rapport aux autres, & les pieds sont la partie la plus disproportionnée à la grandeur de la tête.

Il est visible que le Fœtus & l'Homme ont des proportions bien différentes, & qu'un Homme fait sur les proportions du Fœtus seroit monstrueux, & à peine passeroit pour un Homme.

Peut-être, comme le remarqua M. *Dodart*, faut-il pour la vegetation & pour l'accroissement, que les Esprits animaux, qui se forment dans la tête, soient en plus grande quantité par rapport à la masse du reste du corps; mais quand le corps a cessé de croître, ou ne croît plus tant, & qu'il est question des fonctions de la Raison & de l'Intelligence, la grande quantité des Esprits animaux n'est plus si nécessaire que leur perfection, & la tête n'a plus besoin d'être un si grand vaisseau.

L'Embryon étoit courbé en avant, comme les Fœtus parfaits, & ne représentoit pas mal dans cette attitude une petite fève de Ver à soie. Il pesoit moins de 7 grains, ce qui est une grande legereté pour un corps de 7 lignes de long. Il étoit si mollaſſe, qu'on ne pouvoit le toucher, même à la tête, sans changer considérablement sa figure.

On concevra facilement combien les parties intérieures devoient être confuses, & difficiles à démêler, même avec les meilleurs Microscopes. Quand M. *Dodart* l'eut ouvert, il reconnut le cœur, & l'oreillette droite. Le cœur avoit la pointe mouſſe & arrondie, comme un cœur de Tortue. Le reste de ce qui étoit dans

la poitrine & dans le bas ventre, ne paroïssoit que comme de simples traits, & des contours marquez par différentes inegalitez presque toutes vesiculaires en apparence, excepté une partie au côté gauche, que l'on pouvoit soupçonner d'être la Ratte. Il n'y avoit rien au côté droit qui eût rapport au Foie.

S'il étoit bien vrai que la ratte fût formée avant le foie, *M. Dodart* en conjecturerait qu'elle seroit plus nécessaire pour la perfection du sang, & le filtreroit plus délicatement, & que le foie ne commenceroit à entrer en fonction, que quand il y auroit dans le sang des impuretez plus grossières, qu'il en faudroit séparer.

*M. Dodart* vit distinctement à la surface interne du côté gauche de la poitrine, trois lignes blanchâtres, bien terminées, & presque parallèles, qui ne pouvoient être autre chose que trois Côtes naissantes.

L'Embryon aiant été mis dans l'esprit de vin, *M. Dodart* trouva, quand il voulut examiner la tête, qu'elle s'étoit durcie, & que les membranes s'étoient tellement collées au cerveau qu'il n'y avoit pas moien d'y rien distinguer.

## SUR UN FOETUS EXTRAORDINAIRE.

\* **L**E Fœtus ne diffère pas seulement de l'Homme par les proportions de son corps, il en diffère encore par des parties que l'Homme n'a

\* Voyez les Mémoires, pag. 115.

n'a pas, ou qui du moins ne font plus d'aucun usage dans l'Homme; & selon cette idée, on pourroit dire que quand un Fœtus humain devient Homme, il se métamorphose comme un Ver qui devient Mouche, ou Papillon, quoiqu'à la vérité beaucoup moins sensiblement.

Le trou ovale & le canal de communication, sont de ces parties qui n'existent, ou qui n'ont d'usage que dans le Fœtus. M. *Littre* y en ajoute une troisième; c'est l'Ouraque, un Canal qui partant du fond de la vessie & s'étendant le long du Cordon qui attache le Fœtus au Placenta, va porter son urine entre les Envelopes.

Il est vrai que dans le Fœtus humain l'usage de ce Canal ne paroît pas si assuré, parce qu'on ne trouve point entre les deux Envelopes, Chorion & Amnios, une troisième membrane nommée Allantoïde, qui se trouve en plusieurs especes d'animaux, & dans laquelle l'Ouraque va constamment déposer l'urine. Ainsi comme il semble que dans le Fœtus humain, l'Allantoïde ne seroit pas moins nécessaire pour être le réservoir de l'Ouraque, le défaut d'Allantoïde rend la fonction de l'Ouraque douteuse.

Mais M. *Littre* ayant entre les mains un Fœtus féminin, mort dans le sein de sa mère vers le huitième mois, y trouva la membrane Allantoïde; il l'a encore découverte cette année dans un autre Fœtus, & il commence à soupçonner que cette membrane y pourroit bien être toujours, quoique jusqu'à présent inconnue.

Si cela est, quand le Fœtus est né, & que le Cordon a été coupé, l'Ouraque par conséquent se ferme, l'urine qui ne peut plus prendre cette

rou-

route ne sort plus que par le col de la vessie, l'Ouraque devenue inutile se dessèche peu à peu, ses parois s'approchent, & se colent ensemble, enfin ce n'est plus un Canal, mais un simple ligament, qui aboutit au nombril. On fait qu'il arrive précisément la même chose au Canal de communication.

Des observations que M. *Littre* a faites, rendent plus que vraisemblable ce Systême de l'Ouraque. En ouvrant le corps d'un garçon de 12 ans qui avoit toujours rendu presque toutes ses urines par le nombril, il trouva que le col de la vessie étoit bouché, & que l'Ouraque s'étoit maintenue en forme de Canal. Il a connu un homme de 30 ans, dont les urines étoient toujours sorties par le nombril, ce qui assurément venoit de quelque obstacle naturel placé au col de la vessie, & qui avoit obligé les urines à se conserver leur premiere route. Enfin il a fait voir à l'Académie sur le corps d'un jeune homme de 18 ans, dont le col de la vessie étoit occupé par une pierre, que l'Ouraque du côté de la vessie étoit creusée de la longueur de 5 travers de doigt, & avoit 3 lignes de diamètre; marque presque infallible, que les urines qui trouvoient trop de difficulté à sortir par le chemin ordinaire, commençoient à travailler sur leur ancien Canal, & tâchoient à se le rouvrir. Il y a beaucoup d'apparence que l'Ouraque ne se laisse rouvrir ainsi, en tout ou en partie, que dans de jeunes gens, en qui elle n'est pas encore fortement desséchée.

Le premier Fœtus où M. *Littre* trouva une Allantoïde, avoit encore d'autres choses fort irregulieres.

Son cordon ombilical étoit extrêmement en-

tortillé, & plus menu des deux tiers qu'il n'auroit dû être. Ce peu de capacité des vaisseaux sanguins qui composent le cordon, & la difficulté que les liqueurs trouvoient à couler dans ces canaux entortillez, sont des causes assez manifestes de la mort du Fœtus.

A ce sujet M. *Littre* avance que le Fœtus peut se nourrir uniquement des liqueurs que le cordon lui fournit, & que celle qui est renfermée dans l'Amnios, & que l'on suppose qu'il reçoit par la bouche, peut quelquefois ne pas servir à cet usage.

Des Fœtus sans tête, & d'autres sans bouche, & cependant fort bien nourris, sont la preuve de M. *Littre*.

Celui dont nous parlons n'avoit nulle trace de cerveau, ni de moëlle épiniere, quoiqu'il eût dans la tête tous les nerfs qui partent du cerveau, & dans le canal de l'épine, tous ceux qui sont ordinaires à la moëlle de l'épine. Les nerfs qui naissoient de l'endroit, où auroit dû être le cerveau, étoient, à la verité, fort secs & fort durs, au lieu qu'ils sont naturellement moëlleux, même dans les personnes les plus âgées. Du reste ce Fœtus étoit bien formé, & bien nourri, & il avoit certainement vécu huit mois.

Que devient donc le Systême ordinaire, où le Cerveau est la source des Esprits animaux, qu'il separe de la masse du sang, & qu'il répand ensuite dans toutes les parties par les nerfs, qui ne sont que les canaux d'une liqueur si subtile ? si l'on ôte au cerveau l'origine des mouvemens, & des sensations, où la placera-t-on ?

Il est certain que le fait de M. *Littre*, & d'autres

tres pareils que l'on connoissoit auparavant , semblent renverser tout ; cependant M. *Littre* pour sauver le Systême commun , du moins dans le fait qu'il avoit vû , observe que les deux membranes destinées à renfermer le cerveau , & qui delà se prolongeant vont renfermer aussi la moëlle de l'épine , s'y trouvoient dans toute leur étendue , quoi que parfaitement vuides , & il conjecture , que comme toutes les membranes du corps sont garnies de glandes , peut-être celles-là en avoient-elles , qui filtroient le sang arteriel , & en tiroient les Esprits , à peu près à la maniere du Cerveau.

Mais ces glandes qui pouvoient le remplacer , à l'égard des mouvemens lents & peu frequens d'un Fœtus , ne l'eussent pas pû à l'égard de ceux d'un Adulte , & moins encore à l'égard des fonctions de l'intelligence. Car enfin cette prodigieuse quantité d'Esprits , & d'Esprits finement travaillez , qui y est absolument necessaire , ne peut être formée que dans le cerveau. Et pour n'en juger que par des apparences exterieures , mais cependant assez fortes , l'Homme qui n'est pas le plus grand de tous les animaux , a plus de cervelle qu'aucun autre , & ceux qui en ont le plus après lui , sont les moins éloignez de son intelligence..

# SUR UNE MORT S U B I T E.

UN jeune Homme de 16 ans , qui depuis l'âge de 14 maigrissoit , étoit sujet à une toux , & à une difficulté de respirer , & tomboit en foiblesse quand il avoit fait quelque exercice violent , ou s'étoit mis dans une grande colere , s'étant un soir emporté avec excès contre un Camarade qu'il avoit , & ayant après cela soupe deux fois plus qu'à l'ordinaire , se coucha à dix heures , & dormit jusqu'à deux , qu'il fut reveillé par une toux violente , à laquelle succeda un grand crachement de sang , & la mort à cinq heures du matin.

M. *Littre* l'ouvrit , & trouva beaucoup de sang fort peu écumeux dans la Trachée , & dans ses Bronches ; du sang noirâtre & à demi caillé dans les deux troncs de la veine cave , dans le ventricule droit du Cœur , & dans l'Artere pulmonaire ; pas une goutte de sang dans le ventricule gauche.

Le tronc de la veine du Poumon étoit extraordinairement dilaté , & aussi gros que tout le cœur , & sa cavité étoit assez exactement occupée par un corps étranger rond , & épais de deux pouces.

Le cercle membraneux qui entoure interieurement l'embouchure de l'oreillette gauche dans le cœur , étoit par son bord inferieur , plus épais qu'à l'ordinaire , osseux & plus étroit que



que par le bord supérieur, ce qui est contraire à la conformation commune.

Pour rendre raison de la mort de ce jeune Homme, & des accidens qui l'ont précédée, M. *Littre* ne se sert que d'un seul des faits qu'il a observés, & il en déduit tous les autres.

Le cercle membraneux placé à l'embouchure de l'oreillette gauche du cœur, est une espèce de petit Entonnoir, dont l'ouverture la plus étroite est tournée vers le haut ou vers la base du cœur. Le sang poussé par la contraction de l'Oreillette gauche est obligé d'augmenter sa vitesse pour passer d'abord par la partie la plus étroite de cet Entonnoir, après quoi il coule sans difficulté par la partie la plus large dans le ventricule gauche.

Supposé, comme il est assez vrai-semblable, que par la première conformation du corps de ce jeune Homme, cet Entonnoir fût renversé, & que le bord le plus étroit du cercle membraneux fût en embas, le sang qui a passé d'abord par la partie la plus large sans augmenter sa vitesse, n'a pu passer facilement par la partie la plus étroite, & dans l'effort qu'il a fait contre l'obstacle, c'est-à-dire, contre le bord inférieur de ce cercle, il l'a frappé avec plus de force, & a poussé dans les interstices de ces fibres, des particules salines, qui non seulement l'ont rendu à la longue plus épais, parce qu'elles s'y amassoient en grande quantité; mais qui l'ont encore rendu osseux, parce qu'elles étoient salines.

Ce bord devenu osseux a perdu sa flexibilité; & quand le sang de la veine du Pômon se présentait pour entrer dans le ventricule gauche, & que le cercle membraneux auroit

dû s'élargir pour faciliter son entrée , l'ossification l'en empêchoit , & une partie du sang demouroit dans la veine. Delà, l'extrême dilatation de ce vaisseau , & le Polype.

Le Polype formé , le sang ne passoit plus qu'avec beaucoup de peine dans la veine du poulmon , & par conséquent sejournoit dans les arteres de cette partie, s'y amassoit , les dilatoit, les rendoit plus minces, & élargissoit leurs pores. Les parties les plus subtiles du sang, comme ses sels, & ses ferositéz, s'échappoient donc aisément par ces pores agrandis, & delà elles ne pouvoient passer que dans la cavité des cellules du poulmon , dans les Bronches, & dans la Trachée. Cette cause de la toux , & de la difficulté de respirer , est assez évidente. Il est clair aussi que la colere ou un grand exercice , subtilisant encore plus le sang , lui donnoient encore plus de facilité à passer dans les conduits de la respiration , & que comme il abandonnoit presque entièrement la route des veines pulmonaires , & que par conséquent le ventricule gauche avoit peu de sang à pousser dans l'Aorte , les foibleesses devoient s'en ensuivre, & enfin la mort, lorsqu'il ne passa aucun sang de la veine du poulmon dans le ventricule gauche.

A tout cela, il est aisé de joindre ce que les alimens pris avec excès dans de pareilles circonstances peuvent avoir contribué à une mort si prompte.

---

## SUR UNE AUTRE MORT SUBITE.

**M.** *Littre* ayant ouvert le corps d'une Femme qui étoit morte subitement dans la Rue , après avoir agi avec vigueur jusqu'à ce dernier instant , trouva les principes de cette mort bien marquez :

Les parois du ventricule gauche du Cœur étoient fort enflammées , & épaissies par l'inflammation jusqu'à avoir 8 lignes , au lieu que celles du ventricule droit n'en avoient qu'une. La cavité de ce ventricule épaissi étoit extrêmement diminuée , & ne contenoit aucune goutte de sang. Les Tuniques qui forment le Tronc de l'Aorte étoient ossifiées en plusieurs endroits ; la partie intérieure de cette artère pleine d'ulceres & de fungus , & cependant sans inflammation ; ses valvules Sigmoïdes endurcies & calleuses. Les Troncs de la veine cave , l'Oreillette droite , & le Ventricule droit du cœur étoient pleins d'un sang fort noir , & en partie caillé. Les Poumons aussi étoient remplis de sang , mais moins noir , & beaucoup plus liquide .

M. *Littre* qui a observé ces faits assez singuliers , en a recherché les causes. D'abord comme il n'y a pas d'apparence que l'on puisse vivre plusieurs jours avec une inflammation à un ventricule du cœur , puisqu'il n'auroit plus ses mouvemens libres , & que d'ailleurs des parties qui ne sont pas osseuses , ne le peuvent

devenir qu'à la longue , il faut que le mal ait commencé par l'ossification de l'Aorte. Pour cela , il faut que le sang de l'Aorte , non pas celui qui y coule comme dans un canal , mais celui qui se distribue dans les petits vaisseaux de ses Tuniques pour les nourrir , se soit trouvé altéré , ou plutôt que par quelque mauvaise conformation de ces Tuniques , il ait coulé difficilement dans leurs vaisseaux , ou même y ait séjourné , que par là les sels du sang aient eu lieu de se separer des autres principes , d'où il est aisé de voir le commencement de l'ossification , qui s'est ensuite étendue jusqu'aux Valvules sigmoïdes , & la naissance des fungus & des ulceres , qui ont rongé & consumé avec le temps une partie de la substance du Tronc de l'Aorte.

Le sang destiné à se distribuer dans les vaisseaux des tuniques de l'aorte , y ayant toujours coulé avec plus de peine , parce qu'il en trouvoit toujours l'ossification ou plus forte , ou plus étendue , il a enfin quitté presque entièrement cette route , & s'est porté avec plus d'abondance dans les parois du ventricule gauche du cœur. Ce ventricule s'est donc enflamé par la trop grande quantité de sang dont ses parois ont été inondées ; à mesure qu'elles en ont été gonflées , sa cavité s'est retrecie , ses fibres trop étendues & forcées ont perdu leur jeu , & après que ce ventricule a eu la force de se contracter pour la dernière fois , & de pousser hors de lui tout le sang qu'il contenoit , il n'a plus eu celle de se dilater pour recevoir de nouveau sang , tandis que le ventricule droit recevoit celui qui lui appartenait ; & delà vient qu'on a trouvé l'un vuide , & l'autre plein.

Sur cette inflammation d'un Ventricule, M. *Littre* a remarqué que les Ventricules du cœur doivent être moins sujets à des abscess qu'à des inflammations. Un abscess est un sang extravasé qui se coagule, se corrompt, & se change en pus. Une inflammation est un gonflement des vaisseaux causé par trop de sang. Or supposé que des Arteres Coronaires qui nourrissent la substance du cœur, il s'extravasât & s'épanchât du sang, qui ne rentrât pas d'abord dans les veines Coronaires destinées à le reprendre, il seroit difficile que le mouvement continuel de contraction & de dilatation où est le cœur, ne le forçât à y rentrer, ou du moins ne le brisât, & ne l'attenuât de sorte qu'il s'échappât dans les ventricules au travers des parois. Mais à l'égard de l'inflammation, le cœur n'a pas plus de ressources qu'une autre partie pour la prévenir, ou pour s'en délivrer.

L'état où étoit l'Aorte dans le sujet dont nous parlons, put aussi avoir part à la mort subite. Les Arteres dans tout leur cours sont garnies de fibres charnues, qui par leur action de ressort continuent au sang l'impulsion qu'il a d'abord reçue du cœur. Car sans cela, il paroît que la contraction du cœur étant aussi petite qu'elle est, seroit trop foible pour pousser le sang si loin, & dans des canaux si tortueux & si déliez, & sur tout pour le faire repasser dans les ouvertures insensibles des veines. Ainsi les arteres & tous leurs rameaux sont comme autant de Cœurs prolongez, qui secondent l'action du premier. Or il est visible que dans cette Femme, l'ossification, & la consommation d'une partie de la sub-

38 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE  
tance du tronc de l'aorte , lui devoient absolument ôter son ressort , & par conséquent priver le cœur de ce secours.

---

SUR UNE AUTRE  
MORT SUBITE  
APRÈS UNE MEDECINE DE  
PRÉCAUTION.

**V**Oici encore une Mort subite , dont M. *Littre* étudia , pour ainsi dire , toute la Mécanique avec ses propres yeux.

Un Homme de 50 ans qui se sentoît de l'oppression , & de la difficulté de respirer , & qui quelquefois crachoit un peu de sang , ayant pris une médecine sans être aucunement pressé par le mal , mourut trois quarts d'heure après , avec une oppression extrême , dans de violentes convulsions , & faisant inutilement de grands efforts pour vomir.

Cette médecine si suspecte fut cause qu'on l'ouvrit , & M. *Littre* fit les observations suivantes.

Les parois du Ventricle gauche étoient une fois plus épaisses qu'à l'ordinaire , les Valvules sigmoïdes de l'Aorte , cartilagineuses , épaisses d'une ligne , & raccourcies de manière qu'il s'en falloit plus de deux lignes qu'elles ne se touchassent , même quand elles étoient remplies ; car c'est en cet état qu'elles doivent toutes ensemble fermer l'entrée du cœur au sang de l'Aorte , qui pourroit refluer.

Le

Le Tronc de l'aorte proprement dit , & celui de l'aorte descendante étoient du moins une fois plus gros que dans l'état naturel , & leurs parois beaucoup plus minces. Leur partie intérieure étoit pleine d'ulceres, qui avoient rongé presque la moitié de l'épaisseur des parois. Il y avoit aussi dans ces mêmes parois plusieurs lames osseuses , larges & épaisses , comme de grands ongles. Les Branches des deux troncs de l'aorte n'étoient que de la grosseur naturelle, leurs parois de l'épaisseur ordinaire, le tout fort sain.

Chacune des deux cavitez de la poitrine contenoit six onces d'une serosité sanguinolente. Les Poumons étoient fort gros, & fort pesans; le sang renfermé dans leurs vaisseaux sanguins, tout fondu; les glandes abreuvées de serosité; une partie des Bronches & des Vesicules remplis de cette même serosité au lieu d'air, & les autres si affaîssés par les liqueurs extravasées, ou contenues encore dans les vaisseaux, qu'à peine M. *Littre* pût-il les dilater un peu, en y poussant du vent par la Trachée, même avec un soufflet.

Il se trouva dans le Pericarde, & dans la cavité de l'Hypogastre une assez grande quantité de serosité, semblable à celle des deux cavitez de la poitrine.

Les cartilages du Larynx étoient en partie ossifiés, & l'ouverture de la Glotte, un peu retrecie par cette ossification. La surface intérieure de deux des gros rameaux des Bronches du poumon gauche étoit légèrement excoriée; & apparemment le peu de sang que cet Homme crachoit de temps en temps sortoit par ces deux endroits.

Com-

Comment ne feroit-il pas extrêmement difficile à la Medecine de deviner sur quelques legers indices qui paroissent au dehors, les dérangemens interieurs qui peuvent arriver à une Machine aussi prodigieusement composée que nôtre Corps ? Quand on voit cette Machine démontée, & qu'on en a toutes les piéces sous les yeux, & entre les mains, il est encore souvent assez difficile de juger quelles ont été précisément celles qui ont été mal disposées, ou qui se sont démenties, & quel effet a dû s'en ensuivre.

Ainsi à la vûe des faits que nous venons d'exposer, il n'étoit peut-être pas facile de s'apercevoir, comme fit M. *Littre*, que la seule disproportion d'épaisseur entre les tuniques des deux troncs de l'aorte, & celles de ses branches, soit que ce fût un vice de la premiere conformation, ou une suite de quelque maladie, pouvoit avoir causé tout le desordre qui se trouva dans la Machine.

Les Arteres ne sont pas de simples canaux, qui ne servent qu'à laisser couler une liqueur, elles ont une action qui sert à la faire couler; ce sont des canaux agissans. L'entrée du sang les étend, & les dilate; mais aussi-tôt ils se resserrent par leur ressort, & favorisent ainsi la premiere impulsion du cœur, qui a envoyé le sang vers les extrémitéz. La quantité dont les arteres sont dilatées au delà de leur extension naturelle est égale à celle dont elles se resserrent ensuite; & comme elles résistent plus à une plus grande dilatation qu'à une moindre, plus elles ont résisté à l'entrée du sang, plus elles hâtent son cours. Toute leur force dépend des fibres charnues de leurs tuniques,



ques, ou, en un mot, de leur épaisseur. Plus une artère est d'un petit diamètre, moins elle reçoit de sang, & moins elle a besoin d'être épaisse pour le chasser en avant, & par conséquent dans les deux troncs de l'aorte, & dans les branches dont le nombre est infini, les diamètres & les épaisseurs qui diffèrent à l'infini, doivent être toujours proportionnez si juste, que tout le sang qui sera reçu soit poussé.

D'ailleurs tout le sang qui a passé par les deux troncs de l'aorte, doit pendant la même pulsation se répandre dans toutes les branches. Il faut donc que d'un côté les deux troncs de l'aorte, & de l'autre toutes les branches ensemble, aient précisément la même force de ressort; & c'est une merveille presque incompréhensible que cette égalité si juste exécutée sur un si prodigieux nombre de tuyaux tous différens.

Dans le sujet que M. *Listre* examina, l'épaisseur des deux troncs de l'aorte étoit à proportion beaucoup moindre, que celle des branches; & quelle qu'en fût la cause, il conjectura que le sang poussé par le cœur dans les troncs, y étant reçu avec moins de résistance que dans les branches, & par conséquent en plus grande quantité, & de plus étant poussé avec moins de force par les troncs, il avoit dû à la longue s'y amasser, en dilater les parois, & augmenter encore par cette dilatation la foiblesse de leur ressort, qui avoit été la première cause du mal.

De ce sang qui a séjourné dans les troncs, il est aisé de déduire les ulcères, & les ossifications.

Les

Les Valvules sigmoïdes commençant à s'ouvrir, se sont raccourcies, & n'ont plus fermé l'entrée du cœur. Ainsi le sang de l'aorte n'a pu refluer en partie dans le ventricule gauche; & il s'est fait un combat continuel entre le sang lancé par ce ventricule dans l'aorte, & celui qui retournoit dans le ventricule, faute d'une barrière. Dans ces mouvemens contraires du sang, les parois du ventricule gauche, & celles des troncs de l'aorte, auroient dû être également forcées, & leurs cavitez devenir plus amples; mais les parois du ventricule étant apparemment par la premiere conformation une fois plus épaisses qu'à l'ordinaire, elles ont résisté, & tout l'effort est tombé sur les troncs de l'aorte, qui ont encore été dilatez. C'est ainsi que les causes & les effets vont assez souvent en cercle, & qu'une cause, d'abord assez legere, est infiniment augmentée par ses propres effets.

Ce qui a été dit sur une autre mort subite\*, explique aussi la difficulté de respirer qu'avoit cet Homme, & la liaison de ce mal avec les autres desordres de sa constitution.

La medecine qu'il prit, & où M. *Littre* qui en avoit vu le reste, soupçonna qu'il y avoit quelque émetique, lui donna pendant trois quarts d'heure de violentes envies de vomir, mais inutiles. Dans de si grands efforts, son sang déjà trop dissous par les mêmes causes qui produisoient la difficulté de respirer, fut encore brisé & froissé par les parties solides du ventre, & de la poitrine, ses Poumons qui n'étoient abreuvez de serositez qu'en partie,

en

\* Voyez ci-dessus, pag. 33 & 34.

en furent entierement inondez, & la respiration cessa.

---

## SUR UNE NOUVELLE ROUTE DES URINES.

\* **U**N E liqueur que l'on boit, tombe d'abord dans l'Estomac, & y sejourne quelque temps; soit parce qu'elle se mêle avec les alimens solides, si elle y en trouve, qu'elle y aide à leur dissolution, & n'en sort qu'avec eux; soit parce qu'il faut qu'elle attende que la contraction des fibres de ce Viscere l'ait chassée peu à peu. De l'Estomac elle passe dans les Intestins, delà dans les Veines Lactées, dans le Reservoir du Chyle, dans la Veine Souclaviere, dans la Veine Cave, & enfin dans le Ventricule droit du cœur. Ce Ventricule la pousse dans les Poumons, d'où elle retourne au cœur, mais dans le Ventricule gauche, qui la pousse dans l'Aorte. Après que de l'Aorte elle a passé dans l'Artere Emulgente qui en est une branche, elle tombe dans les Reins destinez à la filtrer, d'où elle coule dans les Ureteres, qui à la fin la versent goutte à goutte dans la Vessie.

Voilà certainement un long circuit; & outre qu'il est long, il fait que les liqueurs que l'on a bues, se mêlent avec tout le sang, & avec d'autres liqueurs qu'elles rencontrent en leur chemin, & il n'y a pas d'apparence

\* Voyez les Memolres, pag. 258.

parence qu'elles ne s'alterent beaucoup par ce mélange.

Cependant tout le monde fait avec quelle vitesse passent les Eaux minerales, & combien l'effet des Asperges est prompt. De plus, il arrive quelquefois qu'une teinture de Cassé est rendue par les urines presque aussi noire qu'elle a été prise. Il en va de même de plusieurs autres liqueurs. Comment se font-elles conservées exemptes d'alteration ?

Ces difficultez ont fait que M. *Morin* a cherché depuis longtemps, si le chemin des urines ne pourroit pas être accourci, & enfin il en a imaginé un moien, qu'il croit qui seroit aujourd'hui entierement nouveau, s'il n'en avoit jamais parlé.

Il prétend qu'une partie de la liqueur qu'on a bue, passe au travers des membranes de l'estomac, & qu'étant tombée dans la cavité où sont les intestins, elle entre dans la vessie par ses pores, & non pas dans les intestins, qui sont enduits d'une humeur trop épaisse & trop glaireuse. Puisque la Vessie tire toute la liqueur épanchée de cette maniere, l'Hydropisie n'est pas à craindre, du moins ordinairement, & c'est même un avantage à ce Système que la facilité avec laquelle il explique l'origine de l'Hydropisie.

M. *Morin* par une suite nécessaire de sa pensée établit deux sortes d'urines, les unes qui se sont filtrées immédiatement de l'estomac dans la vessie, les autres qui ont fait le long chemin de la circulation, & il est visible que celles qui passent le plus promptement, & avec le moins d'alteration, ce sont les premières. Il est clair aussi que leur quantité est d'autant plus.

plus grande, qu'on a bû davantage, & qu'on a pris moins d'alimens solides, parce que d'un côté plus l'Estomac est plein, jusqu'à certain point, plus la contraction de ses fibres est forte, & capable de chasser beaucoup de liqueur par ses pores, & que de l'autre, les alimens solides retiennent pour leur digestion une partie de la liqueur, qui se mêle avec le chile, & le suit dans tout le chemin qu'il fait.

L'expérience qui montre que l'Estomac, & la Vessie, même d'un animal mort, sont aisément pénétrés par l'eau, paroît rendre le Système de *M. Morin*, non seulement vraisemblable, mais nécessaire. Car quand même comme d'habiles Anatomistes le prétendent, une circulation entière de toute la masse du sang se pourroit faire en moins de cinq minutes ou, selon d'autres, en deux, ce qui expliqueroit suffisamment la vitesse des urines, il seroit toujours difficile, qu'il n'y en eût qui eussent passé immédiatement de l'estomac dans la vessie, puisque ces deux viscères sont si pénétrables à l'eau.

---

## SUR LA CIRCULATION DU SANG DANS LE FOETUS.

**L**Es deux Systèmes opposés de la circulation du sang dans le Foetus, rapportez dans l'Histoire de \* 1699. ne roulent que sur des conjectures; mais le moins qu'on puisse deviner,

\* Pag. 28. 39.

ner, c'est le mieux, & une question physique est d'autant plus sûrement décidée que le témoignage des yeux a plus de part à la décision, & que le raisonnement y en a moins.

Le Trou ovale encore tout ouvert dans un Homme de 40. ans, que M. *Littre* dissequa, paroît donner une de ces décisions sensibles. Puisque le sang s'étoit toujours conservé le passage du Trou ovale, sa circulation étoit la même dans l'Homme qu'elle avoit été dans le Fœtus; & de plus, comme il avoit toujours passé ou de l'oreillette droite dans la gauche, ou de la gauche dans la droite, les marques & les traces de l'un ou de l'autre de ces mouvemens contraires ne s'étoient pas effacés dans cet Homme, ainsi qu'elles s'effacent dans tous les autres; ce qui fait la difficulté de la question. Il ne s'agissoit donc que d'examiner avec ses yeux & de reconnoître sensiblement de quel côté le sang avoit passé par le Trou ovale.

Tous les Vaisseaux du corps augmentent, diminuent, ou cessent même d'être vaisseaux, selon qu'il y passe beaucoup, ou peu, ou point du tout de liqueur. Dans les Adultes, après que le trou ovale s'est fermé, les cavitez des vaisseaux du côté droit, & du côté gauche du cœur sont égales, parce qu'il y coule une égale quantité de sang. Mais le trou ovale étant ouvert dans un Adulte, il en coule davantage de l'un ou de l'autre côté; & par conséquent le côté qui a les plus grands vaisseaux, est selon toutes les apparences possibles celui qui reçoit le plus de sang. Car on ne peut nullement dire d'un Adulte, ce que l'on diroit du Fœtus; que quoi qu'il coule moins de sang dans les vais-

vaisseaux du côté droit, ils sont cependant plus dilatez, parce que le sang y coule plus lentement, & regorge à cause de l'embarras des poumons.

Or M. *Littre* ayant exactement mesuré tous les vaisseaux du cœur de cet Homme de 40. ans, le Système de M. *Mery* se trouva victorieux.

L'oreillette droite du cœur étoit large de 3. pouces, & 10. lignes, la gauche de 3. pouces, & 2. lignes. L'embouchure du ventricule droit avoit 2. pouces  $\frac{1}{2}$  de largeur; celle du ventricule gauche 1. pouce & 8. lignes. Les capacitez des deux ventricules étoient proportionnées à celles de leurs embouchures. Le diamètre de l'artere du poumon étoit de 1. pouce & 10. lignes; celui de l'aorte de 1. pouce & 3. lignes. Par conséquent il couloit plus de sang du côté droit, & le sang passoit par le trou ovale de l'oreillette gauche dans la droite.

Il y avoit plus. Du côté de l'oreillette droite le trou ovale n'avoit que 3. lignes de diamètre, & il en avoit 9. du côté de l'oreillette gauche, ce qui faisoit la figure d'un Entonnoir, dont la plus grande ouverture est naturellement tournée du côté d'où vient la liqueur. Et même à l'égard du trou ovale cette figure est d'autant plus concluante, que le sang doit toujours élargir son chemin, du côté d'où il vient.

M. *Littre* a assuré que dans un autre Sujet, à peu près du même âge, il avoit trouvé aussi le trou ovale ouvert, avec la même inégalité d'ouverture des deux côtes.

Il tâcha de conjecturer pourquoi le trou ovale

le

le demeueroit quelquefois ouvert dans les Adultes, & il crut qu'on en pouvoit rapporter la cause, ou à ce que les deux plans demi-circulaires qui le forment n'avoient pas pris assez d'accroissement, pour se placer l'un devant l'autre, & ensuite se coler ensemble, ou à la foiblesse de leurs membranes qui avoit toujours cédé à l'impulsion du sang, ou enfin à la trop grande subtilité & rapidité du sang.

## SUR LA GENERATION DE L'HOMME PAR DES OEUFS.

**L**E Système de la génération de l'Homme par des Oeufs, est aujourd'hui assez communément reçu. Outre plusieurs raisons particulières qui l'établissent, l'Analogie générale le favorise, & c'est une preuve assez forte pour ceux qui connoissent la maniere d'agir de la Nature. Toutes les Plantes viennent par des Oeufs; car les Graines sont pour la Physique de veritables œufs, auxquels la Langue a donné un autre nom; tous les Animaux Ovipares doivent constamment leur naissance à des œufs, que les femelles ont jetté hors d'elles; & il y a bien de l'apparence que les Vivipares ne diffèrent des Ovipares, qu'en ce que leurs femelles ont couvé & fait éclore leurs œufs au dedans d'elles-mêmes. Toutes les Plantes, & la plus grande partie des Animaux ont le même principe de génération; l'autre partie des Animaux, & la plus petite, aura-t-elle un principe à part?

Ce-



Cependant, comme il ne faut pas donner legerement des regles à la Nature, & que jusqu'à une évidence incontestable, on est toujours en droit de douter, & d'examiner; M. *Mery* n'est pas encore tout à fait persuadé du Systême des Oeufs, & il y trouve des difficultez considerables, qu'il ne lui paroît pas qu'on ait levées jusqu'à present.

Il faut d'abord pour cette Hypothese que dans ce qu'on appelle les Ovaires de la Femme, il y ait des Oeufs, & il ne s'y trouve que de petites Cellules pleines de liqueur. Un peu de liqueur enfermée dans une cellule ne peut jamais passer pour un œuf, qui doit être un petit corps separé de tout autre, ayant du moins une enveloppe solide qui lui appartienne. On ne voit aux prétendus œufs aucune membrane qui leur soit propre; & celle de leur cellule en est tellement inseparable, qu'il n'y a pas d'apparence que quand ils sortent, ils puissent l'emporter pour s'en revêtir.

De plus, il faut qu'ils sortent, & la membrane commune qui enveloppe tout l'Ovaire est d'un tissu si serré, qu'il est inconcevable qu'elle puisse être pénétrée par un corps rond & mollassé comme un de ces œufs, dont la figure & la consistance sont également opposées à ce qui seroit necessaire pour s'ouvrir un passage.

Les Sectateurs du Systême des Oeufs ne se rendent pas à ces difficultez. 1°. Ils supposent que l'œuf a sa membrane particuliere qui lui sert de coque, qui se détache de l'ovaire, & en sort avec lui. 2°. Ils prétendent que des especes de cicatrices qui se trouvent assez souvent sur la membrane extérieure des Ovaires

de plusieurs Animaux, & de la Femme, font des marques & des traces sensibles de la sortie des œufs.



A ces suppositions, M. *Mery* a opposé des faits, qu'il avoit observez sur le corps d'une jeune femme qui paroissoit avoir eu des enfans.

L'Ovaire gauche étoit absolument sans œufs, quoique de la grosseur ordinaire, & en bon état. Le droit n'avoit que trois petites cellules, mais vuides, & revêtues chacune d'une membrane qui parut absolument inseparable de leur substance.

Ces cellules n'avoient nulle communication au dehors. On n'apercevoit dans leur membrane particuliere aucune ouverture, aucune fente, aucune trace d'un œuf qui en fût sorti; & cependant on reconnoissoit à d'autres marques, que la femme n'avoit pas été stérile.

Il est vrai que la membrane commune & extérieure de chaque Ovaire étoit entrecoupée d'un très-grand nombre de petites fentes; mais ce grand nombre même sert à M. *Mery* contre le Système des Oeufs; car si chaque petite fente avoit été produite par la sortie d'un œuf, cette femme auroit été d'une fécondité inouïe, & par conséquent ces sortes de cicatrices doivent avoir quelque autre cause.

M. *Mery* trouva encore dans le sujet qu'il dissectoit, une preuve que l'on s'est trop hâté de prendre pour des œufs les Vesicules des Ovaires. Il y avoit dans l'épaisseur de l'orifice interne de la Matrice, des Vesicules toutes pareilles, remplies d'une liqueur qui avoit tou-





res les apparences d'être féminale; & ces Vésicules auxquelles on ne peut pas attribuer la source de la génération, en auroient eu cependant l'honneur, si elles avoient seulement été placées dans un lieu un peu plus favorable au Système.

Les difficultez de M. Méry ont excité les Anatomistes de l'Académie à chercher de nouvelles preuves de l'opinion commune.

M. Littré en a cru trouver dans les Ovaires d'une femme qu'il a examinés, ou du moins il y a trouvé des faits qui convenoient mieux à ce Système qu'à tout autre.

L'Ovaire droit \* étoit gros comme un œuf de Cane, c'est-à-dire, beaucoup plus gros que dans l'état naturel. Il étoit séparé intérieurement par une cloison membraneuse en deux cellules membraneuses aussi. Elles n'étoient remplies toutes deux que d'une liqueur aqueuse, un peu épaisse & trouble, en laquelle toute la substance propre de l'Ovaire s'étoit changée. Apparemment cette liqueur en humectant peu à peu les membranes de l'Ovaire, & en s'accumulant dans leur capacité, les avoit étendues, & avoit causé la grande dilatation de cette partie.

A la faveur de cette dilatation, on voyoit fort distinctement deux membranes qui enveloppoient entièrement l'Ovaire, & qui avoient chacune une demi-ligne d'épaisseur. Entre ces deux membranes étoit une substance musculieuse, qui avoit la même étendue, & à peu près la même épaisseur.

Cette substance musculieuse, que cet état ex-

\* Voyez les Mémoires, pag. 143.

traordinaire n'avoit fait que rendre visible, & qui doit être supposée dans tous les autres Ovaires, aura, selon M. *Littre*, plusieurs usages par rapport aux Oeufs. Elle servira à entretenir & à faciliter le mouvement nécessaire des liqueurs dans l'Ovaire; elle fera sur toute cette partie une compression qui empêchera les Oeufs de devenir plus gros qu'ils ne doivent être tant qu'ils y sont renfermez, & qu'ils n'ont pas été touchez de l'esprit seminal du Mâle; mais aussi dès que quelques-uns auront été, & que par là ils seront devenus capables de grossir malgré la compression de la substance musculeuse, elle les obligera par cette même compression à sortir de l'ovaire, ou du moins les y aidera.

Cet Ovaire droit avoit sur sa surface un trou rond de 3. lignes de diamètre, par où apparemment un œuf devoit être sorti; & afin qu'il n'y restât aucun doute, l'œuf se trouva dans la Trompe du même côté, ayant 4. lignes de diamètre; soit qu'il eût cru depuis sa sortie, soit qu'il se fût allongé en sortant par un trou de 3. lignes. Il étoit parvenu tout auprès de la Matrice, mais il n'y seroit jamais entré, parce qu'elle étoit devenue squirreuse, & qu'en s'endurcissant elle avoit un peu retreci, & beaucoup affaibli la partie du Canal de la Trompe qui la pénètre.


L'Ovaire gauche étoit encore beaucoup plus favorable au Système des Oeufs. M. *Littre* en apperçut deux à travers ses membranes, chacun de 4. lignes de diamètre, & qui par conséquent avoient beaucoup grossi. Les membranes de l'Ovaire étoient dans toute leur étendue de demi-ligne d'épaisseur, hormis dans  
les

Les deux autres, en revanche, ne se couvrent pas les uns les autres.

*Mém. de l'Acad 1701. Pag. 52*

*Taches observées dans le Soleil.*

*Janvier 1701.*







les deux endroits, où ces œufs les touchoient. Là, elles étoient aussi fines qu'une peau d'oignon; marque assez sensible que les œufs en grossissant étendent à mesure, & rendent plus mince l'endroit de l'enveloppe commune où ils touchent, se préparent peu à peu une issue, & enfin se la font lors qu'ils sont arrivés à une certaine grosseur, & la membrane à une certaine finesse. M. *Littre* n'a jamais pu trouver, quelque peine qu'il y ait prise, aucune ouverture naturelle dans les membranes communes de l'Ovaire; ainsi il est persuadé que les œufs ne sortent que par une déchirure, & qu'elle se fait ou à quelque endroit des membranes, naturellement moins ferré, ou plutôt à celui que l'œuf a miné insensiblement.

Un des deux œufs étoit entièrement détaché des membranes communes de l'Ovaire, ce qui semble faire évanouir une grande objection.

Encore une circonstance qui n'est pas à oublier. Ces deux œufs étoient parsemez de vaisseaux sanguins fort visibles, comme les jaunes qui sont dans les Ovaires des Volatiles.

Mais si M. *Littre* a vu dans ce même Ovaire aussi distinctement qu'il le pense, un troisième Oeuf dont il a parlé à la Compagnie; si les Philosophes les plus indifférens pour tous les partis, & les plus zélés pour la Vérité, ne sont pas quelquefois sujets, dans des Observations délicates, à voir ce qu'ils croient vrai, le Système des Oeufs est hors de contestation. M. *Littre* trouva un troisième Oeuf, qui ne paroissoit point comme les deux autres, à travers les membranes de l'Ovaire,

qui étoit plus petit , & qui quoiqu'il eût par conséquent moins d'apparence d'être un œuf fécondé , contenoit cependant dans une liqueur claire & mucilagineuse , un Fœtus qui avoit plus d'une ligne de grosseur , sur trois de longueur. M. *Littre* , & quelques autres avec lui , prétendent avoir vû , & même en partie sans Microscope , le cordon ombilical qui attachoit ce Fœtus aux membranes de l'œuf , sa tête , le trou de la bouche , une petite éminence à la place du nez , & enfin le tronc qui se terminoit en sa partie inférieure par deux petits moignons.

L'Oeuf étoit entierement envelopé d'une substance jaunâtre & glanduleuse , épaisse de demi-ligne , à laquelle il tenoit par plusieurs endroits , & qui étoit entourée d'une autre substance entierement musculeuse.

Cet Ovaire gauche étoit aussi bien que le droit , beaucoup plus gros que dans l'état naturel ; peut-être parce que ces trois œufs beaucoup plus gros qu'à l'ordinaire , l'avoient dilaté.

La Trompe droite & la gauche étoient aussi plus grosses qu'elles ne doivent être ; & toutes deux avoient leur pavillon affaissé , & colé au ligament large de la Matrice.

Comme en fait d'Anatomie , les comparaisons d'une espèce à l'autre sont assez concluantes , & que si un Fœtus de Vache vient d'un œuf , la présomption sera grande , & peut-être sûre pour le Fœtus humain ; M. *du Verney* le jeune examina & fit voir à l'Academie plusieurs Portieres de Vache , & quelques unes même où il y avoit des Fœtus de 15 jours , de 3 semaines , d'un mois ; de sorte que les traces

ces de la sortie des œufs devoient être recentes & visibles sur les ovaires.

Il est entré sur toute cette matiere dans un détail anatomique assez exact\*. Il a trouvé que les ouvertures semées en differens endroits sur la surface des Ovaires, & qui doivent avoir donné passage à des œufs, sont ordinairement de la figure d'un demi-Croissant, & que les deux bords de la membrane entr'ouverte passent l'un sur l'autre.

Il a vû de petites Cellules vuides, d'où il y a apparence qu'il étoit sorti des œufs; si ce n'est que la nature ait laissé dans les ovaires des places remplies seulement d'air, & d'esprits, pour donner aux parties ou plus de jeu, ou une action plus vive en de certains temps. Il a découvert des œufs à demi sortis de leur calice, à peu près comme des Glands, & il faisoit passer le soufle entre l'œuf, & le calice; ce qui prouve assez que l'œuf est un veritable œuf, & non pas une simple liqueur contenue dans une cellule. Il a vû même au dessous d'une ouverture, percée naturellement dans la membrane de l'ovaire, un œuf prêt à sortir, & qui effectivement sortoit à demi, quand on pressoit l'ovaire par les côtez.

Il est vrai, ainsi que le remarqua M. Méry, que l'on n'a encore vû aucun œuf entierement flotant dans son calice, comme il seroit à désirer pour ce Système.

Assez souvent il y a sur la surface des Ovaires des Animaux un assez gros Corps spongieux, qui paroît sortir du dedans, & pousser en dehors la membrane extérieure de l'Ovaire, dont

C 4

il

\* Voyez les Mémoires p. 240.

il est revêtu, & par conséquent l'étendre, & la rendre plus mince. Quelquefois ce Corps est percé d'une ouverture à son extrémité, comme un Mamelon. Il semble qu'après s'être en quelque façon jetté hors de l'Ovaire jusqu'à un certain point, il y rentre en s'applatissant peu à peu & par degrez; car on voit de ces corps spongieux en tous les differens états qui sont depuis leur plus grande saillie jusqu'à leur entiere rentrée.

M. du Verney le jeune, en soufflant par l'ouverture extérieure d'un de ces corps, a vû aussi-tôt tout l'ovaire s'enfler, & même ses vaisseaux sanguins. Mais quand il a soufflé par des ouvertures faites avec la Lancette, l'air ne se distribuoit jamais dans l'Ovaire.

Si l'on pouvoit dire que ce corps spongieux est une espece de tuyau destiné à conduire l'œuf hors de l'ovaire, que c'est une partie de l'ovaire cachée & invisible, hormis dans les temps où elle se développe par les mêmes causes qui rendent un œuf fécond, qu'elle n'est faite que pour le besoin de l'œuf, & qu'elle disparoît & s'efface après qu'il est sorti; rien ne seroit plus avantageux au Système qui regne présentement. Mais quoique plusieurs Anatomistes aient eu cette pensée, elle ne semble pas avoir assez de fondement, du moins jusqu'ici. Le corps spongieux ne paroît pas sur les Ovaires, toutes les fois qu'il doit constamment en être sorti un œuf. M. du Verney le jeune conjecture à cause de la communication sensible de ce corps avec les vaisseaux sanguins, que c'est une excrescence qui se forme à leur extrémité, comme la Noix de galle en est une, qui naît à l'extrémité de quelque vaisseau d'un Chêne

ne piqué par certains Insectes.

Ce même corps spongieux qui n'avoit guere été vû que dans des Animaux , \* *M. Littre* l'a trouvé sur l'ovaire d'une jeune Femme grosse de huit mois de son premier Enfant, & morte subitement d'une chute. Il étoit jaune, de la grosseur, & de la figure d'un pois, & s'élevoit au dessus de la superficie de l'ovaire par un trou qu'il paroissoit avoir fait à sa membrane.

Il faut remarquer que l'Ovaire gauche n'étoit pas en état d'avoir pu servir à la génération ; tant parce qu'il étoit flétri, que parce que la trompe de ce côté-là s'y étoit attachée depuis long-temps, & avoit son embouchure tournée de sorte qu'elle ne pouvoit recevoir aucun œuf. D'ailleurs il n'y avoit sur tout l'Ovaire droit nulle autre trace de la sortie d'un œuf que ce corps spongieux ; & par conséquent le Fœtus de cette Femme auroit été éclos d'un œuf, sorti par cet unique canal, s'il étoit vrai d'ailleurs que le corps spongieux en fût un, destiné à cet usage.

---

## SUR LA CIRCULATION DU SANG DANS LES POISSONS.

† **J** Amais peut-être on ne prouvera mieux que par le sujet de cet Article, que la

C 5

Na-

\* Voyez les Mémoires, p. 383. † Voyez les Mémoires, pag. 294.

Nature ayant pris un certain plan général, fait ensuite le diversifier de toutes les façons que demandent les applications particulieres.

L'air est necessaire à tous les Animaux, je suppose que cette verité est prouvée; ils prennent donc tous de l'air. Mais d'abord il y en a dont le sang est naturellement plus vif & plus fluide; il suffit que ce sang aille prendre de l'air dans un certain Reservoir qu'on appelle les Poumons, & delà se répande dans tout le corps avec l'air dont il s'est chargé. Il y a d'autres Animaux dont le sang & toutes les liqueurs sont si grossieres & si glutineuses, qu'un air pris dans un Reservoir commun, & delà distribué dans les parties, ne les animeroit pas assez, & qu'il faut qu'elles soient toutes imprégnées d'air immédiatement. Ces Animaux sont les Insectes, dans lesquels les canaux qui portent l'air, c'est-à-dire les Trachées, regnent d'une extrémité du corps à l'autre, distribuent par tout leurs rameaux, & même dans plusieurs especes ont autant d'ouvertures exterieures percées à droit & à gauche par où elles prennent l'air, qu'il y a d'anneaux sur le corps de l'Insecte, ce qui fait que ces Animaux frottez d'huile meurent, parce qu'on leur a fermé les conduits de la respiration. Voilà déjà la premiere difference qu'il y ait dans la maniere dont les Animaux prennent l'Air.

Si les Animaux ont des Poumons, l'idée générale de cette Mechanique, est que le sang extrêmement divisé, & par là réduit à avoir beaucoup de superficie, se présente à l'air extrêmement divisé aussi; de sorte que chaque petite partie de sang aille prendre sa petite partie

tie d'air. Ainsi dans l'Homme, dans les Quadrupedes, dans les Oiseaux, les Poumons ne font qu'un amas d'une infinité de petites vesicules qui se gonflent d'air, & chaque petite vesicule a ses vaisseaux sanguins très-déliés, dont le sang prend l'air au travers des membranes très-fines de ces vaisseaux.

Le sang impregné d'air doit être distribué dans tout le corps, & c'est le Cœur qui fait seul la fonction de le recevoir & de le renvoyer. Si les Animaux sont destinez à une action continuelle, comme ils le sont la plupart, le Cœur a deux Ventricules séparés, dont l'un sert à recevoir le sang qui par la circulation s'est dépouillé d'air, & à le renvoyer dans le Poumon; l'autre, à recevoir le sang revenu du Poumon, & à le renvoyer dans tout le corps. Par là tout le sang qui va arroser le corps est chargé d'air. Si les Animaux doivent passer des temps considerables sans aucune action vive, comme les Tortues, les Grenouilles, les Serpens &c. leur Cœur ou n'a qu'un seul Ventricule ou en a plusieurs qui communiquent, ce qui revient à peu près au même; de sorte que le sang revenu du Poumon, & chargé d'air, se mêle avec celui qui est revenu du reste du corps, & s'est dépouillé de particules aériennes, & par conséquent le sang poussé par le Cœur dans tout le corps en est moins vif, & moins animé. Cette dernière remarque a déjà été faite dans l'Histoire de 1699\*.

Ce sont là toutes les varietez de la respiration pour les Animaux qui respirent l'air; mais

C 6

les

\* Pag. 49. 45.

les Poissons qui vivent dans l'eau , qui meurent presque aussi-tôt qu'ils sont dans l'air , comment respirent-ils ? Il est constant , & *M. du Verney* le prouve , que cet air dans lequel ils meurent , ne laisse pas de leur être absolument nécessaire.

Il y a toujours beaucoup d'air mêlé & envelopé dans l'eau ; c'est cet air que les Poissons respirent. Ce qu'on appelle leurs Ouïes ; ce sont leurs Poumons ; & toute la Mechanique des Ouïes n'a pour but que de tirer cet air enfermé dans l'eau , & de le présenter au sang de la même maniere dont il y est présenté dans les Poumons qui le prennent immédiatement.

*M. du Verney* a étudié & démêlé dans les Ouïes d'une Carpe cette Mechanique presque infinie & prodigieusement compliquée. D'abord une espece de charpente d'un très-grand nombre de Lames osseuses , subdivisées chacune en une infinité de filets osseux , n'est faite que pour soutenir la multitude innombrable des ramifications d'une Artere qui part du Cœur. Il est visible que cette étonnante quantité de ramifications très-fines sert à présenter le sang extrêmement subdivisé , & , pour ainsi dire , chaque petite particule de sang toute seule. Entre les Lames , & dans toute la texture des Ouïes sont une infinité d'intervalles étroits destinez à recevoir comme feroient des filieres , & à subdiviser en très-petites parcelles l'eau que le Poisson a respirée par la bouche. C'est alors que l'air , auquel en quelque façon ses prisons sont ouvertes , s'échape de cette eau , & va se joindre au sang de toutes les petites arterioles. Comme ces Ouïes ont  
ne-



nécessairement un mouvement alternatif de dilatation & de compression, qui s'exécute encore par d'autres Machines très-déliçates, qu'elles reçoivent l'eau, quand elles se dilatent, & la chassent hors d'elles quand elles se resserrent, il y a plus d'apparence que c'est dans l'instant du resserrement qu'elles obligent l'air exprimé de l'eau à pénétrer les pores des petits vaisseaux sanguins; car cet instant a plus de force que l'autre, & cette action en demande beaucoup. Cette même raison a lieu à l'égard des Poumons vésiculaires comme ceux de l'Homme; & delà M. du Verney conclut que quoique l'air entre dans nos Poumons au moment de l'inspiration, il n'entre dans le sang que dans le moment de l'expiration, & lors qu'un reste superflu sort par la Trachée. Ainsi la véritable inspiration, c'est-à-dire, l'entrée de l'air dans le sang, seroit l'expiration.

La Carpe, & beaucoup d'autres Poissons respirent l'eau par la bouche, & la rendent par les Ouïes, après en avoir tiré tout l'air qu'ils ont pu. En cela ils diffèrent des autres Animaux qui prennent & rendent l'air par les mêmes conduits.

Parce qu'il y a peu d'air dans beaucoup d'eau, le nombre des arterioles où le sang se divise a dû être plus grand dans les Ouïes des Poissons, que dans les Poumons vésiculaires des autres Animaux. D'un autre côté, l'air enfermé dans l'eau y est plus contraint, ses petites lames spirales y sont plus serrées que s'il étoit mêlé avec d'autre air, par conséquent il a plus de ressort; & comme c'est à proportion de son ressort qu'il donne du mouvement & de l'impulsion au sang, une moindre quan-

tité peut faire pour les poissons un assez grand effet.

Lors qu'ils sont dans l'air, ils meurent, parce que les filieres de leurs Oüies qui sont des passages étroits pour l'eau ne le sont pas pour l'air, qui s'en échape trop aisément, & n'est point forcé à entrer dans les arterioles. Ces filieres ne peuvent rien sur la liqueur qui y coule, à moins que de lui faire violence.

Après que le sang des arterioles des Oüies, s'est chargé d'air, il passe par la loi de la circulation dans toutes les petites veines qui leur répondent. Mais ce qui est fort singulier, c'est que, selon l'observation de M. du Verney, les veines des Oüies en étant une fois sorties, deviennent aussi-tôt arteres, & vont se répandre dans toutes les parties du corps, d'où d'autres veines veritables rapportent le sang au cœur.

Ce changement de veines en arteres paroît à plusieurs marques. 1°. Le Cœur n'a qu'un ventricule, & qu'une artere qui va se ramifier & se perdre dans les Oüies. Quels canaux arroseront le reste du corps, & y porteront le sang vivifié par le mélange de l'air? 2°. Les veines des Oüies qui ne sont qu'une infinité de petits rameaux très-fins, portent leur liqueur au sortir des Oüies dans des Troncs beaucoup plus gros, & ces gros Troncs distribuez dans le reste du corps s'y redivisent encore en petits rameaux capillaires, ce qui n'arriveroit point à des veines qui demeureroient veines; car elles finiroient par les plus gros troncs, comme les arteres finissent par les plus petits rameaux. 3°. Au sortir des Oüies, où M. du Verney

Mem. 1701. P. 03.


19 Fevrier

20 Fevrier à 5<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du matin

20 Fevrier à 8<sup>h</sup> du soir

arrut au  
ée 1699  
Roval





ney prétend que ces Troncs qui reçoivent le sang des veines deviennent arteres, ils prennent effectivement la consistance d'arteres, & ont des tuniques ou membranes plus fortes, & plus solides que n'en ont des veines.

Le plan général de la Nature qui a voulu que le sang de tout un genre d'Animaux se mêlât avec l'air dans un Reservoir commun, se partage donc encore en deux branches. Le sang qui a passé par ce Reservoir, ou retourne au Cœur qui le renvoye dans tout le corps, ou s'y répand immédiatement au sortir du Reservoir de l'air. Peut-être cette dernière Mechanique a-t-elle été nécessaire pour les Poissons, parce que leur sang a pris peu d'air, & que l'impulsion qu'il en reçoit s'affoibliroit trop, s'il étoit obligé à reprendre le circuit du cœur. Si nos idées sont vraies, quelle merveilleuse variété de Mechanique par rapport aux differens besoins ! Et si d'autres sujets ont demandé cette même variété de Mechanique, elle sera sans doute encore plus merveilleuse par rapport aux veritables besoins, que par rapport à ceux que nous aurons fausement imaginez.

# D I V E R S E S O B S E R V A T I O N S A N A T O M I Q U E S.

## I.

**M.** *Mery* a fait voir dans le Sinus longitudinal de la Dure-mere d'un Homme qu'il avoit ouvert le matin, plusieurs amas de grains semblables à de petites glandes. Ils étoient placez aux embouchures des veines qui se terminent dans ce Sinus.

## II.

**M.** *Littre* a fait voir sur un Foye humain qui d'ailleurs étoit parfaitement dans l'état naturel, & très-bien conditionné, que les glandes qui ne sont nullement sensibles dans les autres, avoient près d'une ligne de diamètre, & que les extrémités des arteres, & les racines de la Veine porte, de la Veine cave, & des Conduits biliaires qui se terminoient à ces glandes, avoient une grosseur proportionnée, & étoient visibles sans Microscope. Toutes les autres parties du corps de cet Homme, qui avoit été tué, étoient très-bien disposées, & très-saines; & c'étoit apparemment par la première conformation qu'il avoit les glandes du Foye plus grosses qu'à l'ordinaire. Si l'on ouvroit un plus grand nombre de corps, que ce que l'usage permet d'en ouvrir, on trouveroit avec le temps par toutes les conformations particulières, de  
grands

grands éclairciffemens sur la conformation générale.

## III.

Dans cette Femme dont M. *Méry* examina les Ovaires par rapport à la question des Oeufs, & dont nous avons parlé \*, il trouva qu'à l'extrémité des Franges des Pavillons, il y avoit plusieurs petites pierres attachées, de figure différente, mais toutes de couleur d'Ambre jaune. Deux semblables pierres se trouverent aussi sur la membrane de l'Ovaire gauche. M. *Méry* crut que ces petites pierres étoient recouvertes d'une membrane très-fine, parce que de petits vaisseaux sanguins très-sensibles qui rampoient sur la surface de quelques unes, & y formoient des sillons, disparurent après qu'elles eurent trempé trois jours dans l'eau. Apparemment la membrane humectée s'étoit étendue plus également, & les avoit effacés. Cette Femme étoit morte d'un abcès dans le Foye.

## IV.

M. *Dodart* a montré la figure de 12 Pierres qui ont été tirées à un *Italien*. La plus grosse paroît être du diamètre d'un petit œuf, & la plus petite de celui d'une noix. Les autres sont entre deux, plus approchantes de la grosse.

A cette occasion, M. *de la Hire* a dit que depuis peu de temps un Homme travaillé d'une violente Nephretique, étant assis, & s'étant baissé pour écrire à terre en s'amusant, avoit vuide dans cette situation une pierre de la grosseur d'une Olive. Sur cet

exem-

\* Pag. 50.

exemple, un autre attaqué du même mal, en a fait autant avec le même succès. M. Méry a dit que dans cette situation les parois de la Vessie se rapprochant extrêmement, & sa capacité diminuant, l'urine comprimée avoit fait un effort violent pour sortir, & avoit entraîné une pierre dont la grosseur étoit proportionnée à la capacité de l'Uretere un peu dilaté.

## V.

L'Homme de 40 ans, en qui M. Littre trouva le trou ovale encore tout ouvert\*, avoit le Rein droit en grand desordre. Il étoit de 4 pouces de long, sur 2 de large, & avoit 6 lignes d'épais. Sa surface extérieure étoit comme celle d'un rein de Veau, toute élevée en bosses de différente grosseur, au nombre de 18, la plus petite étoit grosse comme une cerise, & la plus grosse comme une noix sans coque. Chacune de ces bosses formoit une cellule membraneuse, remplie d'une matière sans odeur, & sans saveur, & semblable en couleur & en consistance à de la Ceruse détrempée avec de l'huile. Cette matière renfermoit plusieurs grains blancs, gros & durs comme du sable. Toute la substance du rein étoit consumée, & il n'en restoit que les deux membranes, avec les cloisons membraneuses, qui forment les cellules. Les troncs de l'artere, & de la veine étoient fort petits. La surface interne des cellules étoit tapissée de fibres qui faisoient une espece de réseau, assez semblable à celui qu'on remarque dans les Poumons des Tortues de terre. Si ces fibres sont char-

nues,

\* Pag. 46.



mues, comme elles le paroissent, elles doivent être d'un grand usage pour faciliter la circulation des liqueurs dans les reins, & pour exprimer des glandes la matiere de l'urine, & la pousser par les conduits urineux dans le Bassinet. On voyoit 14 trous dans les cellules de ce rein, & 5 dans le bassinnet, par le moien desquels les cellules & le bassinnet communiquoient. Enfin il y avoit dans le bassinnet, de cette matiere blanche dont on a parlé, & une pierre triangulaire, large de 5 lignes, & épaisse de 2. Un de ses angles, qui ressembloit à un petit mammelon, étoit engagé dans le commencement de la partie étroite de l'Uretere, & en bouchoit la cavité, de sorte qu'il n'y pouvoit presque rien passer. Apparemment cette obstruction avoit causé tout le desordre.

L'Uretere de ce rein étoit plus gros qu'à l'ordinaire, principalement en certains endroits, où il se formoit des tumeurs assez semblables à celles du cordon ombilical des Fœtus humains. Cet uretere étoit rempli de la même matiere que les cellules du rein, mais moins blanche, & beaucoup plus épaisse, mêlée aussi de petites pierres. Les parois de ce canal étoient plus épaisses que dans l'état naturel; on apercevoit à leur surface interne plusieurs petits trous, qui sont apparemment les embouchures des conduits excrétoires des glandes de l'uretere, que M. *Littre* avoit déjà observées fort sensiblement en d'autres occasions. Il donne à ces glandes un usage assez vraisemblable. Elles filtrent, selon lui, une liqueur visqueuse, qui enduit l'uretere, & le met à couvert de l'atteinte des sels & des sables de l'urine, qui

qui y passe continuellement pour se rendre dans la vessie.

Le rein gauche étoit la moitié plus grand que le droit, aussi-bien que son artere & la veine, mais son uretere étoit plus étroit. Il étoit très-sain, & apparemment il faisoit seul la fonction des deux; ce qui paroît être l'intention de la nature dans les parties qu'elle a doublées.

## VI.

Dans ce même Sujet, M. *Littre* fut surpris de voir le Pericarde très-étroitement uni à toute la surface du cœur, dont il n'étoit depuis long-temps qu'une simple Envelope. Cet Homme se portoit bien, & n'étoit mort que d'un coup d'épée dans la Cuisse. Il semble donc que le Pericarde n'est pas absolument nécessaire pour filtrer par ses glandes, & pour contenir dans sa cavité une liqueur, qui humecte & ramollisse les Fibres extérieures du cœur, & les rende plus propres à leurs mouvemens. Seulement il est rare que les fonctions du Pericarde manquent.

M. *Littre* assure que dans un très-grand nombre de corps qu'il a ouverts, il n'a jamais trouvé la cavité du Pericarde sans limphe, & que dans deux Pericardes, devenus par maladie extrêmement épais, il a vu des glandes fort sensibles. Il conserve même parmi ses curiositez d'Anatomie un tas de ces glandes pétrifiées.

## VII.

M. *Lémery* a dit que M. *Fornage* Apothiquaire Chymiste à Pontarlier en *Franche-Comté*, lui avoit écrit, qu'un Enfant de cette Ville-là, âgé de 5 mois, avoit une sueur presque continuelle,

le, & principalement à la tête; que cette sueur donnoit à tous les linges de l'Enfant une si forte teinture bleue, qu'on ne la pouvoit absolument ôter avec de l'eau.

## VIII.

M. *Lémery* le Fils a parlé d'un Homme qu'il avoit connu, & à qui on trouva, en l'ouvrant, une conformation de Foye fort extraordinaire. Ce Viscere étoit tout à fait rond, au lieu qu'il est communément convexe d'un côté, & concave de l'autre; & ses deux lobes n'étoient aucunement séparés. L'extrémité du Pylore ou le commencement du Duodenum perçoit la propre substance du Foye, & s'y unissoit intimement. Il n'y avoit point de vesicule du Fiel, mais plusieurs reservoirs qui paroissoient être formés par la réunion des canaux excrétoires & biliaires étendus, & qui servoient de Vesicule en communiquant la bile au Duodenum par plusieurs petits conduits. Le canal Pancrati-que se réunissoit aussi au Duodenum en cet endroit.

On trouva à cet Homme plusieurs causes de mort; les Poumons entierement gâtes, des Polypes dans les Oreillettes, & dans les Ventricules du Cœur; mais ce qui pouvoit avoir rapport immédiatement à la construction particuliere de son Foye, c'est que toutes ses parties étoient teintes d'un suc jaunâtre tant en dedans qu'en dehors. Il avoit eu six ou sept ans avant sa mort une tumeur dure & squirreuse à l'endroit qui répond au petit lobe du Foye, mais il en avoit été guéri. Quelque temps après il avoit été attaqué d'une jaunisse universelle, & de coliques furieuses, & toutes les matieres qu'il vuidoit ou par les urines, ou

ou par l'autre voye, étoient d'un jaune de safran. Tout cela semble se rapporter aux mauvaises filtrations de la bile, & au vice de conformation du Foye. Il y a apparemment beaucoup plus de conformations particulieres qu'on ne pense, car le nombre des corps humains que l'on ouvre est fort petit en comparaison de ceux que l'on n'ouvre pas; & dans ce petit nombre de ceux qu'on ouvre, on trouve assez souvent des structures singulieres. Les maladies qui ont de pareilles causes doivent être le plus souvent inexplicables, & qui pis est, incurables. M. *Lémery* le Fils a remarqué que la maladie dont étoit mort l'Homme qui avoit ce Foye extraordinaire, paroissoit être hereditaire dans sa Famille. Cette conformation de Foye le feroit-elle aussi?

---

**M** *Méry* a donné deux Descriptions Anatomiques, l'une d'une Taupe mâle, l'autre d'un Animal venu de la Ménagerie de *Ver-sailles*, & que l'on donnoit pour un Rat d'*Inde*, mais qui en differoit en plusieurs choses. Comme ces Descriptions n'établissent, ou ne confirment aucun Systême, qu'elles ne renferment point de curiosité qui interessât assez le Public, & que leur prix consiste dans une extrême exactitude, on a cru les devoir laisser dans le Tresor de l'Academie, d'où peut-être trouvera-t-on l'occasion de les tirer quelque jour avec plus d'utilité.

Il n'en est pas de même d'un grand recueil d'Observations de M. *Méry* sur les Hernies \*.

On

\* Voyez les Memoires, pag. 356.

On le donne au Public parce qu'on l'a cru très-utile pour la pratique; mais on n'en fait point d'Extrait dans cette Histoire, tant parce que la matiere est d'elle-même assez intelligible, que parce qu'elle ne seroit pas au goût de ceux qui ne cherchent que le brillant de la Theorie & des Systêmes.

Par les mêmes raisons, l'on ne dit rien ici des \* Observations sur plusieurs Hydropisies, faites par M. du Verney le jeune.

**M** Du Hamel, poursuivant son Histoire Anatomique, a traité du Cerveau, des sentimens dont on lui attribue l'origine, du sens du Toucher, & de celui de l'Odorat. Il a toujours comparé les découvertes anciennes aux modernes, pour nous donner toute la gloire de nos progrès; mais en même temps il a bien fait voir le foible ou les difficultez des meilleures hypotheses modernes, pour ne pas permettre aux Philosophes d'aujourd'hui de se reposer avec trop de confiance dans leurs pensées.

**C**ette année, M. Gaetano Giulio Zumbo de Syracuse, apporta à la Compagnie une Tête d'une certaine composition de cire, qui représente parfaitement une Tête préparée pour une démonstration anatomique. Les plus petites particularitez du naturel s'y trouvent, veines, arteres, nerfs, glandes, muscles, le tout colorié aussi comme nature. La Compagnie a fort

\* Voyez les Memoires, pag. 193.

fort loué cet Ouvrage, & a jugé que l'invention meritoit d'être suivie. Si l'on avoit de pareilles représentations de toutes les parties du Corps humain, on feroit exempt de l'embarras de chercher des Cadavres, que l'on n'a pas quand on veut, & l'étude de l'Anatomie deviendroit moins dégoûtante, & plus familière.

On a appris depuis avec déplaisir la mort de M. Zumbo. Si son Secret est perdu avec lui, c'est du moins un secours pour le retrouver, que de savoir qu'il a été trouvé par lui. Il y a une infinité de choses qu'on ne découvre pas, faute de les croire possibles.

~~~~~

## C H I M I E.

### A N A L Y S E S

*De la Coloquinte, du Jalap, de la Gomme gutte, & de l'Ellebore noir.*

DANS l'Examen que M. Boulduc a entrepris de tous les Purgatifs, il y comprend ceux même qui par leur violence ont paru si redoutables, que la Medecine n'ose presque les employer. Peut-être ces Mixtes une fois bien connus, se laisseroient-ils dompter par de certaines préparations; & leurs effets étant réduits à un degré salutaire, ce seroient de nouveaux

veaux remèdes, dont on auroit enrichi la Médecine.

\* La Coloquinte est une Plante qui tient de la nature de la Courge sauvage. Son Fruit est un Purgatif, mais d'une telle force, & même d'une telle malignité qu'il fait très-souvent venir le sang. Delà quelques-uns ont conclu, que la Coloquinte par ses sels volatils rendoit le sang beaucoup plus fluide, ce que M. *Boulduc* n'a pas trouvé par ses expériences. Il a mis une assez bonne quantité de Coloquinte en poudre dans du sang nouvellement tiré, qui n'a pas laissé de se coaguler comme à l'ordinaire. Mais il est vrai que cette expérience ne conclut pas tout à fait pour le sang qui couleroit encore dans les veines. La coagulation du lait s'est faite aussi malgré la Coloquinte.

Le peu de succès des efforts qu'on a faits jusqu'ici pour corriger ce remède, n'a point empêché M. *Boulduc* d'y faire les siens. Il a d'abord examiné la Coloquinte en la distillant dans la Cornue par portions, selon la méthode commune; mais comme cette Méthode ne donne assez souvent qu'une connoissance générale & superficielle des Mixtes, M. *Boulduc* a eu recours à d'autres voyes, dont on a déjà vu l'essai & le succès dans son Analyse de l'*Ipecacuanha*, Hist. de 1700. †

Il a fait fermenter 4 onces de pulpe de Coloquinte avec 6 livres de très-bon Moût de vin pendant 10 ou 12 jours, après quoi il a distillé ce mélange au Bain de Vapeur par portions. La première portion de 8 onces fut très-claire, médiocrement spiritueuse, & cependant très-odo-

\* Voyez les Mémoires, pag. 15. † Pag. 52.

odorante, & très-amere. Les autres diminuerent de qualité par degrez ; & quand la liqueur fut tout à fait insipide, M. *Boulduc* arrêta la distillation, & fit de ce qui restoit un Extrait assez solide de 2 onces  $\frac{1}{2}$ .

Après cela, il en vint aux experiences sur des Malades, avec toutes les précautions, & les ménagemens nécessaires. Une once de cette premiere portion qui étoit venue par la distillation causa de grandes nausées, & de grandes coliques sans effet, & il les fallut appaiser par d'autres remedes. Deux onces de la même portion firent leur effet, mais avec des coliques ; ce qui marque en même temps & que ce remede donné en trop petite quantité ne fait que du mal, & que donné en une quantité convenable, il fait trop de mal.

Mais il n'en alla pas de même de cet Extrait qui fut fait après la distillation. M. *Boulduc* en donna 10 grains seulement qui opererent sans violence, & sans irritation, & cela peut avec assez de vraisemblance être attribué aux sels essentiels du Vin, dont l'acide avoit reprimé, & comme fixé le sel volatil de la Coloquinte.

Ensuite au lieu de Moût, M. *Boulduc* employa l'Eau, & mit en digestion pendant 15 jours 16 onces de pulpe de Coloquinte avec 6 pintes d'eau bouillante, après quoi il distilla le tout. Les liqueurs qui vinrent de la distillation n'eurent rien de pénétrant, ni de volatil, nulle faveur, nul effet, prises intérieurement. Mais la distillation cessée, l'Extrait qui fut fait de la matiere qui resta, se trouva très-salutaire. C'étoit un Purgatif doux, & qui en petite quantité avoit assez d'action. Peut-être comme la  
subf-



substance de la Coloquinte est extrêmement spongieuse, ses parties mucilagineuses & crasses, qui sont en grand nombre, sont les plus nuisibles, & une longue digestion dans une grande quantité d'eau, les atténue, les subtilise, & les dissout. Aussi l'Extrait fait de cette manière est-il fort pur.

Les Experiences qui suivirent, confirmerent cette pensée. *M. Boulduc* tira de la Coloquinte toutes les teintures qu'il en put tirer par le moyen de l'eau; & puis de ces teintures, il en separa par le filtre la partie claire d'avec la mucilagineuse, & fit un Extrait solide de l'une & de l'autre. L'Extrait de la premiere fut un Purgatif plus efficace, quoique plus doux, que celui de la seconde.

Enfin il restoit de donner à la Coloquinte l'Esprit de vin pour dissolvant. De 8 onces il ne vint que demi-once d'Extrait résineux, au lieu que du même poids il en étoit venu par le moyen de l'eau près de 3 onces d'Extrait salin, en comptant celui de la partie mucilagineuse, avec celui de la partie claire. Par là, il est manifeste que la Coloquinte contient beaucoup plus de sels que d'huile ou de soufre; & il devient très-probable que ces sels, principalement les plus grossiers, enveloppez dans la partie crasse, causent la violence de ce Purgatif.

*M. Boulduc* a examiné encore d'autres Purgatifs, dans le même esprit, & dans les mêmes vûes.

\* Le Jalap est une Racine qui vient de l'*Amerique*. C'est un bon Purgatif, mais fort négligé,

\* Voyez les Mémoires, pag. 139.

gé, si ce n'est chez les Empiriques, qui s'en servent beaucoup, parce qu'il coûte peu, & fait de très-bons effets; & il est surprenant que cette même raison n'en rende pas l'usage plus général.

Par les Extractions que M. *Boulduc* a faites, tant de la partie saline, que de la résineuse, il paroît que la partie saline l'emporte considérablement sur l'autre pour la quantité. Elle purge, mais trop faiblement. D'ailleurs la partie résineuse fait trop de désordre en purgeant, elles ont besoin de demeurer unies l'une à l'autre, & ce remède sort tout préparé des mains de la Nature.

\* La Gomme-Gutte ainsi nommée d'une prétendue vertu spécifique, que l'on s'est flattée qu'elle avoit pour la Goutte, est une Gomme qui vient des *Indes* tant Orientales qu'Occidentales, & c'est un puissant, mais dangereux Purgatif, & Emetique.

L'Esprit de vin qui dissout presque entièrement cette matière, & n'en laisse qu'une très-petite portion, à laquelle il ne peut mordre, l'Eau qui selon toutes les apparences ne la dissout point à proprement parler, & ne fait que l'étendre, & en écarter les parties, sont d'assez fortes preuves, que la Gomme-gutte est toute résineuse ou sulfureuse. Outre les expériences de l'eau & de l'esprit de vin, M. *Boulduc* en rapporte quelques autres qui tendent à démêler la nature de ce Mixte.

Mais la grande importance, est d'en corriger la malignité, & d'en conserver la vertu. Il y a pour cela plusieurs moyens Chimiques, &

\* Voyez les Mémoires, pag. 172.

& favans. M. *Boulduc* en propose un très-simple, très-propre à devenir familier, qu'il a souvent employé avec succès, & qu'il semble préférer à tous les autres.

\* L'Elleboire noir, car M. *Boulduc* ne toucha point encore au blanc, qui est si terrible, & que les Anciens n'ont employé qu'avec de si grandes précautions, a peu de résines, & beaucoup de sels.

L'Extrait fait d'abord avec l'eau donne tout ce qu'on en peut tirer, & le résidu ne donne plus rien par l'esprit de vin; marque évidente que les sels, lors qu'ils sont en grande quantité, étendent & dissolvent les souffres, & les entraînent avec eux. L'Extrait purement résineux de l'Elleboire noir purge avec irritation & peu; l'Extrait de la matière dépouillée de ses souffres, fait avec l'eau, purge peu, ou point, mais pousse par les urines, & l'Extrait fait d'abord avec l'eau sans esprit de vin, purge bien, doucement, & utilement.

M. *Boulduc* a observé la même chose sur tous les Purgatifs, d'où il conclut généralement qu'il faut que les sels soient mêlez avec les souffres; parce que les sels, s'ils étoient seuls, auroient trop peu d'action, & que les souffres seuls picoteroient trop violemment par leurs parties ignées, & même picoteroient souvent sans effet, les fibres de l'Estomac, & que d'ailleurs les résines y demeurent trop longtemps indissolubles. Un Extrait fait avec l'esprit de vin n'a que des souffres; celui qui est fait avec l'eau entraîne d'ordinaire assez de souffres avec les sels, seulement la matière est

D 3

pu-

\* Voyez les Mémoires, p. 252.

purifiée de ses parties trop terrestres.

Il faut remarquer que l'Ellebre noir , sur lequel M. *Boulduc* a travaillé, étoit venu des Montagnes de *Suisse* , & non pas par la voye d'*Angleterre*. Celui-ci est beaucoup plus foible.

---

## S U R L E S E A U X D E P A S S Y.

**D'**Anciennes Observations , quelque exactes qu'elles ayent été , & les conclusions qu'on en a tirées , ne doivent pas passer pour des Veritez qu'il ne soit plus permis de revoquer en doute , ni pour des choses réglées auxquelles on ne touche plus. Qui sait si les sujets n'ont point changé depuis les Observations ? il faut toujours revoir , toujours retourner sur ses pas , & ne se croire jamais dans une possession paisible des Veritez physiques.

Dans les commencemens de l'Academie , feu M. *du Clos* examina avec un extrême soin plusieurs Eaux minerales de *France* , & entre autres , celles de *Passy* près de *Paris*. Il trouva qu'elles contenoient peu de sel virriolique , peu de particules de fer , & beaucoup de matiere plâtreuse , & jugea delà avec raison qu'elles devoient avoir peu de vertu. M. *du Hamel* en a parlé ainsi dans son Histoire Latine de l'Academie.

Ces Eaux ont été donc assez abandonnées , & il étoit fort naturel qu'on negligéât de les  
exa-

examiner de nouveau. Cependant M. Lémery le fils les a étudiées comme si elles ne l'avoient jamais été, & les a effectivement trouvées fort différentes de ce qu'elles étoient.

Elles ne sont plus plâtreuses, ni au goût, ni par les expériences Chimiques. M. Lémery qui a voulu trouver la cause de ce changement, a appris que quelque temps avant les observations de M. du Clos, on avoit remué des plâtres à Passy. Ils avoient pû se mêler avec les eaux, & les alterer pour un temps.

Ces Eaux délivrées de ce plâtre qui y dominoit, sont composées de deux sortes de parties, d'un esprit vitriolique, & d'une matière terrestre, qui renferme encore un sel acide, & est jointe à une poudre très-fine de rouillure de fer.

L'esprit vitriolique se fait connoître, & par un goût manifeste, & par le Tournesol qui rougit, & par la teinture de Noix de galle qui mêlée avec ces eaux leur donne une couleur noirâtre, ce qu'elle fait toujours avec le Vitriol, & par d'autres expériences chimiques, qu'il a été plus utile de faire, qu'il ne le seroit de les rapporter toutes ici.

Mais cet esprit vitriolique est très-leger & très-volatil. Il n'y a que les eaux nouvellement tirées de la Fontaine, qui ayent ce goût de vitriol, ou qui en donnent des indices.

L'autre partie qu'elles contiennent, se découvre aisément par l'évaporation. Il s'attache aux côtes du vaisseau une rouillure de fer assez reconnoissable, & il se précipite au fond une terre, qui mise sur la langue paroît salée,

& qui poussée à un grand feu , fournit un esprit acide.

La matiere terrestre des Eaux de *Passy* , a cela de singulier , que tandis qu'elle est chargée de sels acides , elle fermente avec les acides , quoiqu'elle dût alors fermenter avec les alcali , & que lors qu'elle est dépouillée de ses sels acides par la calcination , qui doit l'avoir rendue de nature alcaline , elle cesse de fermenter avec les acides.

Mais si on suppose avec M. *Lémery* que la fermentation ne vient pas uniquement de la différente configuration des acides , & des alcali , mais aussi de la difficulté que les acides trouvent à pénétrer les alcali , & de l'effort qu'ils font pour écarter ce qui s'oppose à cette union , il sera aisé d'imaginer que les pores de cette matiere terrestre , lorsqu'ils sont déjà en partie remplis de leurs acides naturels , sont plus difficilement pénétrés par les acides étrangers , au lieu que quand ils ont été entièrement ouverts par la calcination , & que leurs acides ont été enlevés , ils reçoivent sans nulle résistance , & par conséquent sans fermentation , les nouveaux acides qu'on y verse.

La nature de ces Eaux une fois connue , il ne seroit pas impossible de conjecturer à quelles maladies elles peuvent être propres , mais l'expérience est encore plus sûre. M. *Lémery* s'est exactement informé de leurs effets sur le lieu même , & voici ce qu'il en a appris.

Dans le commencement qu'on en prend , elles purgent un peu.

Elles sont très-bonnes dans la plupart des maladies du bas ventre causées par quelque em-  
bar-

barras qui s'est formé dans les viscères , comme dans la rate, dans le foye, &c.

Un Homme fort incommodé en vint prendre en 1699. & en ayant continué l'usage pendant quelque temps, il vuida un abcès par les selles & fut entierement guéri.

Un Malade qui en venoit prendre les matins pendant l'Eté en 1700. jetta huit ou dix jours après l'usage de ces eaux une assez grosse pierre, & ayant encore continué à en prendre pendant trois semaines, il vuida beaucoup de matiere sablonneuse; & ne sentit plus aucune incommodité.

Enfin M. *Lémery* a été lui-même témoin du bon effet de ces eaux dans plusieurs maladies. Entre autres personnes , une Dame de sa connoissance, qui étoit tourmentée d'un vomissement très-cruel aussi-tôt qu'elle avoit mangé, & qui avoit fait inutilement toutes sortes de remedes, eut enfin recours aux Eaux de *Passy*. Elle en prit pendant quelques jours sans aucun soulagement considerable, mais on s'avisa d'y mêler une fois ou deux quelque purgatif, & la Dame ayant continué l'usage de ses eaux, fut enfin tout-à-fait guérie.

Il peut paroître étonnant que le Vitriol étant capable par lui-même de faire vomir, des eaux vitrioliques guerissent un vomissement. Mais M. *Lémery* répond que deux causes concouroient apparemment à former cette maladie; des matieres acres qui picotoient les fibres de l'estomac, & la foiblesse de ces fibres incapables de résister à ce picotement. Le vitriol des eaux de *Passy* qui est en petite quantité n'eut pas la force d'exciter dans l'estomac de grandes secousses; & d'ailleurs sa volatilité

ne lui permit pas d'y séjourner assez long-temps pour les exciter. Il ne put donc que faire évacuer doucement les matieres acres , encore eut-il besoin d'être aidé par un autre purgatif, qui apparemment donna le premier branle à cette operation. D'un autre côté , la partie ferrugineuse des eaux de *Passy*, astringente par sa nature , resserra , & par conséquent fortifia les fibres de l'estomac , & il se trouva dans ces eaux les deux principes qui répondoient aux deux causes de la maladie.

Comme ces Eaux ne sont pas fort en vogue, il n'est pas possible de donner une longue liste des guerisons qu'elles ont faites, mais en voilà peut-être assez pour les tirer de l'oubli , & même du décri où elles étoient. L'extrême commodité dont elles seroient à cause du voisinage de *Paris* doit inviter à éprouver plus soigneusement leur vertu , si ce n'est que ce même voisinage de *Paris* leur nuise d'un autre côté.

En cas que les recherches & le témoignage de M. *Lémery* en rétablissent l'usage, du moins pour quelques personnes , il ne sera pas inutile d'avertir, 1°. Qu'à cause que leur esprit vitriolique se dissipe fort aisément , & fort vite, il les faut prendre sur le lieu ; & de plus, dans une saison qui ne soit pas trop chaude. 2°. Qu'à cause que cet esprit est en petite quantité , il ne les faut prendre , ni dans un temps de pluies fréquentes, ni dans un temps trop froid.

Les Eaux de *Forges* que l'on transporte assez souvent à *Paris* ne contiennent que les mêmes principes que celles de *Passy*, & perdent beaucoup de leur vertu parce qu'elles sont trans-

por-



portées de loin. Ainsi il vaudroit mieux prendre à *Paris* des eaux de *Passy* que des eaux de *Forges*, & la commodité en seroit beaucoup plus grande.

---

## SUR LES FERMENTATIONS.

\* **L**A Chimie est sortie à la fin des ténèbres mystérieuses dont les faux Philosophes l'avoient envelopée à dessein, mais il lui reste encore une partie de son obscurité naturelle. On a saisi avidement le Système ingénieux & agréable des Acides, & des Alkali, & M. *Homburg* juge qu'on pourroit bien l'avoir rendu trop général. Dès que l'on voit une fermentation de deux matieres mêlées ensemble, ou une effervescence, ou une ébullition, ce sont aussi tôt des Acides & des Alkali, & l'on est content de cette explication.

Il y a encore sur ce point une erreur assez commune; on confond la fermentation, l'effervescence, & l'ébullition. M. *Homburg* croit ces trois effets fort différens, & après les avoir démêlés, il prétend qu'ils sont quelquefois produits par d'autres causes que par le mélange des acides, & des alcali.

Il en donne un exemple remarquable dans une effervescence de deux liqueurs; effervescence la plus parfaite qui puisse être, puisqu'elle produit une grande flamme.

D 6

C'est

\* Voyez les Mémoires pag. 124.

C'est là un des miracles de la Chimie. Deux liqueurs froides étant mêlées ensemble, on en voit sortir tout à coup un grand feu ; on, ce qui peut être encore plus étonnant pour le spectacle, on met le feu à de la poudre à canon, en versant de l'eau dessus.

Un Auteur *Danois* a parlé le premier d'une expérience semblable vers le milieu du Siècle passé, mais il l'avoit si peu circonstanciée, peut-être parce qu'il n'y avoit pas fait lui-même assez d'observations, qu'elle ne réussissoit presque jamais à ceux qui la vouloient faire après lui. Enfin M. *Homborg* l'ayant tournée de bien des manieres différentes, en a trouvé le principe général.

Un Esprit acide, mais extrêmement pur & déslegmé, étant mêlé avec une Huile essentielle de Plante aromatique, qui ne contienne aucun acide, fait une effervescence accompagnée de flame.

Il est visible que cet effet doit venir d'un mouvement très-rapide, avec lequel l'esprit acide s'empare des souffres de l'huile, & s'y unit ; & pour donner à ce mouvement toute l'impetuosité dont il est capable, il faut que d'un côté les sels acides soient dans l'Esprit en la plus grande quantité possible, c'est-à-dire que l'Esprit soit extrêmement déslegmé, & que d'autre côté l'huile essentielle, parfaitement privée de tout acide, reçoive dans toutes ses parties l'action de l'acide étranger qu'on y versera.

Faute d'une extrême attention à ces deux circonstances, l'opération manque ; & elle est d'ailleurs si délicate, qu'on l'a vûe manquer plusieurs fois dans l'Académie quoiqu'avec un  
Es-

Esprit acide, & une Huile essentielle très-bien conditionnez, seulement parce que le verre où on les méloit, ayant été bien lavé, & bien essuié avec un linge, ne l'avoit pourtant pas été assez exactement, & qu'il y restoit quelques petites gouttes d'eau imperceptibles.

Les Huiles essentielles des Plantes aromatiques de l'*Europe* ne réussissent point, il n'y a que celles des Plantes aromatiques des *Indes*; apparemment, dit M. *Homborg*, parce que dans les Plantes de nos climats froids, les souffres qui composent leurs huiles, ne montent pas de la terre si purs, & si dégagés de tout acide. Peut-être ces mêmes souffres ne sont-ils pas si bien travaillés par notre Soleil. Enfin la différence est telle qu'une huile essentielle d'une Plante aromatique de ce pays-ci, mêlée avec l'huile d'une plante des *Indes*, l'empêche de prendre feu.

Il y a plus. Le Camphre est de toutes les Resines la plus inflammable. Qu'on la dissolvent dans de l'huile de Cannelle, qui prenoit feu avec l'esprit de Nitre, il semble qu'on donne à cette huile une nouvelle facilité de s'enflammer; mais l'expérience fait voir tout le contraire, l'huile de Cannelle ne s'enflame plus; c'est que le Camphre est naturellement mêlé d'un acide, comme toutes les resines.

Il est aisé de conclurre que le Système des Acides, & des Alkali, ne peut s'étendre à ces expériences. Ce sont ici des matières sulfureuses, & non des alkali, qui font avec les acides de si violens effets, & ceux des acides & des alkali ne sont pas si grands.

# S U R   L E S A N A L Y S E S D E S   P L A N T E S.

\* **L**E Feu est un agent si violent, que quand on l'employe dans des Analyses, on a toujours sujet de craindre qu'il n'ait produit lui-même les Principes qu'il semble tirer du Mixte, ou que du moins il n'altère beaucoup ceux qui y étoient naturellement. Et, ce qui rend cette crainte encore plus legitime en fait de Plantes, il y en a telle qui est potagere, & telle autre qui est un poison, & cependant leurs Principes tirez par le feu sont aussi parfaitement semblables que ceux de la même Plante, analysée deux différentes fois. De plus, le Mixte une fois réduit par le feu en ses Principes, ne se peut plus recomposer; & pour-quoi cela, si ces Principes sont les veritables?

Cette question qu'il est si important de terminer pour savoir à quoi s'en tenir sur les Analyses des Plantes, a été examinée avec soin par M. *Homborg*. Il resulte des experiences qu'il a faites dans ce dessein,

Que ces 4 Principes, Sels, Huile, Eau, & Terre, se trouvent toujours dans les Vegetaux de quelque maniere qu'on les analyse.

Que

\* Voyez les Memoires, pag. 148.

Que selon les différentes analyses, ces Principes sont plus ou moins volatils ou fixes.

Que cette différence de volatilité & de fixité ne vient pas seulement de la différente force du feu, mais qu'elle peut venir de la fermentation du Mixte qui aura précédé l'analyse, parce que toute fermentation dégage naturellement les matières volatiles d'avec les fixes, & par conséquent les dispose à une séparation encore plus parfaite par le feu.

Qu'un grand feu rendant différens Principes également volatils, les confond dans l'analyse.

Que le feu fait toujours évaporer du Mixte des parties qui ne se trouvent plus.

Que pour avoir les Principes aussi purs qu'il se puisse, il ne faut employer qu'un petit feu, & la fermentation.

Que comme la constitution & la vertu d'un Mixte consistent dans la dose exacte, & dans l'arrangement, & la contexture de ses Principes, il n'est pas étonnant, ou que deux Plantes fort différentes aient été altérées par le feu de manière qu'il ait détruit ce qui les rendoit différentes, ou que le même Mixte une fois décomposé, ne se puisse plus rétablir.

Il semble donc que l'Académie perde par là le fruit d'un très-grand nombre d'Analyses de Plantes, qu'elle a faites, mais la seule Vérité importe à l'Académie. D'ailleurs sans ce grand nombre d'analyses, on n'auroit pas su assez certainement à quel point, & en quel sens elles étoient toutes semblables, & enfin en sondant & en interrogeant la Nature de plusieurs

SUR LES  
SELS VOLATILS  
DES PLANTES.

\* **C**'Est une espece d'Axiome en Chimie, que le mélange des Acides, & des Alkali, doit produire un mouvement & une ébullition, qui n'est que l'action même, par laquelle ces deux especes differentes de Sels se pénètrent, & s'unissent intimement, & que de cette union doit naître un Sel moyen, que l'on appelle un Sel salé, tel qu'est le Sel ordinaire, ou le Sel armoniac, d'où il s'ensuit que les Acides & les Alkali ne peuvent être ensemble sans se combattre d'abord, & sans se détruire ensuite.

Cependant M. *Homborg* a trouvé une liqueur tirée des Plantes, où ces deux especes ennemies sont en repos, & dans une parfaite tranquillité; & il n'a pas manqué de chercher à approfondir ce Phenomene si étonnant pour un Chimiste.

Après avoir tourné ses operations de plusieurs manieres differentes, selon qu'il étoit conduit par ses conjectures, & par les lumieres qu'il entrevoyoit, il a trouvé que le Principe

\* Voyez les Memoires, pag. 288.

cipe chimique du mouvement des Acides avec les Alkali subsistoit toujours; mais qu'il y avoit une restriction, qui à proprement parler n'en est pas une, & qui devoit naturellement être sous-entendue, c'est-à-dire qu'il faut une certaine proportion de forces entre ces deux sels qui doivent agir l'un sur l'autre.

Ainsi un Acide tiré des Plantes, comme le Vinaigre distillé, n'agit point sur un bon Esprit d'urine fort chargé de sels alcali, & volatils; parce que d'un côté l'Acide est trop foible, & de l'autre, l'Alkali trop fort. Un acide vegetal est un sel de la terre, qui a été succé par la Plante, qui s'y est brisé, atténué, & par conséquent affoibli, par les circulations qu'il y a faites, & par les fermentations qu'il y a essuies. De plus, si par l'art des Hommes, ce même sel est entré dans la composition du Vin, & ensuite dans celle du Vinaigre, ce sont encore autant de fermentations nouvelles, & de nouvelles subdivisions de ce corps. D'ailleurs un Esprit d'urine que l'on suppose très-bon, & fort chargé de sels volatils est plein des parties solides & massives, qui naturellement se serrent les unes contre les autres, & en sont plus difficiles à ouvrir, & à enfoncer.

Et ce qui prouve assez bien cette conjecture, c'est qu'un acide mineral, qui n'a point souffert toutes les alterations du vegetal, fait sans difficulté sur l'Esprit d'urine, ce que le vegetal ne peut faire, & que le vegetal devient capable du même effet, si l'on affoiblit l'Esprit d'urine par une certaine quantité de flegme, ou d'eau.

M. Homberg en mêlant des sels acides avec  
des

90 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE  
des sels alcali, ou urineux, vegetaux les uns  
& les autres, a été surpris de voir qu'un sel  
salé, qui s'en étoit formé, s'élevoit au haut  
du Vaisseau. Jamais les Plantes n'avoient don-  
né un sel salé qui fût volatil. Ce seroit tou-  
jours là une découverte pour la Theorie de la  
Chimie; mais, ce qui est plus considerable,  
ce nouveau sel est medicinal. Il arrive souvent  
aux Chimistes, & aux autres Physiciens qu'en  
chemin d'une verité purement speculative, ils  
rencontrent quelque chose d'utile.

---

D I V E R S E S  
O B S E R V A T I O N S  
C H I M I Q U E S.

I.

**M.** *Lémery* a dit que deux ou trois Femmes  
avoient été absolument guéries d'une  
extinction de voix par les Vulneraires, com-  
me la Demoiselle dont il a été parlé dans  
l'Histoire de 1700. \* mais qu'à la verité ce re-  
mede n'avoit pas eu le même effet sur d'autres  
personnes. On voit déjà que les Vulneraires  
ont rapport à l'extinction de voix; mais ce  
n'est qu'à certaines especes de ce mal, que le  
temps & l'experience feront démêler d'avec  
les autres.

II.

*M. Lémery* le fils a continué de travailler sur  
les

\* Pag. 55.



les Plantes antiscorbutiques, & ayant commencé par le Cochlearia, selon qu'il a été dit dans l'Hist. de 1700. \* il a passé au Cresson aquatique, dont il a montré les distillations à la Compagnie. Voici la plus importante, & la plus medicinale de ses observations.

Il a mêlé exactement dans une Cucurbite, trois livres de Cresson aquatique tendre, récemment cueilli, & bien écrasé, deux livres de suc de Cresson nouvellement tiré, deux livres de Cendre d'*Auvergne*, & demi-livre de sel armoniac en poudre. Il a couvert la Cucurbite de son chapiteau, il a luté exactement les jointures, & après deux jours de digestion, il a mis distiller la matiere au Bain marie. Il en a tiré 44 onces d'une liqueur spiritueuse, saline, volatile, pénétrante, & qui par la plupart des indices chimiques est alcaline. Elle est bonne pour le Scorbut, non-seulement par la substance la plus volatile du Cresson qu'elle contient, mais encore par le Sel armoniac qui s'y est mêlé.

La Cendre d'*Auvergne* qui étant tirée de plusieurs Plantes nées dans des Montagnes fort exposées au Soleil, est toute remplie de sels alcali, a été employée dans cette operation pour separer les acides volatils du Sel armoniac d'avec sa partie fixe.

### III.

A l'occasion d'un Discours imprimé sur la Glace, M. *Homborg* a dit que des parties égales de Sublimé corrosif, & de Sel armoniac, & quatre de Vinaigre distillé mêlées ensemble, se gèlent, & rafraichissent une Bouteille plongée

\* Pag. 77.

gée dans ce mélange, & que pour faire servir de nouveau au même usage le Sel armoniac, & le Sublimé corrosif, il n'y a qu'à évaporer le Vinaigre.

**M***de Fronville*, qui avoit fait de belles cures, avec un secret que l'on appelloit Or potable, ayant obtenu du Roi la permission de travailler un an avec des Fourneaux, pourvû que ce fût sous les yeux & sous la direction de l'Academie, elle nomma pour voir & pour examiner les operations de ce Chimiste, Messieurs *Homberg* & *Lémery*.

Ils rapporterent à la Compagnie que *M. de Fronville* leur avoit fait voir une dissolution d'or assez semblable à une dissolution faite avec l'eau regale ordinaire, & un dissolvant qui n'étoit qu'une espece d'eau regale foible; que cependant *M. de Fronville* prétendoit que c'étoit là le dissolvant universel, ou l'Alkaest de *Paracelse* & de *Vanhelmont*, tiré enfin de dessous les Enigmes qui l'envelopoient, qu'ils avoient vû une matiere blanche & crystaline, sublimée & encore attachée au cou d'une Cornue, que *M. de Fronville* nommoit Sel, quoiqu'elle n'eût presque pas de goût, & ne se fondît qu'en partie dans la bouche, que c'étoit avec cette matiere qu'il faisoit son dissolvant, & qu'enfin il avouoit sincerement que son Or potable n'étoit pas l'Or radicalement dissous, & réduit à ses principes; tel que le promettent les Alchimistes, ou ignorans, ou imposteurs, mais que c'étoit seulement un or dissous par un dissolvant particulier, qui lui donnoit beaucoup de vertu pour un grand nombre de maladies.

Il ne parut pas impossible à l'Academie qu'un certain Acide émoussé & modifié par l'Or qui fera son Alkali, eût quelque vertu. Car du reste l'Or ne fait aucun effet dans le corps, si ce n'est quand on a pris trop de Mercure. Mais quelle que soit cette dissolution d'or, qui ne paroît guere differente de la dissolution ordinaire, le nom d'Or potable est bien choisi.

---

**M***Homborg* qui avoit pareillement été chargé par la Compagnie de voir le Laboratoire de *M. Caraffe*, autre Chimiste qui commençoit à se faire une grande réputation, rapporta qu'il y avoit vu différentes operations fort ingenieuses, qui avoient produit plusieurs bons remedes; un entre autres fort efficace, & d'un usage fort commode, pour les Fièvres continues violentes, pour les continues malignes avec transport au cerveau, & pour la petite verole, que ce remede avoit été employé avec succès par Messieurs *Dodart*, & *Morin*, & par lui-même, qui en avoit appris le Secret de *M. Caraffe*, & qu'enfin il y avoit lieu d'esperer de ce Chimiste beaucoup d'autres choses utiles.

---

**N**ous ne parlerons ici ni du Traité de l'Antimoine dont *M. Lémery* a continué à son ordinaire la lecture, & les démonstrations, ni de ce que *M. Homborg* a donné sur le Raffinage de l'argent, qui est  
une

94 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE  
une matiere entierement reservee pour les Mé-  
moires.\*

Cette année M. *Lémery* fit imprimer pour la  
neuvième fois, mais pour la première, depuis  
qu'il étoit Academicien, son *Traité de Chimie*,  
si connu jusque dans les Païs étrangers.

\* Voyez les Memoires, pag. 52.



## BOTANIQUE.

---

### S U R L A F E C O N D I T E' D E S P L A N T E S.

\* **L'**HISTOIRE de 1700. † a rapporté les  
Experiences sur lesquelles M. *Dodart* a-  
voit établi la prodigieuse fécondité des Plan-  
tes. Il s'en étoit tenu aux faits, & n'avoit pres-  
que pas encore entamé le Systême physique ;  
ici, il vient au Systême.

Un Arbre étêté qui pousse de nouvelles  
branches, où les prend-il ? M. *Dodart* prouve,  
& cela paroît de soi-même tout-à-fait vrai-  
semblable, que ni le tronc de l'Arbre qui n'est  
plus qu'un paquet de Fibres, ou un amas de  
tuyaux

\* Voyez les Memoires, pag. 315. † Pag. 83.

tuyaux privez d'action, ni la sève qui comme le sang, est propre à nourrir des parties, mais non pas à les former, ne produisent ces branches nouvelles; que par conséquent elles devoient exister avant l'étêtement de l'Arbre, mais en petit, & renfermées dans des bourgeons invisibles.

Si on n'avoit point étêté l'Arbre, la Sève auroit continué son cours dans les branches déjà formées, & déployées, & n'auroit point été développer celles qui étoient cachées dans ces bourgeons.

Si la Tige de l'Arbre avoit été coupée dans un autre endroit, il y auroit paru de nouvelles branches de la même manière. Par conséquent il y a là aussi des bourgeons qui renferment de petites branches que la sève peut déployer.

Une Tige peut être coupée en une infinité d'endroits différens, & toutes les coupes donneroient des branches nouvelles. La tige contient donc une infinité de bourgeons où sont roulées de petites branches. Ils ne se développent pas tous, soit parce qu'il n'y a jamais assez de sève dans un seul Arbre pour mettre au jour tout ce qu'il contient, soit parce que ces bourgeons nuisent au développement les uns des autres par leur excessive quantité, & qu'il n'y a que ceux qui sont vers le dehors de l'Arbre, qui puissent avoir la liberté de s'étendre, soit parce qu'ils ont besoin du commerce de l'air pour leur végétation.

Ces deux dernières causes, jointes au mouvement de la sève, qui doit être élançée assez droit de bas en haut, peuvent faire comprendre pourquoi la principale production des branches

ches se fait au haut de la tige, & pourquoi quand l'Arbre est étêté, il n'y a que les petits bourgeons placez à l'endroit de l'étêtement, qui en profitent.

Un Animal qui étoit contenu dans son œuf, étant une fois développé, l'est entierement; s'il perd quelques membres, il les perd sans retour, & il n'en a point de reserve, qui puissent venir à se manifester dans le besoin. Mais une Plante ne montre jamais tout ce qu'elle contient, & elle a des richesses cachées, dont elle peut reparer ses pertes, & souvent avec avantage.

Un bourgeon contient la branche avec ses feuilles, ses fruits, ses graines, tout cela actuellement existant, & souvent même visible, dès que le bourgeon commence à se développer. Mais qu'est ce qu'une graine? c'est encore une Plante actuellement existante, qui a elle même des graines, c'est-à-dire de quoi se reproduire à l'infini. Voilà donc dans une seule tige une infinité de bourgeons, dont chacun contient une infinité de Plantes. En un mot, voilà un infini d'infini qui naît de la supposition que les Plantes, aussi-bien que les Animaux, sont toutes formées dès la premiere création, & ne font que se développer.

Comme la conséquence peut effrayer les esprits, M. *Dodart* n'oublie rien pour la rendre nécessaire en établissant bien le Principe qui la produit. Ensuite il tâche à la rendre recevable par elle-même, & à nous accoutumer à l'idée de l'infini. Il n'auroit pas beaucoup de peine avec ceux qui ont un peu l'habitude de creuser soit en Physique; soit en Mathématique, ils savent qu'ils ne vont pas bien loin, sans

fans rencontrer aussi-tôt quelque Infini, comme si l'Auteur de la Nature & de toutes les Veritez avoit pris soin de répandre par tout son principal caractère. Mais il est certain que cette idée revolte toujours d'abord les imaginations communes.

## SUR L'YQUETAYA.

\* **L'**Yquetaya est une Plante du *Bresil*, peu connue encore, & dont les vertus ont été fort vantées par un Chirurgien *François*, établi en *Portugal*, & qui l'avoit trouvée dans le *Bresil*. *M. Marchand*, aidé de *M. Homberg*, a reconnu que cette Plante étrangere & rare, est tous les jours foulée sous nos pieds, & n'est que la grande *Scrophulaire* aquatique. On attribuoit à l'Yquetaya la propriété d'ôter au Scné son mauvais goût, & sa mauvaise odeur sans rien diminuer de sa vertu, ce qui devoit beaucoup faciliter l'usage d'un Purgatif d'ailleurs excellent; & il s'est trouvé que nôtre grande *Scrophulaire* a cette même propriété qu'on ne lui connoissoit point encore, & dont la découverte est due à sa ressemblance avec l'Yquetaya. Si la Plante *Brasilienne* est aussi bonne qu'on le dit pour la Pleurésie, & pour l'Apoplexie, peut-être la *Scrophulaire* poussera-t-elle aussi la ressemblance jusque là. *M. Marchand* est persuadé que nous n'étudions pas assez les Plantes de nôtre País, qu'elles valent souvent autant que les étrangères; & que

\* Voyez les *Memoires*, pag. 275.

98 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE  
que le malheur qu'elles ont de naître dans  
nos champs, leur fait trop de tort auprès de  
nous.

---

**M.** *Marchand* a continué à son ordinaire des  
Descriptions de Plantes, réservées pour  
un Ouvrage particulier.

---

**P**endant le cours de cette année, M. l'Ab-  
bé *Bignon* reçût de plusieurs endroits de  
*Turquie* des Lettres de M. *Tournefort*, qui lui  
rendoit compte de son voiage, & de ses re-  
cherches, & qui lui envoioit un grand nom-  
bre de Dessins de Plantes.

~~~~~

## GEOMETRIE.

---

S U R L A

### Q U A D R A T U R E DE LA LUNULE D'HIPPO- CRATE DE CHIO.

---

\* **S**I les Géometres osoient prononcer sans  
des démonstrations absolues, & qu'ils se  
contentassent des vraisemblances les plus for-  
tes,

\* Voyez les Memoires, pag. 22.



tes, il y a long-temps qu'ils auroient décidé tout d'une voix que la Quadrature du Cercle est impossible. Mais du moins comme les plus grands genies n'ont fait jusqu'ici que des efforts inutiles pour la trouver, quand on voit que la Solution de quelque Problème en dépend, on le tient ou pour impossible, ou pour résolu autant qu'il le peut être, si ce n'est que l'on trouve quelque moyen d'éviter cet écueil, & de prendre un autre chemin où il ne se rencontre pas.

La Lunule d'*Hippocrate* de *Cbio*, quoiqu'elle soit un espace entierement renfermé entre un demi-cercle, & un quart de cercle, dont les rayons sont différens, & quoiqu'elle soit elle-même une grande partie de l'espace d'un demi-cercle, se quarre sans peine, indépendamment de la Quadrature du cercle, qui n'entre point dans cette Solution. Mais il n'y a que la Lunule entiere, ou sa moitié qui se puisse quarrer ainsi; car si l'on veut prendre quelque partie à discrétion, on trouve en son chemin la Quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'on est arrêté.

Cependant depuis quelques années, d'habiles Géometres ont trouvé l'art de quarrer, indépendamment de la quadrature du cercle, telles portions de la Lunule qu'on voudroit, pourvu cependant qu'elles fussent assujetties à une certaine condition, & c'est cette restriction qui empêche la quadrature des portions de la Lunule, d'être pleine, parfaite, & selon l'expression des Géometres, absolue, & indéfinie. On peut se souvenir ici de ce qui a été dit dans l'Histoire de 1699. \* sur la Quadrature  
d'une

\* Pag. 86.

100 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE  
d'une infinité de Segmens & de Secteurs de la  
Cycloïde, qui n'est pas cependant indéfinie ou  
absolue.

M. le Marquis de l'*Hôpital* a trouvé aussi une  
Quadrature des parties de la Lunule, prises  
d'une autre maniere, & différemment con-  
ditionnées; quadrature encore imparfaite dans  
le même sens que les précédentes, & à cause  
du même obstacle. Mais enfin elle enrichit  
toujours la Géometrie d'un nouveau Problème,  
& donne un nouvel exemple de l'art d'é-  
viter la quadrature du cercle dans une Solu-  
tion.

A cela, M. le Marquis de l'*Hôpital* ajoute  
une espece de Lunule qu'il a trouvée, diffé-  
rente de l'ancienne dont *Hippocrate* de *Chio*  
a été l'inventeur, & donne encore pour cet-  
te nouvelle Lunule une Quadrature partielle.

---

## SUR LES FORCES CENTRALES.

\* **C**E qui a été rapporté de M. le Marquis  
de l'*Hôpital*, & de M. *Varignon* sur les  
Forces centrales dans l'Hist. de 1700†. sem-  
ble avoir épuisé cette matiere; & il seroit dif-  
ficile d'imaginer par rapport à cette espece de  
Forces quelque recherche géometrique, dont  
cette Theorie ne fournît pas les principes & la  
Solution. Ceux qui l'ont poussée jusqu'à ce  
point-là prétendent en être redevables à la Géo-  
me-

\* Voyez les Memoires, pag. 26. † Pag. 100.

metrie des Infiniment petits, & ne croyent pas qu'aucune autre Methode y pût atteindre. Mais M. *Varignon* ne s'est pas contenté de faire voir que cette Methode est la seule qui puisse aller à de si hautes spéculations, il a voulu prouver encore qu'elle avoit plusieurs chemins pour y aller; & il retrouve ici par des routes nouvelles, & toutes différentes, les mêmes veritez qu'il avoit déjà démontrées. Cela peut ne passer, si l'on veut, que pour l'éloge de la fécondité des Infiniment petits, quoique l'on pût prétendre avec assez de raison, que l'on perfectionne toujours la Géometrie, en présentant les mêmes Veritez par autant de faces différentes qu'il est possible. Des démonstrations du même sujet tirées de principes tous différens, sont en quelque maniere de nouveaux Instrumens de connoissance, & de nouveaux Organes que l'on donne à l'Esprit pour saisir un objet, & pour s'en assurer.

Une Courbe quelconque étant conçue comme enveloppée d'un fil dans toute son étendue, si l'on prend une des extrémités de ce fil, & qu'on l'étende en ligne droite en le déroulant, de maniere que par son autre extrémité il soit toujours une Tangente de la Courbe, il décrira par son premier bout une autre Courbe, par rapport à laquelle la premiere s'appelle la *Développée*. La portion du fil comprise entre un point quelconque dont elle est Tangente sur la Développée, & le point correspondant où elle se termine sur la Courbe nouvelle, s'appelle le *Rayon* de la Développée, & ce nom de Rayon est d'autant plus propre que l'on peut effectivement considerer cette portion de fil à chaque pas qu'elle fait, comme décrivant un

arc de cercle infiniment petit, qui est une partie de la nouvelle Courbe, toute composée d'une infinité de ces arcs tous décrits de différens centres, & sur différens rayons. Aussi le Rayon de la Développée est-il toujours perpendiculaire à la Courbe nouvelle, tandis qu'il est toujours Tangent de la premiere.

Toute Courbe peut donc être conçue comme formée par le développement d'une autre, & il faut trouver quelle est celle dont le développement l'a formée, ce qui se réduit à trouver le Rayon de la Développée à un point quelconque; car comme il est toujours tangent de la Courbe qu'on peut nommer génératrice, il n'est proprement qu'une de ses parties infiniment petites, ou un de ses Côtez prolongé, & tous ces Côtez, dont la position est par conséquent déterminée, ne sont autre chose que la Courbe génératrice elle-même. Cette recherche des Rayons des Développées, très-utile pour les hautes Speculations de la Géometrie, l'est quelquefois aussi pour la pratique, ainsi que l'a bien prouvé l'application qu'en a faite à la Pendule M. *Huygens*, premier Auteur de toute cette idée des développemens.

La Géometrie des Infiniment petits trouve toujours d'une maniere générale, en se servant de ses grandeurs infiniment petites, toute une espece de grandeurs finies, quelque variété qu'elles puissent jamais recevoir. Ainsi toutes les Tangentes de toutes les Courbes possibles à tous leurs points sont renfermées dans le seul rapport de l'infiniment petit d'une Abscisse à celui de l'Appliquée correspondante. Quand les rapports que l'on cherche ne sont pas dans les infiniment petits du premier genre, on n'a qu'à

qu'à pousser plus loin , & on les trouve. Il y a donc un rapport d'infiniment petits qui donne tout d'un coup les Rayons des Développées de toutes les Courbes possibles , & on le peut voir dans le Livre de M. le Marquis de l'Hôpital.

M. *Varignon* a trouvé le moyen de passer de la connoissance du rayon de la Développée à celle de la Force centrale, de sorte que quand on aura le rayon de la Développée d'une Courbe quelconque , on puisse avoir la valeur de la Force centrale d'un Corps qui étant mu par cette Courbe se trouveroit au même point où ce rayon se termine , ou reciproquement que par la Force centrale on ait le rayon de la Développée ; tout cela, par l'entremise de différens rapports d'infiniment petits.

Mais en unissant ces deux Théories, il les a étendues toutes deux. Tout l'esprit , & en quelque maniere l'Extrait de ces sortes de Methodes , consiste dans des Formules , ou expressions géométriques. Dans ces Formules, toujours composées du rapport de plusieurs grandeurs, il y en a quelques-unes qui doivent demeurer constantes , & invariables , tandis que les autres pourront varier comme l'on voudra ; elles sont comme les points fixes auxquels se rapportent les mouvemens , & les Formules sont d'autant plus générales , qu'il y a plus de grandeurs variables à souhait , & moins de grandeurs constantes. A ce compte, les Formules de M. *Varignon* pour les rayons des Développées , & pour les Forces centrales, sont les plus générales qu'on puisse jamais concevoir , puis que tout y est indéterminé , qu'elles ne sont assujetties à aucune grandeur con-

104 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE  
tante qui les limiteroit, & qu'elles présentent,  
pour ainsi dire, un espace infini de tous côtez,  
où tout peut être reçu.

---

## S U R L A R E C T I F I C A T I O N D E S C O U R B E S.

\* **L** Esprit humain est si limité, que l'Eendue qui est l'objet de ses connoissances les plus certaines, lui échape, & est au dessus de sa portée, dès qu'elle n'est point en ligne droite. Nulle Géométrie ne peut mesurer la longueur d'une ligne Courbe considérée en elle-même.

Seulement il se trouve quelquefois entre de certaines Courbes, & de certaines droites, des rapports de grandeur, qui font connoître la longueur de ces Courbes, & c'est ce qu'on appelle leur Rectification. Ces rapports ne se rencontrent pas toujours; par exemple, on n'a jamais pu, & apparemment on ne pourra jamais en découvrir un entre la Circonférence d'un Cercle, & son Diamètre. Il en va de même d'une infinité d'autres Courbes dont la grandeur nous demeure toujours inconnue, & celles que nous savons rectifier sont en si petit nombre, qu'il semble que ce soient seulement quelques foibles rayons d'une plus sublime  
Géo-

\* Voyez les Memoires, pag. 207.

Géometrie , qui s'échappent avec peine au travers d'un nuage , & qui viennent jusqu'à nous.

Pour rectifier les Courbes que nous pourrions rectifier , la Géometrie des Infiniment petits paroît avoir pris la voye la plus facile , & en même temps la plus naturelle qu'il soit possible. Elle resout les Courbes en des parties infiniment petites , que l'on peut prendre à la rigueur pour des lignes droites , à cause de cette infinie petitesse qui en fait disparoître la courbure. Ensuite, selon la nature de telle ou telle Courbe en particulier , on a une valeur de cette partie infiniment petite qui en est l'Element , & cette Géometrie fait trouver la valeur d'une somme infinie de ces Elemens , c'est-à-dire d'une certaine portion finie & déterminée de la Courbe. Mais quoique l'Element ne soit qu'une ligne droite infiniment petite , la somme des Elemens ne se trouve pas toujours égale à une ligne droite finie , & souvent la Courbe ne peut être rectifiée , soit que sa nature ne le comporte pas , soit que nôtre art le plus parfait ne puisse aller jusque là.

M. *Carré* applique à la rectification des Courbes trois différentes Methodes que peut fournir la Géometrie des Infiniment petits. Par là , il trouve quelles sont les Courbes qui ne peuvent être rectifiées comme la Parabole , & la Logarithmique , & celles qui peuvent l'être comme la Cycloïde , qui est égale à 4 fois le Diamètre de son Cercle générateur. Il y en a que l'on ne peut trouver qui soient égales à des lignes droites , mais qui le sont du moins à d'autres Courbes. Ainsi la Spirale commu-

ne est égale à une certaine Parabole. Mais, ce qui peut paroître un mystere incomprehensible de la Géometrie, la Spirale Logarithmique, après avoir fait un nombre infini de tours & de retours, n'est cependant qu'égale à une ligne droite finie. Ce mystere cesse d'en être un pour ceux qui ont un peu apprivoisé leur esprit avec l'idée de l'Infini.

## S U R   L A R E S O L U T I O N

*D'un Problème proposé dans le Journal de  
Trevoux, ou, sur une propriété nou-  
velle de la Parabole.*

\* **S**I l'on prend dans une Parabole des Ordonnées qui soient entre-elles, comme 1. 2. 3. &c. c'est-à-dire selon la suite des Nombres naturels, les Abscisses correspondantes seront entre-elles comme la suite naturelle des nombres quarrés, 1. 4. 9. &c. c'est la premiere & la plus connue de toutes les propriétés de la Parabole.

Toutes les Unitez qui composent un nombre quarré, peuvent être arrangées de maniere qu'elles fassent une figure quarrée, & il n'y a que des nombres quarrés qui puissent être disposés de cette maniere. Cette propriété qu'ils ont, a d'abord sauté aux yeux.

Mais

\* Voyez les Memoires, pag. 351.



Mais il a fallu un peu plus de réflexion pour s'apercevoir que tous les autres Polygones réguliers differens du Quarré, comme le Triangle équilatéral, le Pentagone, l'Exagone &c. à l'infini, pouvoient être aussi représentez par certains nombres, dont les unitez seroient arrangées selon ces figures. Par exemple, les unitez qui composent 3 peuvent aisément être disposées en triangle équilatéral, celles de 5 en pentagone, celles de 6 en exagone &c. On donne à ces nombres le nom du Polygone qu'ils peuvent représenter. Ainsi l'on dit, *Nombres triangulaires, quarrés, pentagones, exagones, &c.*

Et comme la suite de tous les nombres quarrés, 1. 4. 9. &c. est infinie, celle des nombres triangulaires, pentagones &c. l'est aussi. 1. 3. 6. 10. 15. 21. &c. est la suite des nombres triangulaires. 1. 5. 12. 22. 35. &c. celle des nombres pentagones, & il y a des methodes générales tant pour continuer ces suites à l'infini, que pour trouver celles de tous les differens polygones réguliers possibles.

Sur ce que la Parabole représente par ses Abscisses la suite infinie des nombres quarrés, il vint en pensée à un Géometre de chercher quelle seroit la Courbe dont les Ordonnées étant prises selon la suite des nombres naturels, les Abscisses seroient comme les nombres triangulaires, 1. 3. 6. 10. &c.

Il proposa ce Problème à tous les Géometres dans le Journal de *Trevoux*, en faisant extrêmement valoir la Courbe inconnue, & en insinuant, peut-être à dessein, que ce n'étoit pas la Parabole. Cela étoit en effet fort vraisemblable, car puisque les Abscisses de la Pa-

rabole qui correspondent aux Ordonnées prises selon la suite des nombres naturels , sont les nombres quarréz , elles ne peuvent pas être en même temps les nombres triangulaires. Cependant M. *Carre* ayant cherché la Solution du Problème , trouva sans beaucoup de peine que la Courbe n'étoit que la Parabole ordinaire , mais , à la verité , diminuée d'une certaine partie qu'il détermina.

Il poussa sa découverte plus loin , & infiniment au-delà des termes du Problème. Il démontra que les Ordonnées de la même Parabole étant toujours prises selon la suite des nombres naturels , les Abscisses donneroient la suite de tels nombres Polygones que l'on voudroit , differens des quarréz , pourvû que le retranchement qui se doit faire à la Parabole, fût differemment fait selon la nature du Polygone que l'on voudroit avoir.

Ainsi la Parabole depuis si long-temps connue , maniée par tous les Géometres , & qui selon les apparences devoit être épuisée , ne laisse pas de fournir encore des nouveautez. Cette ancienne propriété de donner la suite des nombres quarréz par ses Abscisses, n'étoit qu'une partie infiniment petite des proprietéz pareilles qu'elle avoit par rapport à tous les autres nombres polygones possibles ; mais comme cette propriété ne demandoit dans la Parabole aucun retranchement , elle étoit plus visible que toutes les autres , & elle se présentoit d'abord aux yeux , en se détachant de cette multitude infinie , où l'on ne savoit pas qu'elle fût comprise. Il y a bien de l'apparence qu'il en va de même de plusieurs autres veritez géométriques , que l'on croit n'être

tre que particulieres. Il se trouveroit en les approfondissant qu'elles font partie de quelque Infini.

Cette année s'éleva dans l'Academie une dispute dont elle fut assez long-temps, & peut-être trop long-temps occupée. La Géométrie que l'on appelle des Infiniment petits, est une Methode pour toutes les lignes Courbes, fondée sur un Principe connu & employé par les anciens Géometres, mais dont ils n'ont pas pénétré l'étendue immense. Il consiste à considerer les Courbes comme des Polygones d'une infinité de Côtés, mais à s'en tenir là comme ils ont fait, c'est peu de chose. M. *Descartes* ayant ouvert une plus grande carrière aux Mathématiciens, & jetté un plus grand jour dans les Sciences, quelques Géometres du premier ordre, comme Mrs *Barrow*, & *Newton*, Mrs *Bernoulli*, & sur tout M. *Leibnitz*, poussèrent beaucoup plus loin ce Principe des Courbes considerées comme des Polygones infinis, & M. le Marquis de l'*Hôpital* rassemblant toutes leurs vûes, & y ajoutant les siennes, forma comme un nouveau Système de Géométrie qu'il exposa dans le fameux Livre de l'*Analyse des Infiniment petits*. On vit paroître pour la première fois un Corps de Géométrie régulier, où une infinité de Solutions différentes ne dépendoient que du même Principe, où l'on en donnoit sans peine plusieurs que l'ancienne Géométrie n'eût osé tenter, où l'on donnoit avec une facilité incomparablement plus grande celles qui pouvoient être communes à l'ancienne & à la

110 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE  
nouvelle. Mais M. *Rolle*, & M. l'Abbé *Galois*, s'éleverent contre une nouvelle Methode qui prétendoit de si grands avantages. Comme elle suppose perpetuellement l'Infini, & le comprend dans ses calculs aussi fréquemment, & aussi hardiment que le Fini, comme elle admet des Grandeurs infiniment petites, qui cependant se peuvent encore résoudre en d'autres grandeurs infiniment plus petites, qui ont encore elles-mêmes leurs infiniment petits, & ainsi de suite à l'infini, ils attaquèrent le Systême par ces endroits-là, qui paroissent fourmiller de contradictions. M. le Marquis de l'*Hôpital* demeura dans un parfait silence, soit parce qu'il se reposa sur les témoignages que lui avoient rendus les plus grands Géometres de l'*Europe*, soit parce qu'il crut que des veritez géométriques, si elles l'étoient une fois, n'avoient besoin d'aucun secours humain, soit parce qu'il attendit toujours qu'après avoir laissé à part les Principes qui produisoient des questions Metaphysiques & difficiles à éclaircir, on prît le parti plus facile de démontrer les Paralogismes géométriques, où des Principes faux n'avoient pas dû manquer de le conduire. Mais M. *Varignon* qui avoit saisi avidement la nouvelle Géometrie, presque dès sa naissance, & s'en étoit toujours servi depuis avec succès, s'en rendit le Défenseur dans l'Academie, & fut l'objet de toutes les attaques de M<sup>rs</sup> *Galois* & *Rolle*. Cette contestation tint pendant cette année dans les Conférences Academiques, presque toute la place qu'auroient dû y tenir de nouvelles recherches, qui auroient perfectionné ou enrichi la Géometrie, & M. l'Abbé *Bignon* lais-

laissa un cours libre à la dispute, persuadé que c'est la destinée des nouveautez quelles qu'elles soient, d'essuier des contradictions, que ces contradictions même leur sont nécessaires pour les affermir lors qu'elles sont fondées sur la Verité, & qu'enfin l'esprit Academique demandoit que l'on écoutât tout, & qu'aucune objection ne pût se plaindre d'avoir été opprimée. A la fin cependant, comme la contestation traînoit trop en longueur, qu'elle se chargeoit, ainsi qu'il est ordinaire, de choses particulieres, personnelles, & inutiles, que des Démonstrations très-exactes ne terminoient rien, & que les passions entroient dans la Géometrie, M. l'Abbé *Bignon* nomma, pour juger la question avec tous ses incidens, le P. *Gouye*, & Mrs *Cassini* & de la Hire, ou peut-être voulut-il seulement par cette esperance d'un jugement éloigné, calmer la chaleur des esprits; car au fond il n'appartient proprement de décider qu'au Public. Il saura bien, si la nouvelle Géometrie n'est pas solide, se retracter de la grande vogue qu'il commence à lui donner, & y démêler avec le temps les erreurs qu'il n'y a pas encore aperçues.

---

Quand il ne fut plus question des Infiniment petits, M. *Rolle* donna quelques Regles, mais sans démonstration, pour reconnoître d'abord en gros, & comme par un premier coup d'œil, quels seront les principaux contours, & les Rameaux d'une Courbe, dont on a la nature exprimée par une Equation algebrique. Cela dépend de

**M** *Tschirnhaus*, Academicien Associé, étant venu à *Paris*, voulut bien rendre compte à l'Academie de ses études, & des progrès qu'il avoit faits, dans les Sciences.

Sur la Géometrie, voici les découvertes qu'il dit qu'il avoit faites, & qu'il se contenta d'énoncer.

1. Une Methode pour trouver une infinité de quadratures des espaces, par une simple transposition des lignes droites. Cette Methode est si universelle qu'elle va même aux espaces égaux dans l'Hyperbole, & aux petites Lunes infinies de *Viete*; ce qui seroit très-difficile par d'autres voyes. Elle réussit principalement quand les espaces entiers ne sont pas quarrables, & que quelques espaces particuliers le sont.

2. Une Methode pour découvrir *à priori* tous les foyers des Courbes géométriques, ce qui paroît presque impossible par le Calcul.

3. Une Methode de quarrer, sans aucunes grandeurs infiniment petites, de trouver les Tangentes des Courbes, leur rectification, & leurs espaces.

4. Une Methode pour faire voir en raison donnée les parties d'une Courbe géométrique donnée, & pour déterminer l'autre arc de la donnée, dont la difference soit égale à une ligne droite donnée sans supposer la quadrature d'aucun espace.

5. Diverses Methodes, pour déterminer, autant qu'il se peut, toutes les racines universelles de toutes les Equations.

6. Une

6. Une Methode universelle , pour déterminer par la seule Equation de la Courbe , & sans supposer aucune quadrature , la possibilité ou l'impossibilité d'une quadrature , & pour démontrer , en cas qu'il y ait possibilité , la quadrature ou totale , ou partielle.

Après cette exposition générale , M. *Tschirnhaus* \* laissa voir un échantillon de la Methode qu'il met à la place de celle des Infiniment petits. L'essai qu'il en montra fut sur les Rayons des Développées.

\* Voyez les Memoires , pag. 380.

~~~~~

## ASTRONOMIE.

### M E T H O D E

*Pour observer la difference de Déclinaison ,  
& d'Ascension droite de deux Astres peu  
éloignez.*

\* **T**OUTE la Théorie de l'Astronomie est d'elle-même assez brillante , & une connoissance très-superficielle en fait assez sentir , ou l'utilité ou la beauté. Mais elle suppose nécessairement une Pratique , & des Methodes d'observer , qui ne sont connues que des Astronomes , & que le reste du monde ne soupçon-  
ne

\* Voyez les Memoires , pag. 130.

ne pas d'être aussi ingénieuses, & aussi délicates qu'elles le sont.

Plus ces pratiques sont exactes, plus la Théorie de l'Astronomie devient parfaite, & plus elles sont commodés pour les Observations, plus elles peuvent être exactes. Ainsi ce qu'on verra que *M. de la Hire* ajoûte de nouveau à la maniere de se servir du Micrometre, petite Machine astronomique assez connue, est important, parce qu'il en rend l'usage plus facile, & que dans certains cas assez communs, on sera dispensé de faire tout ensemble différentes observations qu'il étoit presque impossible de faire.

Que deux Astres passent par le même Meridien à différentes hauteurs, & en différens temps, la différence de leurs hauteurs donne le différent éloignement où ils sont de l'Equateur vers l'un ou vers l'autre Pole, ce qu'on appelle leur différence de Déclinaison, & l'on voit par la différence du temps où ils viennent au Meridien, le différent éloignement où ils sont d'un point déterminé de l'Equateur, qui est le premier degré d'Aries, c'est-à-dire que l'on a leur différence en Ascension droite.

Si les deux Astres sont éloignez l'un de l'autre, on a dans l'intervalle de leur passage par le Meridien, & par le Micrometre, assez de loisir pour avoir entièrement fini les opérations qui regardent le premier, avant que d'aller au second. Mais s'ils sont fort proches l'un de l'autre, il est très-difficile de faire en même temps les deux observations, sans compter qu'on ne peut pas toujours prendre les deux Astres assez précisément dans le Meridien.

*M. de la Hire* donne deux moyens de remédier



dier à cet inconvenient, en ne se servant que du Micrometre ordinaire. La seule observation du passage des Astres entre les filets, ou sur les filets du Micrometre, donnera par des conséquences faciles la difference de Déclinaison & d'Ascension droite, sans supposer même aucun Meridien connu, ni tracé.

## SUR UN NOUVEAU RETICULE.

\* **I**L faut le répéter encore. Ce qui n'est dans l'Astronomie que de pratique & de détail, est d'une extrême importance; souvent même il en coûte autant d'efforts d'esprit, que pour les plus sublimes Théories, où l'on puisse arriver par-là. En un mot, la maniere d'observer, qui n'est que le fondement de la Science, est elle-même une grande Science.

Qu'une Eclipse de Soleil ou de Lune ait été d'une certaine grandeur, on sera étonné de la quantité & de la finesse des conséquences qu'un Astronome en saura tirer, mais on ne songera pas combien il a eu de peine à s'assurer de la grandeur précise de cette Eclipse, & que peut-être ç'a été là le point le plus difficile.

Il y a près de 40 ans que pour mesurer exactement les Eclipses, le Reticule a été inventé dans l'Academie. C'est un petit Chassis composé de 13 filets de Ver à soye très-déliés, éga-

\* Voyez les Memoires, pag. 154.

également distans les uns des autres, & parallèles. On le met au foyer du verre objectif de la Lunette, c'est-à-dire à l'endroit où l'image de l'Astre vient se peindre dans toute son étendue, & par conséquent on voit le diamètre du Soleil ou de la Lune divisé très-exactement en 12 parties égales, après quoi on n'a plus qu'à compter les parties lumineuses, & les parties obscures. Comme l'on veut que les divisions soient très-justes, elles ne peuvent être faites par des filets trop fins.

Un Reticule quarré ne convenant qu'au diamètre, & non à la circonférence de l'Astre, on en peut faire un circulaire, où l'on trace six cercles concentriques, également distans, qui représentent parfaitement la grandeur & les Phases de l'Eclipse.

Mais il est visible que le Reticule soit quarré, soit circulaire, doit être parfaitement égal ou au diamètre, ou à la circonférence de l'Astre, tels qu'ils paroîtront au foyer de la Lunette, sans quoi il ne peut y avoir de division exacte en 12 parties.

Or c'est ce qui n'est pas aisé. Le diamètre apparent du Soleil ou de la Lune est différent à chaque Eclipsé, & par conséquent un Reticule fait pour une Eclipsé ne peut servir à une autre, & il est incommode d'être obligé à en faire un nouveau pour chaque occasion. De plus, le même Reticule ne peut être juste pour toute une Eclipsé de Lune, parce que le diamètre apparent de cette Planete changé sensiblement, selon qu'elle s'approche ou s'éloigne de l'Horison.

Ces Reticules ont encore une incommodité. Leur grandeur est déterminée par celle qu'aura

ra

ra au foyer de la Lunette l'image qu'ils doivent comprendre exactement, & par conséquent ils sont assujettis à un foyer d'une certaine grandeur, & ils deviennent inutiles pour toute Lunette qui aura un autre foyer.

M. de la Hire a trouvé un remède à tous les inconveniens. Le même Reticule pourra servir à toutes les Lunettes, à toutes les Eclipses, & à toutes les hauteurs de l'Astre dans la même Eclipe.

Le Principe de cette invention est que deux Verres objectifs, appliquez l'un contre l'autre, ayant un foyer commun, & y formant une image d'une certaine grandeur, cette image augmentera à proportion que l'on éloignera les deux verres l'un de l'autre, jusqu'à un certain terme. Et il faut remarquer que les limites dans lesquelles est renfermée l'augmentation de l'image, sont plus grandes qu'il n'est nécessaire pour le dessein présent.

Si l'on prend donc un Reticule, tel qu'il comprenne exactement le plus grand diamètre que puissent jamais avoir le Soleil ou la Lune, au foyer commun de deux Objectifs, appliquez l'un contre l'autre, il ne faudra, lors que ces Astres auront un moindre diamètre, qu'éloigner l'un de l'autre, jusqu'à un certain point, les deux Objectifs, l'image de l'Astre augmentera, & sera encore exactement comprise dans le même Reticule. En un mot, les differens éloignemens des Objectifs ajusteront toujours l'image à la grandeur du Reticule, qui ne changera point.

Pour démontrer, & pour calculer cette augmentation de l'image par l'éloignement des Objectifs, M. de la Hire est obligé d'entrer dans

dans des raisonnemens assez fins de Dioptrique, & c'est ainsi qu'une petite pratique d'Astronomie, qui ne sera comptée pour rien par ceux qui ne seront pas Astronomes, s'enchaîne nécessairement avec la Théorie la plus élevée d'une autre Science.

M. *de la Hire* avoue qu'après avoir eu la pensée des deux Objectifs, & l'avoir entièrement digérée, il a trouvé que M. *Roemer*, autrefois Membre de l'Academie des Sciences, l'avoit eue aussi; mais elle sera du moins entièrement nouvelle par les choses que M. *de la Hire* y ajoûte.

Les filets de Ver à soye dont le Reticule est composé, & qui devoient se maintenir toujours dans un parallélisme fort exact, sont cependant fort sujets à en sortir, parce qu'ils sont très-susceptibles des différentes impressions de l'air, que l'humidité les relâche, que la secheresse augmente leur tension, après quoi ils se frisent, &c.

Ces incommoditez, qui deviennent dans l'usage plus sensibles qu'on ne croiroit, & plus nuisibles à la justesse des observations, ont fait imaginer à M. *de la Hire* un Reticule fait d'une petite glace de Miroir assez mince, où l'on trace très-délicatement avec la pointe d'un diamant des lignes ou des cercles paralleles, qui peuvent par la finesse du trait l'emporter sur les filets de Ver à soye, & par conséquent être encore plus propres au même usage. Il est bien sûr que le Reticule de verre n'aura rien à craindre des changemens de l'air.

Cette idée paroît avoir encore conduit M. *de la Hire* à une autre invention. Pour prendre avec justesse des angles, ou des hauteurs, il faut

faut ne pointer qu'à un seul point précisément, & pour n'avoir que ce seul point, on met au foyer de la Lunette deux filets de Ver à foye croifez, dont on prend l'interfection; mais ces filets éprouvent toutes les alterations de l'air. *M. de la Hire* a imaginé de mettre en leur place deux filets de verre auffi fins que ceux de Ver à foye. Cette extrême finesse en verre peut surprendre. La maniere dont se font ces filets est une assez agréable Mechanique dont *M. de la Hire* donne la description.

Son Reticule peut auffi tenir lieu de Micro-metre, c'est-à-dire qu'on s'en peut servir à mesurer les diamètres apparens des Astres, qui sont fort petits, ou les petites distances. Car que les deux Objectifs soient une fois ajustez de maniere que le Reticule comprenne exactement un diamètre du Soleil ou de la Lune, qui seroit de 30', il est certain que chaque intervalle tiendra exactement 2'. 30'', & mesurera juste tous les diamètres, ou tous les espaces de cette grandeur. Pour ceux qui seront un peu plus, ou un peu moins grands, l'œil mesure assez juste une moitié ou un tiers d'une si petite étendue.

## S U R   L A M E R I D I E N N E.

\* **L**E grand ouvrage de la Meridienne du côté du Midi étant achevé, *M. Cassini* re-

\* Voyez les Memoires, pag. 223.

revint, bien recompensé de tant de peines, par les nouveaux avantages qu'il procuroit à l'Astronomie, & par une grande quantité d'observations, dont il s'étoit enrichi.

Comme l'on a déjà pu voir en abrégé dans l'Hist. de 1700. \* & la Methode qu'il employoit, & les moyens dont il se servoit pour la verifier, & les utilitez de ce travail, nous n'en répéterons rien ici, & nous ne parlerons que de deux observations nouvelles, qui furent des fruits presque surnuméraires de cette entreprise.

M. *Cassini* comparant d'abord l'étendue terrestre que l'on avoit trouvé qui répondoit à un degré céleste dans la premiere description de la Meridienne de *Paris* du côté du Septentrion, avec cette même étendue telle qu'il la trouvoit du côté du Midi, & ensuite comparant l'étendue terrestre de differens degrez du côté du Midi, vit qu'elle n'étoit point égale, & qu'elle alloit en diminuant du Midi vers le Septentrion.

Il n'en pouvoit juger que par l'étendue de pays qui avoit été actuellement mesurée, & qui étoit comprise entre les Paralleles d'*Amiens*, & de *Colioure*, c'est-à-dire par une étendue de près de 8 degrez. Mais en supposant, comme il est fort vraisemblable, que cette diminution de la valeur terrestre d'un degré, continue toujours de l'Equateur vers le Pole, & en conservant d'ailleurs les hypotheses communes, on voit d'abord qu'un Meridien doit être plus petit que l'Equateur, & par conséquent que la Terre est un Globe aplati vers les Poles.

Nous

\* Pag. 153.

Nous avons dit dans l'Hist. de 1700.\* que les différentes longueurs du Pendule à Secondes en différens Climats, avoient déjà fait donner cette même figure à la Terre, & ce seroit une grande gloire pour la Philosophie qu'une conséquence tirée d'un si grand nombre de principes tout nouveaux, fondée sur l'Hypothèse Cartésienne de la Pesanteur, & sur la subtile Géométrie des forces centrales, se trouvât si parfaitement d'accord avec une mesure actuelle & indubitable.

Dans l'étendue mesurée par l'Académie, & comprise à peu près entre le 40 & le 48 degré de latitude, la diminution qui se fait d'un degré à l'autre est d'une 800<sup>me</sup> partie, & la seconde remarque de M. *Cassini* est qu'il se trouve aussi que dans l'Orbite de la Lune qui est excentrique à la Terre, les degrez comptez de l'Apogée jusqu'au moyen éloignement vont en diminuant d'une 800<sup>me</sup> partie, précisément dans l'étendue du 40 au 48 degré. Cette conformité paroît étonnante, mais elle le seroit encore davantage, si elle n'étoit que fortuite, & qu'elle ne se soutînt pas dans le reste de la courbure de la Terre, & de l'Orbite de la Lune. En cas que l'on puisse découvrir un jour qu'elle se soutienne, on peut esperer que cette ressemblance de figure entre nôtre Globe, & le cours d'une Planete qui en est si proche, nous produira de nouvelles connoissances. Peut-être le mystere du flux & du reflux tient-il en partie à quelque chose de semblable.

\* Pag. 147.

# S U R U N

## NOUVEL ASTROLABE

### U N I V E R S E L.

\* **O**N a anciennement appelé *Astrolabe* un assemblage des differens Cercles de la Sphère, posez comme ils le doivent être les uns par rapport aux autres. Nos Sphères Armillaires sont la même chose que ces Astrolabes. *Hipparque* en avoit fait construire un dans *Alexandrie*, Capitale de l'Astronomie chez les Grecs, il l'avoit placé dans un lieu où il étoit immobile, & il s'en servoit à différentes opérations astronomiques. *Ptolomée* en fit aussi le même usage, mais comme cet Instrument avoit beaucoup d'incommoditez, ce grand Astronome s'avisa d'en changer la figure, quoique naturelle, & parfaitement conforme au Système de la Sphère, & de réduire tout l'Astrolabe sur une superficie plane, ce qui a été appelé *Planisphere*.

Cette réduction n'est possible qu'en supposant qu'un Oeil qui n'est pris que pour un point, voit tous les Cercles de la Sphère, & les rapporte à un plan; alors il se fait une représentation ou *projection* de la Sphère aplatie, &, pour ainsi dire, écrasée sur ce plan, qu'on appelle *plan de projection*.

Un Tableau n'est qu'un plan de projection  
placé

\* Voyez les Memoires, pag. 336.



placé entre l'œil, & l'objet, de maniere qu'il contient toutes les traces que laisseroient imprimées sur sa superficie tous les rayons tirez de l'objet à l'œil. Mais en fait de Planispheres ou d'Astrolabes, le plan de projection est placé au-delà de l'objet qui est toujours la Sphere. Il en va de même des Cadrans qui sont aussi des projections de la Sphere faites par rapport au Soleil.

Il est naturel, & presque indispensable de prendre pour plan de projection de l'Astrolabe quelqu'un des Cercles de la Sphere, ou du moins un plan qui lui soit parallele, après quoi reste à fixer la position de l'œil par rapport à ce plan.

Entre le nombre infini de Planispheres que pouvoient donner les differens plans de projection, & les differentes positions de l'œil, *Ptolomée* s'arrêta à celui dont le plan de projection seroit parallele à l'Equateur, & où l'œil seroit placé à un des Poles de l'Equateur ou du Monde. Cette projection de la Sphere est facile, & on l'appelle l'Astrolabe Polaire, ou de *Ptolomée*. Tous les Meridiens qui passent par le point où est l'œil & sont perpendiculaires au plan de projection, deviennent des lignes droites, ce qui est commode pour la description du Planisphere; mais il faut remarquer que leurs degrez qui sont égaux dans la figure circulaire deviennent fort inégaux quand le cercle s'est changé en ligne droite, ce que l'on verra facilement en tirant de l'extrémité d'un diamètre par tous les arcs égaux d'un demi-cercle des lignes droites qui aillent se terminer à une autre droite qui touchera ce demi-cercle à l'autre extrémité du même diamètre;

car le demi-cercle s'est changé par la projection en cette tangente, & elle sera divisée de maniere que ses parties seront plus grandes à mesure qu'elles s'éloigneront davantage du point touchant. Ainsi dans l'Astrolabe de *Ptolomée* les degrez des Meridiens sont fort grands vers les bords de l'Instrument, & fort petits vers le centre; ce qui cause deux inconveniens, l'un qu'on ne peut faire aucune operation exacte sur les degrez proches du centre, parce qu'ils sont trop petits pour être aisément divisez en Minutes & moins encore en Secondes, l'autre, que les Figures célestes, telles que les Constellations, deviennent difformes, & presque méconnoissables, entant qu'elles se rapportent aux Meridiens, & que leur description dépend de ces Cercles. Quant aux autres Cercles de la Sphère grands, ou petits, paralleles ou inclinez à l'Equateur, ils demeurent Cercles dans l'Astrolabe de *Ptolomée*.

Comme l'Horison, & tous les Cercles qui en dépendent, c'est-à-dire ses paralleles, & les Cercles Verticaux, sont differens pour chaque lieu, on décrit à part sur une planche qu'on place au dedans de l'Instrument, l'Horison & tous les autres cercles qui y ont rapport, tels qu'ils doivent être pour le lieu ou pour le Parallele où l'on veut se servir de l'Astrolabe de *Ptolomée*, & par cette raison il ne passe que pour être *particulier*, c'est-à-dire d'un usage borné à des lieux d'une certaine latitude, & si l'on veut s'en servir en d'autres lieux, il faut changer la planche, & y décrire un autre horison.

Un Mathématicien de *Frise* nommé *Gemma*,

a inventé & mis au jour un autre Astrolabe que celui de *Ptolomée*. Le plan de projection est le Colure ou Meridien des Solstices, & l'œil est placé à l'endroit où se coupent l'Equateur & le Zodiaque, ce qui est le pole de ce Meridien. Ainsi dans cet Astrolabe l'Equateur qui devient une ligne droite, est divisé fort inégalement, & a ses parties beaucoup plus serrées vers le centre de l'instrument que vers les bords, par la même raison que dans l'Astrolabe de *Ptolomée* ce sont les Meridiens qui sont défigurez de cette sorte. En un mot c'est l'Astrolabe de *Ptolomée* renversé. Seulement pour ce qui regarde l'Horison, il suffit de faire une certaine operation, au lieu de mettre une planche séparée, & cela a fait donner à cet Astrolabe le nom d'*Universel*.

Il y a paru encore une troisième espede d'Astrolabe inventée par *Jean de Royas* Espagnol. Son plan de projection est un Meridien, & il place l'œil sur l'axe de ce Meridien à une distance infinie. L'avantage qu'il tire de cette position de l'œil est que toutes les lignes qui en partent sont paralleles entre-elles, & perpendiculaires au plan de projection. Par conséquent non-seulement l'Equateur est une ligne droite, comme dans l'Astrolabe de *Gemma Frisius*, mais tous les paralleles à l'Equateur en sont aussi, puisqu'en vertu de la distance infinie de l'œil ils sont tous dans le même cas que si leur plan passoit par l'œil; par la même raison l'Horison & ses paralleles sont des lignes droites. Mais au lieu que dans les deux Astrolabes précédens les degrez des cercles devenus lignes droites sont fort petits vers le centre, & fort grands vers les bords, ici ils sont fort

petits vers les bords & fort grands vers le centre, ce qui se verra facilement en tirant sur la tangente d'un quart de cercle des paralleles au diamètre par toutes ses divisions égales. Les figures ne sont donc pas moins altérées que dans les deux autres. De plus la plupart des Cercles dégènerent ici en Ellipses, qui sont souvent malaisées à décrire. Cet Astrolabe est appelé Universel comme celui de *Gemma Frison*, & à même titre. On lui donne aussi le nom d'*Analemme*.

Voilà les trois seules espèces d'Astrolabes qui aient encore paru. Leurs défauts communs sont d'altérer tellement les figures des Constellations qu'elles ne sont pas faciles à comparer avec le ciel, & d'avoir en quelques endroits des degrez si serrez qu'ils ne laissent pas assez d'espace aux operations.

Comme ces deux défauts ont le même principe, M. de la Hire y a remedié en même temps, en trouvant une position de l'œil, d'où les divisions des Cercles *projettez* fussent très-sensiblement égales dans toute l'étendue de l'instrument. Les deux premiers Astrolabes plaçoient l'œil au pole du cercle ou du plan de projection, le troisiéme à distance infinie, & ils rendoient les divisions inégales dans un ordre contraire. M. de la Hire a découvert un point moyen d'où elles sont suffisamment égales. Il prend pour plan de projection celui d'un Meridien, & par conséquent fait un Astrolabe universel, & il place l'œil sur l'axe de ce Meridien prolongé de la valeur de son Sinus de 45 degrez, c'est-à-dire que si le diamètre ou axe du Meridien est supposé de 200 parties, il le faut prolonger de 70 à peu près. De là

là s'enfuit une projection avec tous les avantages qu'on y peut desirer, & le Public favant jouit déjà des Astrolabes qu'elle a produits.

## SUR LES TACHES DU SOLEIL.

\* **D**Epuis que M. de la Hire à Paris, & M. Cassini en Languedoc eurent découvert dans le Soleil au mois de Novembre 1700. les Taches dont nous avons parlé dans l'Histoire de l'année précédente †, ces Astronomes continuant à observer revirent ou ces mêmes Taches, ou d'autres, tant à la fin de 1700, qu'en differens temps de 1701.

Les Taches ne nous ont pas seulement appris que le Soleil tournoit autour de son centre, elles ont encore donné lieu aux Astronomes de découvrir sur quel axe se faisoit ce mouvement, quelle étoit la position & l'angle de cet axe sur le plan de l'Ecliptique, ce qui, bien considéré, est peut-être la plus étonnante détermination que l'audace de l'Astronomie ait pu entreprendre.

Le centre du globe du Soleil ne sort point du plan de l'Ecliptique. Si l'on tire par ce centre une perpendiculaire sur ce plan, & si, pour se faire plus facilement une image sensible, on veut concevoir cette perpendiculaire traversant

F 4

le

\* Voyez les Memoires, p. 50. 101. 343.

† Pag. 150.

le globe du Soleil , & l'excédant de part & d'autre , elle déterminera sur sa surface deux points diametralement opposez , qui seront les Poles du Soleil par rapport à l'Ecliptique.

D'un autre côté , il est constant par les Taches que le Soleil tourne sur lui-même , & par conséquent il a par rapport à ce mouvement un Equateur , c'est-à-dire , un Cercle sur sa circonference où ce mouvement est plus grand que par tout ailleurs , & cet Equateur a deux Poles. Supposons que sur cet Equateur précisément il y ait une Tache fixe , qui en suivra le mouvement. Il est question de savoir quelle ligne nous verrons décrire à cette Tache sur le Disque du Soleil.

Le grand éloignement du Soleil , nous en fait absolument disparaître la convexité , & nous ne le voyons que comme un Disque plat , dont le point du milieu , qui n'est réellement qu'un point de la surface du Soleil , est ce que nous appellons son centre , ou son centre apparent.

Le centre de la Terre , aussi-bien que celui du Soleil ne sort jamais du plan de l'Ecliptique , & par conséquent si la Terre voyoit sur le disque du Soleil une trace qui y fût marquée par le plan de l'Ecliptique qui le coupe , cette trace seroit toujours une ligne droite passant par le centre de ce disque.

Donc si l'Equateur du tournoyement du Soleil est dans le plan de l'Ecliptique , la Tache supposée sur cet Equateur paroîtra toujours décrire une ligne droite sur le disque du Soleil , & une ligne droite passant par le centre apparent , qui sera toujours un des points de l'Equateur.

Mais

Mais si l'Equateur du Soleil est perpendiculaire au plan de l'Ecliptique, & que par conséquent les Poles de cet Equateur soient dans ce plan, le centre apparent du Soleil sera un de ces Poles, & la Tache de l'Equateur nous paroîtra décrire perpétuellement la circonférence du Soleil.

Une position de l'Equateur du Soleil sur le plan de l'Ecliptique, moyenne entre les deux que nous avons supposées, produira aussi une apparence du mouvement de la Tache, moyenne entre les deux que nous avons conclues, c'est-à-dire que si l'Equateur du Soleil est incliné sur le plan de l'Ecliptique, la Tache de l'Equateur ne décrira plus ni un diamètre du Soleil, ni sa circonférence, mais une demi-Ellipse, ligne Courbe moyenne entre la ligne droite & la circulaire, & qui peut dégénérer en l'une ou en l'autre.

Cette demi-Ellipse sera d'autant plus ouverte, & plus approchante d'une ligne circulaire, que l'Equateur du Soleil sera moins éloigné de la situation où il eût produit l'apparence d'une circonférence de cercle, c'est-à-dire qu'il sera plus élevé sur le plan de l'Ecliptique. Et réciproquement la demi-Ellipse sera d'autant plus serrée, & plus approchante de la ligne droite, que l'Equateur sera moins élevé.

Si la Tache n'est pas sur l'Equateur, elle sera nécessairement sur un Cercle parallèle à l'Equateur, & le décrira, & par conséquent elle paroîtra toujours décrire des lignes parallèles à celles qu'elle auroit décrites étant sur l'Equateur, mais moins grandes. Dans la 1<sup>re</sup>. position de l'Equateur que nous avons suppo-

fée, ce fera une Corde du disque du Soleil qu'elle décrira au lieu d'un diamètre. Dans la 2<sup>e</sup>. ce sera un cercle concentrique à la circonférence, au lieu de la circonférence même. Dans la 3<sup>me</sup>. ce sera une demi-Ellipse plus petite.

On peut donc trouver par les lignes que décrivent les Taches sur le disque du Soleil quelle est la position de son Equateur sur le plan de l'Ecliptique. D'abord en leur voyant décrire des demi-Ellipses le Pere *Scheiner* Jesuite, Auteur original sur cette matiere, a conclu que cet Equateur étoit incliné sur l'Ecliptique, mais pour avoir l'angle précis de l'inclinaison, il a fallu découvrir géométriquement de quelle espèce étoit l'Ellipse, car il y en a une infinité de différentes, & ce n'a été que par cette détermination précise que l'on a pu trouver que l'angle de l'Equateur du Soleil sur l'Ecliptique étoit de 7 degrez  $\frac{1}{2}$ . Comme cette élévation est fort petite, les Ellipses ont été peu différentes d'une ligne droite, & par conséquent beaucoup plus difficiles à reconnoître & à déterminer dans les observations.

Une difficulté encore plus grande, & dont nous n'avons pas parlé de peur de compliquer trop d'idées différentes, c'est que ces Ellipses, quoi qu'elles soient produites par des Taches supposées fixes, & quoique l'inclinaison de l'Equateur du Soleil ne change point, changent perpetuellement d'espèce, & sont tantôt plus ouvertes, tantôt plus serrées, tantôt enfin de simples lignes droites, desorte qu'il ne paroît d'abord rien d'égal ni de constant qui puisse être saisi par la Géométrie, ou du moins que ce qui seroit de cette

na-



nature est extrêmement envelopé sous des biffareries apparentes. Voici quelle en est la cause.

On voit toujours un Hemisphere du Soleil, & comme la Terre tourne en un an autour de cet Astre, l'Hemisphere visible est toujours d'un jour à l'autre un peu différent. Mais puisque le centre de la Terre ne sort point du plan de l'Ecliptique, l'axe perpendiculaire à l'Ecliptique, qui traverse le Soleil est toujours vû, & par conséquent aussi ses deux extrémités, c'est-à-dire, que les deux Poles de l'Ecliptique du Soleil sont toujours compris dans l'Hemisphere visible qui change toujours, & sont toujours à deux extrémités opposées du disque apparent.

L'axe de l'Equateur du Soleil coupe l'axe de son Ecliptique sous un angle de 7 degrez  $\frac{1}{2}$ , & par conséquent un des poles de l'Equateur du Soleil est par rapport à nous en deçà de l'axe de son Ecliptique, & l'autre est au delà, & il n'y a qu'un des poles de cet Equateur qui soit dans l'hemisphere visible, puisque les deux ensemble de l'Ecliptique du Soleil y sont compris.

Le mouvement de la Terre qui rend l'hemisphere visible du Soleil toujours changeant, fait aussi que si un des Poles de l'Equateur du Soleil a été vû pendant six mois, c'est l'autre qui l'est pendant les six mois suivans.

Comme le changement qui rend ces deux Poles alternativement visibles se conduit par degrez, il faut que quand un pole cesse d'être visible, & que l'autre commence de l'être, il y ait un temps où ils soient vûs tous deux. A-

lors les deux Poles de l'Equateur du Soleil font donc confondus en apparence avec ceux de son Ecliptique, car réellement ils font toujours differens.

Or cette apparence fait le même effet à nos yeux, que si l'Equateur du Soleil s'étoit mis réellement dans le plan de l'Ecliptique, & par conséquent les Taches doivent paroître alors comme elles paroîtroient en ce cas-là, c'est-à-dire qu'elles doivent décrire des lignes droites qui soient ou le diamètre, ou des cordes du disque du Soleil.

Pareillement dans les trois mois qui se passent depuis qu'un Pole de l'Equateur du Soleil est entré dans l'hémisphère visible, jusqu'à ce qu'il y soit à son plus haut point, l'apparence est la même qui si l'Equateur du Soleil sortoit du plan de l'Ecliptique, & s'élevoit peu à peu au dessus de ce plan jusqu'à la hauteur de 7 degrez  $\frac{1}{2}$ , & par conséquent les demi-Ellipses des mêmes Taches fixes, s'ouvrent toujours de plus en plus pendant trois mois, après quoi elles se resserrent jusqu'à devenir une ligne droite au bout des trois mois suivans, ou plutôt, à parler encore plus exactement, ce ne sont point de véritables Ellipses que produit la composition du tournoyement du Soleil & du mouvement annuel de la Terre, mais d'autres Courbes qui en approchent.

C'étoit donc une recherche très-difficile que de découvrir la position de l'Equateur du Soleil sur le plan de l'Ecliptique, malgré le changement continuel de la seule chose qui pût faire découvrir cette position, c'est-à-dire, des demi-ellipses des Taches; il a fallu trou-

trouver dans quelles bornes étoit renfermée leur variation apparente , & c'est ce que l'on n'a pu faire que par de longues & de pénibles comparaisons de toutes les observations des Taches, il a fallu enfin établir une Hypothèse du mouvement du Soleil sur son axe , ce qui se réduit à un point principal qui est de déterminer en quel temps les deux Poles de l'Equateur du Soleil sont dans l'hémisphère visible.

Le P. *Scheiner* a surmonté , il y a déjà quelque temps, toutes ces difficultés. Il a marqué à peu près le 8<sup>me</sup> degré du Sagittaire ou son Opposite pour le lieu d'où le Soleil présente en même temps à nos yeux les deux poles de son Equateur. Delà s'ensuit tout le reste.

Mais à l'occasion des Taches de cette année, & de la précédente , M. *Cassini* le fils eut la curiosité de vérifier cette hypothèse astronomique , en la comparant aux observations qui avoient été faites en assez grand nombre, & il trouva qu'elle en différoit moins que diverses observations du même Phenomene faites en même temps , ne différent souvent entre-elles. Il est assez beau à l'Astronomie moderne d'avoir en si peu de temps poussé si loin un travail , où elle n'a point été aidée par les Siecles passez , & qui demandoit un grand nombre de discussions très-déliées.

# S U R L E C A L E N D R I E R.

**L'**Affaire du Calendrier, dont on a parlé dans l'Hist. de 1700\*. se traitoit à Rome dans une Congregation établie par le Pape, à laquelle il avoit donné pour Président M. le Cardinal *Noris*, & pour Secrétaire, M. *Bianchini* Camerier d'honneur de S. S. tous deux très-dignes de ce choix, le premier par sa profonde connoissance de l'Histoire & de la Chronologie Ecclesiastique, & le second par son application à l'Astronomie. Il étoit question de voir s'il y avoit quelque reforme à faire au Calendrier *Gregorien* pour ôter aux Etats Protestants tout sujet de ne le pas recevoir.

M. le Cardinal *Noris* reçut ordre du Pape que la Congregation eût commerce sur cette matière avec M. *Cassini*, & lui en fit écrire plusieurs fois, soit par M. *Bianchini* Secrétaire, soit par M. *Maraldi*, qui étant allé à Rome après la fin du travail de la Meridienne †, auquel M. *Cassini* lui avoit donné beaucoup de part, avoit eu l'honneur d'être nommé par le Pape pour avoir entrée dans la Congregation du Calendrier.

‡ L'avis de M. *Cassini* fut qu'il n'y auroit rien à desirer au Calendrier *Gregorien*, nulle re-

\* Pag. 158. † Voyez l'Hist. de 1700. pag. 153. & ci-dessus p. 119. ‡ Voyez les Memoires, p. 483.

reformé à y faire , si l'intention du Pape *Gregoire XIII.* avoit été exactement suivie , & s'il n'y avoit pas eu un point où l'on s'en est écarté.

La célébration de la Pâque dépend de l'Equinoxe du Printemps , & de la Lune. On appelle Lune Paschale celle dont le quatorzième jour arrive après l'Equinoxe du Printemps , ou tombe au même jour , & Pâques doit être , selon la regle de l'Eglise , le premier Dimanche d'après ce quatorzième.

Du temps du Concile de *Nicée* l'Equinoxe du Printemps avoit été marqué au 21 Mars de l'Année *Julienne* , mais comme elle étoit plus longue que l'année Astronomique & vraie , l'Equinoxe du Printemps arrivoit toujours depuis ce temps-là plutôt que l'on ne comptoit , & avançoit vers le commencement de Mars , de sorte qu'à la fin il seroit arrivé au mois de Janvier & à Noël. Ce fut pour le remettre au 21 Mars que *Gregoire XIII.* retrancha dix jours de l'année 1582 , & il voulut ensuite le fixer éternellement au 21 Mars par la disposition de son Calendrier , qui en effet l'y ramene toujours , ou à peu près. Je dis , à peu près , car on ne doit pas demander une entière exactitude à des Calendriers , & à des Cycles destinez à l'usage civil , & qui par conséquent n'étant composez que de nombres commodes , sans fractions , & toujours les mêmes , ne peuvent répondre précisément aux irregularitez , & aux variations perpetuelles des mouvemens célestes. Il suffit qu'un Cycle remette les choses au même point où elles étoient à son commencement , & que le total en soit juste , encore ne peut-il l'être que dans une

ccr-

certaine étendue de Siecles ; après cela, il est nécessaire que les parties s'écartent du Ciel, & la perfection ne consiste que dans les moindres écarts.

Le secret que trouverent les Auteurs du Calendrier *Gregorien* pour ramener à peu près les Equinoxes au 21 Mars, fut de laisser l'année 1600. Bissextile, comme elle devoit l'être, selon le Calendrier *Julien*, & de regler que les années 1700. 1800. & 1900. ne le feroient point, qu'ensuite 2000. le feroit, & toujours ainsi, laissant Bissextile chaque quatre-centième année, & rendant communes les trois autres centièmes, ce qui retranche trois jours sur quatre cens ans. Et quoique selon cette regle l'Equinoxe puisse en 400 ans s'éloigner de deux jours du 21 Mars où l'on veut le rappeler, elle est cependant d'ailleurs si facile & si simple que M. *Cassini* la juge préférable à une autre qui disposeroit autrement les années Bissextiles parmi les Communes, & réduiroit la variation des Equinoxes à un jour.

Il a aussi toujours trouvé par les observations immédiates, que la grandeur de l'année Astronomique moyenne s'accorde fort bien avec la grandeur de l'année *Gregorienne*, & telle que la donne le Système du Calendrier.

Ainsi nul besoin de reforme pour toute la disposition du Calendrier qui regarde la fixation de l'Equinoxe au 21 Mars. Mais il n'en va pas tout à fait de même de la disposition qui a rapport à la pleine Lune Pâchale.

Le fameux Cycle de 19 ans, appelé communément le Nombre d'or, remet les nouvelles

les Lunes aux mêmes jours, pendant quelques Siècles, mais en 625 ans il ramene une nouvelle Lune deux jours plutôt qu'elle n'étoit arrivée au commencement.

Ce défaut fut aperçû par *Gregoire XIII.*, & marqué expressément dans le Projet du Calendrier qu'il envoya à tous les Princes Chrétiens en 1577. *M. Cassini* a observé à la gloire du Calendrier *Gregorien* qu'en supposant dans le Cycle de 19 ans ce défaut de deux jours précisément sur 625 années, on retrouve le Mois Astronomique moyen, jusqu'aux Secondes, tel qu'on le détermine aujourd'hui par les observations les plus exactes.

On a voulu dans le Calendrier *Gregorien* remettre les Lunes aux lieux où elles étoient du temps du Concile de *Nicée*, & on l'a fait par le moyen du Cycle de 19 ans. Comme depuis ce Concile tenu en 325. jusqu'à l'année 1582. il y avoit 1257 ans, c'étoient 4 jours d'erreur & quelque chose de plus sur le Cycle de 19 ans répété 66 fois. Il falloit donc avoir égard à ces 4 jours, différence qui se trouvoit alors entre les Lunes Astronomiques, & celles du Cycle; c'étoit l'intention du Pape déclarée dans le Projet du Calendrier; bien plus, dans la Bulle même de la publication du Calendrier adressée à tout le monde Chrétien, il dit qu'il a pris soin que les Lunes aient été remises aux places anciennes d'où elles s'étoient éloignées de 4 jours & un peu plus; cependant il est certain que dans l'exécution du Calendrier on n'a compté que sur 3 jours au lieu de 4.

Delà vient, selon la remarque de *M. Cassini*, que la pleine Lune Astronomique vient  
fou-

souvent un jour avant le quatorzième de la Lune Paschale marqué dans le Calendrier. Si la pleine Lune Astronomique tombe à un Samedi, Pâques auroit dû être le Dimanche suivant, mais comme le Calendrier donne le quatorzième de la Lune un jour plus tard, c'est-à-dire le Dimanche, Pâques est transporté au Dimanche d'après, & huit jours plus tard qu'il n'eût dû être. Tout au contraire, il peut arriver par la même raison que l'on célèbre Pâques un mois trop tôt. Car que la pleine Lune Astronomique tombe au 20 Mars, il faudroit attendre la pleine Lune suivante parce que ce sera la Paschale. Mais le Calendrier donnera le quatorzième de la Lune le 21 Mars, & par conséquent on la prendra pour Paschale, & on célébrera Pâques le Dimanche qui la suit immédiatement.

Pour remédier à ces erreurs, il n'y a qu'à rendre au Calendrier *Gregorien* la justesse qui lui étoit naturellement destinée, & qu'il n'a manqué d'avoir que par quelque espece de malheur; il ne faut que se regler sur le Projet, & non sur l'exécution même. Aussi est-ce l'unique expédient que *M. Cassini* ait proposé pour cet unique endroit défectueux. Un Ouvrage de ce genre le plus grand & le plus vaste qui ait jamais été entrepris, seroit assez parfait avec un seul défaut, & il l'est encore beaucoup plus, lors qu'à juger selon l'équité, on peut soutenir qu'il ne l'a pas.



# D I V E R S E S O B S E R V A T I O N S A S T R O N O M I Q U E S.

## I.

**M.** *Des Hayes* dont nous avons déjà parlé dans l'Histoire de 1699\*, & de 1700 †, & qui est connu par les grands Voyages qu'il a faits, & par le grand nombre de bonnes observations qu'il en a rapportées, ayant fait en 1699. & en 1700. un voyage en *Amerique* sur un Vaisseau du Roi commandé par M. *Renau*, Academicien Honoraire, mit à son retour entre les mains du P. *Gouye*, les observations qu'il avoit faites sous un tel Commandant, peut-être avec encore plus de soin & d'affiduité. Le P. *Gouye* en donna l'Extrait & les Resultats à l'Academie, dont on verra les principaux à la page suivante.

Ces latitudes ont été prises tant par le Soleil, que par les Etoiles, & avec un Sextant de l'Observatoire que M. *des Hayes* examina à la *Grenade*, & à *S. Christophle*.

Les longueurs du Pendule sont celles qu'il avoit marquées dans une Lettre à M. *Cassini*, dont il a été fait mention dans l'Hist. de 1700. ‡ Il lui annonçoit seulement qu'il falloit diminuer le Pendule à la *Cayenne*, plus que n'avoit fait M. *Richer* dans sa fameuse observation, & l'on

\* Pag. 105. † Pag. 139. & 145. ‡ Pag. 145.

|                                                                                                 | Latitudes.    | Longueurs du<br>Pendule simple. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| La Cayenne                                                                                      | 4°. 55'. 22". | Peu moins de                    |
| La Grenade                                                                                      | 12°. 6'.      | 3 piés, 6 lignes                |
| La Martinique au<br>Fort Royal, par les<br>observations de<br>1682. faites au<br>Fort S. Pierre | 14°. 37'.     | 3 piés. 6 lignes                |
| par les dernieres<br>observations                                                               | 14°. 44'.     |                                 |
| S. Christophe à un<br>tiers de lieüe du<br>Bourg vers la<br>Montagne des<br>Singes              | 17. 19. 22.   | 3 piés. 6 lignes                |
| Baye S. Louis à<br>la Côte S. Do-<br>mingue au S.<br>O. devant l'If-<br>le des Vaches           | 18. 19.       |                                 |
| Leogane à la Ri-<br>viere la Roüil-<br>lonne                                                    | 18. 40.       |                                 |
| Le grand accul<br>de Leogane                                                                    | 18. 30.       |                                 |
| Le Port de Paix                                                                                 | 19. 58.       |                                 |
| Le Cap                                                                                          | 19. 48.       | 3 piés. 7 lignes.               |

l'on voit ici la grandeur précise de cette diminution selon M. des Hayes. De plus, les autres observations que nous rapportons, faites par M. des Hayes dans des lieux plus Septentrionaux que la Cayenne, & où le Pendule augmente à mesure qu'ils sont plus Septentrionaux,

naux, confirment la premiere decouverte qui demande que la longueur du Pendule à Secondes croisse avec quelque sorte de proportion & de régularité depuis l'Equateur jusqu'au Pole.

On ne parle point de plusieurs autres observations de M. *des Hayes* sur la Déclinaison de l'Aiman dans les differens lieux où il a été, sur les Marées, & sur certaines particularitez de la Navigation. Tout cela enrichit l'Academie, & ne toucheroit pas assez le Public.

## II.

Le P. *Gouye* a donné aussi les Resultats des observations du premier Satellite de Jupiter, faites à *Marseille* par le P. *Laval* Jesuite. Elles assureront toujours de plus en plus la difference de longitude entre cette Ville & *Paris*, & l'hypothese du mouvement de ce Satellite.

## III.

M. *de la Hire* a donné les observations de la hauteur meridienne du Soleil faites à *Tours* par M. *Nonnet* son correspondant les 20, 21, & 22 Juin. M. *Nonnet* ayant pris dans une Eglise une ouverture ronde élevée de plus de 37 pieds, par laquelle passaient à midi les rayons du Soleil qui en alloient former l'image en ovale sur le pavé, calcula exactement par le moyen de deux Triangles que produisoit cette disposition, les hauteurs du bord supérieur, & inférieur du Soleil. Delà il conclut la hauteur apparente du centre, & enfin sa vraie hauteur, en ajoutant & en ôtant ce que demandent la Parallaxe & la Refraction. De la vraie hauteur du centre du Soleil, s'ensuit celle de l'Equateur, en ôtant la déclinaison, & de celle de l'Equateur celle du Pole. Cette operation  
réi-

réitérée trois jours consecutifs donna à M. *Nonnet* trois hauteurs du Pole à *Tours*, dont la plus grande difference n'étoit que de 3 Secondes, & en prenant le milieu entre ces trois hauteurs, il en conclut enfin la latitude de *Tours* de  $47^{\circ}. 26'. 41''$ . Entre différentes operations qui vont à même fin, & qui, comme il arrive toujours, ne s'accordent pas dans la dernière précision, le milieu est toujours le parti le plus sûr, & même le seul qu'on puisse prendre.

## IV.

La durée véritable ou apparente d'un jour, car en cette matiere le vrai & l'apparent se confondent, est mesurée par le retour du Soleil à un même Meridien, d'où l'on suppose qu'il étoit parti. Mais cette durée est toujours inégale d'un jour à l'autre, parce que le mouvement du Soleil est inégal. Premièrement le Cercle qu'il décrit, ou paroît décrire autour de la Terre, est excentrique, & par conséquent le mouvement de cet Astre est plus lent à mesure qu'il approche davantage de son Apogée. En second lieu, le Zodiaque est posé obliquement par rapport à l'Equateur qui est la mesure du temps, & par conséquent des parties égales du Zodiaque passent en des temps inégaux, tantôt plus promptement, tantôt moins, selon leur position particuliere. Selon que ces deux causes d'inégalité dans le mouvement du Soleil sont combinées ensemble, la durée des jours varie. Quelquefois elles conspirent toutes deux à les rendre ou plus longs, ou plus courts, quelquefois l'une moderant l'autre, elles produisent des jours moyens. On n'appelle proprement de ce nom que ceux qui tiennent exactement le milieu entre les plus longs &

& les plus courts. Le mouvement moyen du Soleil, opposé au vrai, ou apparent, est celui par lequel il ne feroit que des jours moyens, toujours égaux les uns aux autres. Une Pendule bien réglée ne peut marquer que le mouvement moyen du Soleil, parce qu'elle doit avoir un mouvement toujours égal ; & par conséquent elle doit tous les jours différer d'avec le Soleil, si ce n'est quand le mouvement vrai du Soleil est le même que le moyen. L'Equation du temps ou des jours est ce qu'il faut ajouter chaque jour au mouvement moyen ou en retrancher pour l'égaliser au vrai, ou pour remettre une bonne Pendule d'accord avec le Soleil.

M. *Carré* donna une Methode de construire les Tables des Equations, & y ajouta quelques reflexions dont voici les principales.

Les jours vrais & les moyens se rencontrent, & sont égaux quatre fois l'année, vers le 10 Février, le 15 Mai, le 25 Juillet, & le 1 Novembre. Depuis le 10 Février, jusqu'au 15 Mai, les jours vrais sont plus courts, & les plus courts se trouvent vers le 27 Mars. Au contraire depuis le 15 Mai jusqu'au 25 Juillet, les jours vrais sont plus longs, & les plus longs sont vers le 20 Juin. Depuis le 25 Juillet jusqu'au 1 Novembre les jours vrais sont plus courts, & les plus courts sont vers le 18 Septembre. Ceux-là sont les plus courts de tous les jours vrais comparez aux moyens, car ils en diffèrent de 22", qui sont le plus grand excès d'un jour moyen sur un vrai. Depuis le 1 Novembre jusqu'au 10 Février les jours vrais sont plus longs, & les plus longs sont vers le 24 Decembre. Ils sont les plus  
longs

longs de toute l'année par rapport aux moyens qu'ils surpassent de 31".

On ne doit pas être étonné que les plus longs jours vrais surpassent plus les moyens, que les moyens ne surpassent les plus courts d'entre les vrais. De la maniere dont se compliquent les deux causes de toute l'inégalité, c'est-à-dire l'excentricité de l'Orbe du Soleil, & l'obliquité du Zodiaque, elles sont disposées plus favorablement pour allonger les jours vrais que pour les accourcir, & quand elles les allongent le plus, l'une diminue moins l'effet de l'autre, que quand elles les accourcissent le plus. Les jours moyens sont ceux où l'une détruit l'effet de l'autre le plus qu'il est possible.

Par la même raison, quoique l'espace qui est depuis le 10 Fevrier jusqu'au 1 Novembre, & celui qui est depuis le 1 Novembre jusqu'au 10 Février suivant soient fort inégaux, & que le premier contienne beaucoup plus de jours que le second, tous les jours vrais du premier pris ensemble ne sont surpassez par autant de jours moyens que de la même quantité de 31'. 55". dont tous les jours vrais du second pris ensemble surpassent les moyens.

\* **L** feroit inutile de parler ici de différentes observations Astronomiques, soit de l'Eclipse de Lune du 22 Fevrier, soit de la Comete vûe à *Paris* au mois de Février 1699, qui fut observée aussi à la Chine par le P. *Fontenai*, & de

\* Voyez les Memoires, pag. 57. 60. 63. 74. 75. 77. 80. 81. 86. 91. 96. 103. 187. 388.

de la comparaifon de ces obfervations , &c. puisque tout ce qui regarde ces fujets eft rapporté tout au long dans les Mémoires , & n'a befoin d'aucun éclairciflement.

**L** arriva cette année dans l'Academie un événement qui eut rapport & à l'Aftronomie , & à la difcipline Académique. M. le Fèvre qui faifoit tous les ans le Livre de la *Connoiffance des Temps* , ayant parlé de deux Academiciens dans la Préface du Livre qu'il fit pour 1701. autrement qu'il ne lui étoit permis de parler de deux de fes Confreres , & de deux hommes de merite , M. le Comte de Pontchartrain voulut d'abord exercer contre lui la plus grande rigueur des loix de la Compagnie , mais à la priere de tous les Academiciens , & des deux même qui pouvoient être offenfés , il fe relâcha , & consentit que M. le Fèvre en fût quitte pour fupprimer fa Préface , & en mettre à la place une autre d'un ftile tout différent. D'un autre côté , comme cette Préface avoit été imprimée à la faveur d'un Privilège général accordé pour la *Connoiffance des Temps* , M. le Chancelier retira ce Privilège dont on avoit abusé , & le donna à l'Academie , afin que le Public ne fût pas privé d'un Livre qui lui étoit fort utile. La Compagnie étant donc chargée de ce nouveau travail , M. l'Abbé Bignon nomma le P. Gouye , & Mrs. l'Abbé Galois , de la Hire , & Homberg , pour en faire chacun un plan , & le rapporter à l'Academie , qui enfuite en formeroit un de toutes leurs différentes idées. Le Public a déjà vû au commencement de 1702.

146 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE  
le premier essai de ce travail, que l'on prétend  
rendre plus parfait.

~~~~~

## GNOMONIQUE.

---

**T**OUTES les operations Mathematiques  
ont leurs difficultez particulieres, aux-  
quelles la Théorie ne touche point, & il y a  
quelquefois autant d'esprit à les surmonter,  
qu'à découvrir de nouveaux Theorèmes.

Quand on fait un Cadran, il faut commen-  
cer par trouver quelle est la position du plan,  
par exemple, du Mur où l'on veut le faire,  
à l'égard du Soleil & des principaux Cercles  
du Ciel. D'abord, la Boussole se présente à  
l'esprit pour cet usage, mais l'experience en  
desabuse bien. Le fer qui est presque par tout  
dans les Bâtimens détourne irrégulièrement  
l'Aiguille aimantée, & lui donne une autre  
déclinaison que celle qu'on lui connoît, & sur  
laquelle on compte, & quand elle n'auroit  
que sa déclinaison naturelle, la Boussole est  
un trop petit Instrument, pour donner préci-  
sément les divisions & les parties de Degré  
qui seroient necessaires à la justesse de l'opera-  
tion.

On a donc eu recours à deux ou trois points  
d'ombre que l'on prend sur le plan du Ca-  
dran. Ils servent à en déterminer la position,  
& à trouver ensuite par la Théorie de la Gno-  
monique toutes les lignes que l'on veut re-  
présenter. C'est d'eux que dépend toute la  
jus-



justesse du Cadran. On les prend dans un même jour, à trois ou quatre heures l'un de l'autre. Il faut les prendre les plus écartez qu'il soit possible, parce que tous les autres points, & les lignes intermediaires, sont ensuite plus dé mêlées.

Pour avoir ces points aussi écartez qu'il se puisse, il faut deux choses.

1°. Il faut les prendre dans les Solstices, ou à 10, ou 12 jours tout au plus, parce que plus le Soleil est éloigné de l'Equateur, qui d'ordinaire est représenté sur le Cadran par une ligne droite, plus les lignes qui représentent les Cercles paralleles à l'Equateur, sont sensiblement courbes, & par conséquent plus leurs points qui répondent aux mêmes heures sont éloignez les uns par rapport aux autres.

2°. Il faut que le Stile soit long, car l'ombre de son extrémité en fait d'autant plus de chemin, & les points qui marquent les mêmes heures en sont d'autant plus éloignez.

Mais & la saison des Solstices, & la longueur du Stile ont leurs inconveniens.

Il est fort incommode de travailler à l'air dans l'un ou dans l'autre Solstice. Souvent le Soleil ne paroît pas aussi long-temps, ou aussi souvent qu'il faudroit pendant un jour, & enfin c'est une grande sujétion de n'avoir que ces deux temps fort courts pour faire un bon Cadran.


C'est précisément l'ombre de l'extrémité du Stile qu'il faut avoir, c'est-à-dire, l'ombre d'un seul point. Or il est difficile de l'avoir exactement, parce que les extrémités d'une ombre sont toujours mal terminées, & incertaines, & d'ailleurs la lumière a un certain tremble-

ment qui devient plus sensible à l'extrémité de l'ombre d'un plus grand corps. C'est pour cela que feu M. *Picard*, & M. *de la Hire* ont inventé chacun une différente Platine, pour prendre plus exactement l'ombre du bout du Stile. On en peut voir la description dans le Traité de Gnomonique de M. *de la Hire*, imprimé en 1698.

Mais quelque ingenieuses que soient ces Methodes, M. *Parent* a remarqué qu'avec leur secours, il est encore mal-aisé d'avoir bien juste l'ombre du bout du stile, & il a imaginé un autre moyen qui donne cette ombre très-exactement, & en même temps rend la construction du Cadran indépendante du Solstice. De plus, les points d'ombre qu'on est assujetti par les methodes ordinaires à prendre dans le même jour, peuvent être pris dans des temps fort éloignez, fût-ce de six mois.

La methode de M. *Parent* consiste dans l'usage d'un Instrument *DBHFG*, qui est une espece de Chassis, dont les deux côtez *BH*, *FG*, sont assemblez solidement & parallelement entre-eux. *FG* doit avoir environ 2 pieds de longueur, & on y met une lunette qui ait deux fils croisez à son Foyer. Sur le côté *HBD* dans toute sa longueur *BD* il doit y avoir à la face opposée à la lunette, une coulisse ou rainure, exactement parallele à l'axe de la lunette. *BD* doit se terminer en une pointe *D* qui soit en ligne droite avec la rainure.

On choisit pendant la nuit une Etoile fixe à volonté. L'Observateur la voit avec la Lunette *FG*, & en même temps il porte sur son épaule l'Instrument *DBHFG*, le côté *HB*



étant celui qui pose sur l'épaule, ce qui détermine la distance des deux côtes parallèles de l'Instrument à n'être que d'un pié tout au plus. Il faut que l'Observateur ait engagé dans la

rainure le bout du Stile qu'il destine à son Cadran, & qu'en même temps il tourne le dos au Mur où il le veut tracer. Par conséquent la pointe *D* est alors en l'air, & dans cette situation, ne perdant point de vûe l'Etoile qu'il voit à l'intersection des fils, il marche peu à peu à reculons vers le mur, jusqu'à ce qu'il le frappe avec la pointe *D*. Il est visible par la construction de l'Instrument, & par la nature de l'operation, que ce point *D* marqué sur le mur, est l'extrémité très-exacte d'un rayon conduit depuis l'Etoile par le bout du Stile jusqu'au mur, & l'on voit en même temps par cet usage, quelles sont les attentions principales que demandent & la construction de l'Instrument & l'operation.

On prend de la même maniere un second, ou un troisième point d'ombre de la même Etoile, mais aux heures les plus éloignées qu'il se puisse. Il n'importe aucunement que ce soit dans la même nuit, parce que le mouvement propre des Fixes étant extrêmement lent par rapport à celui du Soleil, on les retrouve encore au bout de six mois dans la même position sensible, au lieu qu'on n'y retrouveroit pas le Soleil d'un jour à l'autre.

Il faut prendre l'Etoile le plus près de l'Equateur qu'il se puisse; il est clair que les points d'ombre à différentes heures en seront plus écartez.

Pour s'assurer davantage de l'operation, on peut prendre avec différentes Etoiles les points d'ombre dont on a besoin. Si les lignes qu'on a à tracer par le moyen de ces points, se trouvent être les mêmes en se servant des points de différentes Etoiles, l'operation a été faite  
dans

dans toute la justesse possible. Si elles ne sont pas les mêmes, il en faut tirer d'autres qui tiennent précisément le milieu.

En ajoutant à l'Instrument sur *B D* une rainure opposée & parallele à celle qui est absolument nécessaire, on le mettra en état de se verifier lui-même. Car on pourra le tourner sur les deux faces opposées du côté *B D*, & dans ces deux situations voir la même Etoile, le bout du Stile étant toujours engagé dans l'une ou l'autre rainure. Et si l'on trouve toujours le même point sur le Mur, les deux côtes *H B D*, *G F*, sont dans un parallelisme exact, ce qui est toute la perfection de l'Instrument.

A cette nouvelle invention qui n'est que pour la pratique des Cadrans, *M. Parent* en a joint deux autres qui regardent la Théorie.

Il y a un Cadran portatif fort ingénieux, & fort usité dans les Boussoles, inventé par *M. de Vaulsard*. C'est un Azimuthal joint avec un Horizontal. Il a de grands avantages, mais il est toujours déterminé à une certaine hauteur de pole, & est inutile hors de là. *M. Parent* ayant cherché assez long-temps à lui ôter ce défaut, & à le rendre universel\*, y est enfin parvenu. Le nouveau Cadran de *M. Parent* a aussi la commodité de n'avoir besoin d'aucune Meridienne étrangere, & de s'orienter de lui-même.

Mais il est vrai qu'il est chargé d'un grand nombre de lignes, dont plusieurs même sont Courbes, & difficiles à décrire. *M. Parent* en a donc encore imaginé un qui conserve tous les avantages du premier, qui est universel, qui s'oriente de lui-même, & qui avec tout

cela n'est que rectiligne. Il semble que le travail puisse tout. Le détail de la construction de ces deux nouveaux Cadrans est trop géométrique , & n'est pas du ressort de cette Histoire.



# GEOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE.

---

## SUR UN PROJET .

D'UN NOUVEAU PORTULAN  
POUR LA MEDITERRANEE.

**L** Es Sciences qui sont de pratique sont les moins avancées. Deux ou trois grands Genies suffisent pour pousser bien loin des Théories en peu de temps , mais la pratique procède avec plus de lenteur , parce qu'elle dépend d'un trop grand nombre de mains , dont la plupart même sont peu habiles. La Géographie & l'Hydrographie qui demanderoient un nombre infini d'operations exactes dans tous les Pays , & sur toutes les Mers , sont imparfaites à proportion de ce nombre , & de l'exactitude dont elles auroient besoin , & l'on peut compter que la description du Globe terrestre , quoiqu'elle commence un peu à se rectifier , est encore fort confuse , & fort peu res-  
sem-

semblante. Plus on entreprend de détail, plus il y a d'erreur. Ainsi nous n'avons point de Cartes Géographiques ou Hydrographiques plus défectueuses, que les Portulans, où l'on veut représenter la disposition des Côtes, les Caps, les Golpes, les vûes & les aspects des terrains &c.

M. de *Chazelles* Ingenieur & Hydrographe des Galeres de *France*, qui a fait un grand nombre de voyages tant en Levant qu'en Ponant, & qui a toujours songé à les rendre utiles aux Sciences, s'est convaincu par lui-même du grand nombre d'erreurs des Cartes Géographiques & Hydrographiques & des Portulans de la Méditerranée. Ce ne seroit pas la peine de relever les fautes des Cartes anciennes, & *Ptolemaïques*, où la Méditerranée est d'un bon quart plus étendue en longitude qu'elle ne l'est effectivement; il s'agit ici des Cartes modernes, qui quoiqu'elles soient ordinairement meilleures à mesure qu'elles sont plus modernes, ont encore besoin de beaucoup de corrections. Et ce qui le prouve évidemment, c'est qu'avec leur secours seul, & la Théorie de la navigation, on ne navigeroit pas sûrement, & qu'il faut prendre des Pilotes qui connoissent les lieux, & dont l'expérience tienne lieu d'une bonne Carte. Cependant l'intention du Roi en établissant des Ecoles d'Hydrographie dans ses Villes maritimes, & dans ses Arsenaux, a été d'accourcir par une bonne Théorie le temps nécessaire pour faire des Pilotes experimentez, & c'est ce qui arrivera effectivement quand les Cartes seront si fidelles, que l'on n'aura plus qu'à y appliquer les principes de la Navigation.

M. de *Chazelles* ayant fait par lui-même une grande quantité d'observations , & ayant ramassé tout ce qu'il a pu trouver de Cartes faites par des Ingenieurs que le Roi avoit envoyez exprès, de Journaux de navigation , de Memoires de Pilotes &c. il a résolu d'en faire un nouveau Portulan de toute la Méditerranée , plus exact que tous les précédens , il en a communiqué le Projet à l'Academie dans un assez grand détail pour donner une idée juste de tout l'Ouvrage , & même il a fait espérer qu'on en verroit la fin.

Le même de M. de *Chazelles*, aussi-tôt qu'il vit la nouvelle union des Couronnes de *France* , & d'*Espagne* , songea aux avantages que les Sciences en pouvoient retirer , tandis que les Politiques n'y confideroient que le changement des affaires de l'*Europe*. Il proposa la maniere dont on pourroit faire plus facilement & plus commodément que jamais , à la faveur de cette union , un Voyage autour du monde , qui embelliroit de quantité de nouvelles observations, l'Astronomie, la Géographie, & l'Histoire naturelle.



~~~~~

# ACOUSTIQUE.

---

## SUR UN NOUVEAU SYSTEME DE MUSIQUE.

\* **A**PRE'S que M. *Sauveur* a laissé voir dans l'Histoire de 1700†. un échantillon de son Acoustique, ici il embrasse une plus grande étendue, & propose un Système de Musique tout nouveau, avec de nouveaux caractères, & de nouvelles Regles, qui changeroient entièrement la pratique ordinaire des Musiciens.

C'est une chose qui peut paroître étonnante, que de voir toute la Musique réduite en Tables de Nombres, & en Logarithmes, comme les Sinus ou les Tangentes & Secantes d'un Cercle. Quel rapport de ces Sons qui ne cherchent qu'à flater l'oreille, avec ces Nombres qui ne sont que le triste fruit d'une longue & épineuse recherche de Mathématique ?

Pour découvrir ce rapport, il faut établir pourquoi certaines choses plaisent ou déplaisent

G 6

fent

\* Voyez les Memoires, pag. 390. † Pag 166.

sent à l'Ame , & remonter jusqu'à la Metaphysique des Agrémens.

L'Ame par sa nature aime en même temps & les perceptions simples, parce qu'elles ne la fatiguent point, & les perceptions variées, parce qu'elles lui épargnent l'ennui de l'uniformité. Si une perception peut être à la fois simple & variée, ne point fatiguer l'ame, & lui fournir cependant de la diversité, elle satisfait tout ensemble les deux inclinations contraires. Toute variété qui plaît à l'Ame est donc renfermée dans certaines bornes, il faut qu'elle soit en deça du point où elle deviendrait difficile à apercevoir, confuse, trop mêlée, trop compliquée &c.

Dès perceptions qui par elles-mêmes ne plairoient point à l'Ame, peuvent avoir été si souvent unies soit nécessairement, soit par hazard, avec celles qui lui plaisent, ou même elles peuvent lui en rappeler si naturellement & si vivement le souvenir, qu'elles font presque le même effet, & se rendent dignes d'être rangées dans le même ordre.

En fait de Sons, la perception la plus simple que l'ame puisse avoir, est celle de l'Unisson, puisque les Vibrations des deux Sons commencent & finissent toutes ensemble. Ce qu'il y a ensuite de plus simple, c'est l'Octave, où le Son le plus aigu fait précisément deux Vibrations, pendant que le plus grave en fait une, & où par conséquent autant que le Son grave fait de vibrations, autant de fois les vibrations des deux Sons se rencontrent, ce qui ne diffère presque pas de l'Unisson, puisque du moins toutes les vibrations du Son grave ne commencent & ne finissent qu'avec des vi-  
bra-

brations de l'aigu. Aussi l'Unisson & l'Octave passent-ils presque pour le même accord, & comme un Son porte naturellement à l'esprit l'idée d'un autre Son égal, c'est-à-dire qu'il fait aisément imaginer l'Unisson, de même, pourvu qu'on ait l'oreille un peu exercée en cette matiere, un Son, quoiqu'on l'entende seul, fait aisément imaginer l'autre Son qui est à son Octave. Ce sont deux accords si simples que quand même l'oreille ne les entend pas actuellement, elle les supplée aux Sons qu'elle entend.

Qu'un Son fasse deux vibrations tandis qu'un autre plus aigu en fait trois, & qu'ainsi leurs vibrations se rencontrent toujours à chaque seconde vibration du plus grave, & qu'enfin l'on conduise de suite ces rapports, ou ces rencontres de vibrations par les nombres, 3 & 4, 4 & 5, 5 & 6, &c. il est clair que les rencontres de vibrations deviendront toujours plus rares, & par conséquent les accords, & les perceptions de l'ame moins simples, que d'un autre côté ces perceptions moins simples seront agréables par être plus variées, parce qu'en effet plus les vibrations de deux Sons se rencontrent rarement, plus il y a de diversité dans tous les mouvemens d'entre-deux, mais qu'enfin cette diversité deviendrait une confusion désagréable dans ses premiers degrez, & ensuite insupportable, qu'il faut donc qu'il y ait un certain terme où finisse l'agrément de la variété, & ce qui est la même chose, de la rareté des rencontres des vibrations, & que ce terme est formé de deux nombres plus grands que tous ceux qui font les accords agréables.

Cela revient à ce qui a été dit dans l'Histoire de 1700\* , qu'apparemment les Consonances sont les accords, où les rencontres des vibrations se font assez fréquemment , pour ne pas laisser sentir les *battemens* , qui à cause de la trop grande inégalité du Son déplaisent à l'oreille.

Le terme de l'agrément des accords n'a pas été si précisément posé par la nature , qu'on le puisse démontrer à toute rigueur. Peut-être n'y a-t-il point d'accords desagréables pour des oreilles peu exercées , & cette délicatesse qui nous fait porter des jugemens si severes ne paroît être qu'un mélange de quelque chose de naturel avec un long usage , une attention exacte , d'anciennes habitudes , & des préjugés arbitraires. Dans ce composé, ce qui n'est point naturel, peut souvent & assez facilement étouffer ce qui l'est , & delà vient l'extrême différence du goût des Nations sur la Musique. Cependant à consulter la nature autant qu'il est possible , on ne laisse pas de déterminer à peu près quelque point fixe. L'accord de 5 à 6 est le dernier qui soit agréable , celui de 6 à 7 ne l'est plus , les rencontres des vibrations y sont trop rares.

Ce n'est pas qu'il n'y ait des accords qui plaisent , quoique ces rencontres y soient encore plus rares , par exemple , ceux de 8 à 9 , de 9 à 10. Mais il faut remarquer qu'ils ont une espece d'affinité avec d'autres accords qui plaisent par eux-mêmes. Car que l'on ait entendu plusieurs fois l'accord de 2 à 3 & celui de 3 à 4 , on est porté naturellement à imagi-

ner

ner la différence qui est entre eux , elle s'unit & se lie avec eux dans nôtre esprit , & participe à leur agrément , & cette différence est précisément l'accord de 8 à 9. Il en va de même de 9 à 10, qui est la différence des deux accords agréables , 3 à 4 , & 5 à 6.

Par une raison semblable, un accord qui de lui-même ne plairoit point , plaira , s'il achève l'Octave d'un autre accord agréable. Ce dernier accord entendu plusieurs fois avec plaisir , aura conduit l'ame à imaginer ce qui y manquoit pour aller jusqu'à l'Octave, & comme l'Octave lui plaît , l'accord qui en est le complément se fera lié à une idée agréable. Ainsi l'accord de 8 à 5 tire tout son agrément de ce qu'il remplit l'Octave de 5 à 4.

Il est visible que les différentes causes des agrémens leur donnent différens degrez , & que ceux qui ne sont qu'empruntez cedent à ceux qui sont naturels.

L'accord de 6 à 7 étant donc composé de trop grands nombres pour être agréable par lui-même , & n'ayant d'ailleurs nulle liaison naturelle avec aucun autre qui le soit , celui de 7 à 8 ayant aussi ces deux défauts , il se fait dans cet endroit de la suite naturelle des Nombres une espece de vuide , par rapport à l'agrément des accords , car immédiatement après viennent 8 à 9 , & 9 à 10 , avec un agrément étranger. Ensuite il reparoit des vuides , interrompus de temps en temps par des nombres qui sont des accords agréables , mais seulement du second ordre. Il n'y a que les nombres , 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui marchent en fournissant toujours sans interruption des accords agréables, & les plus agréables de tous. Les intervalles

les ou rapports géométriques des nombres, qui forment les accords, sont ce qu'on appelle absolument en Musique *Intervalles*.

Les premiers Musiciens qui conduisant leur voix par degrez depuis le ton le plus bas jusqu'au plus haut, ont fait ce que nous appelons aujourd'hui UT, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, ut, ont formé cette suite de tons, non pas en s'étudiant & en s'assujettissant à passer toujours par des degrez égaux, & à hausser également leur voix, mais en consultant leur oreille pour faire toujours succéder des tons agréables les uns aux autres. De plus, ils ont eu naturellement égard à rendre agréables à leur oreille, autant qu'il étoit possible, les différens assemblages des tons, comme UT, MI; UT, FA; UT, SOL; &c. Par là, ils sont tombez nécessairement dans les accords formez par les nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aussi-bien que dans plusieurs autres, qui en sont les suites.

Les intervalles de deux tons consecutifs, comme UT, RE; RE, MI; MI, FA; &c. que l'on appelle *Secondes* ont donc été faits tels qu'ils sont, non pour être égaux, mais pour être agréables, & pour rendre agréables les Intervalles plus grands qu'ils composent, comme les *Tierces*, les *Quartres*, les *Quintes*, &c. qui sont ceux où l'on compare deux tons entre lesquels il y a un ton, deux tons, trois tons, &c. Lorsque quelques-uns de tous ces Intervalles sont égaux entre eux, ce n'est que par une espece de hazard. Cette division inégale, & les différens rapports de nombres qui en resultent, tombent sous les yeux même par la division d'un Monochorde, dont différentes parties rendent tous ces Sons.

Dans

Dans la suite UT, RE &c. ut, qui fait l'Octave, il n'y a point de Seconde plus petite que ces deux, MI, FA; SI, ut; leur rapport est de 15 à 16, & elles s'appellent *Semitons majeurs*. Toutes les autres Secondes sont des tons, mais de deux especes differentes, RE, MI; SOL, LA; sont des *Tons mineurs*, dont le rapport est de 9 à 10, & les Secondes UT, RE; FA, SOL; LA, SI, sont des *Tons majeurs*, dont le rapport est de 8 à 9, & par conséquent plus grand que celui de 9 à 10.

Les Secondes étant les plus petits intervalles de l'Octave, en peuvent être appellées les *Elemens*, & ces Elemens sont deux Semitons majeurs, deux Tons mineurs, & trois Tons majeurs. La differente situation des Elemens entre eux fait que des Intervalles du même nom comme des Tierces, des Quartes, &c. ne sont pas formées des mêmes Elemens, quoiqu'il y en entre toujours le même nombre, & il y a telle Quarte, par exemple, qui est agréable, & telle autre qui ne l'est pas, & ainsi des autres accords, sur tout quand on passe d'une Octave dans une autre. Les intervalles ou accords que l'Oreille admet avec plaisir, sont appelez *parfaits* ou *bons*, & ceux du même nom qu'elle rejette, sont appelez *faux* ou *imparfaits*. Les uns & les autres sont compris dans la suite naturelle UT, RE, &c. ut, re &c.

Les Musiciens ont songé à rectifier les accords imparfaits, en leur transportant une partie de l'agrément des parfaits, c'est ce qu'ils appellent *Temperer*. Ils prennent un milieu entre les uns & les autres, mais comme l'Oreille à qui l'on a toujours affaire est extrêmement délicate, il faut bien se donner de garde d'al-

terer

terer trop les accords qui lui plaisent par eux-mêmes, & de plus parce qu'il y a plusieurs accords parfaits auxquels on doit le même égard, il faut faire enforte qu'ils ne soient à peu près qu'également alterez.

Un *Temperament* produit necessairement une nouvelle division de l'Octave, ou, ce qui revient au même, de nouveaux Elemens. Par exemple, au lieu qu'elle avoit naturellement pour Elemens le Semiton majeur, le Ton majeur & le mineur, on prendra un ton moyen formé du majeur & du mineur, & elle n'aura plus pour Elemens que le Semiton majeur & ce Ton moyen, ce qui rend égaux les cinq Intervalles qui sont des tons, & moins inégaux à ceux-ci les Intervalles qui sont des Semitons. On peut aussi diviser chacun des cinq tons de l'Octave en Semitons, qui joints aux deux qu'elle avoit naturellement en font 12, & alors on partageroit toute l'Octave en 12 parties égales qui seroient des Semitons moyens. Il est aisé d'imaginer encore d'autres especes de *Temperamens*, la difficulté n'est que d'en rencontrer qui soient exempts d'inconveniens considerables, c'est-à-dire, qui n'alterent pas trop ou tous les accords parfaits, ou quelques-uns seulement. Toutes les différentes divisions que l'on peut faire de l'Octave, peuvent s'appeller *Systèmes de Musique*.

Il y a encore une autre raison que celle des *Temperamens* pour faire différens *Systèmes*. Le Semiton majeur est la plus petite partie qui entre dans la suite naturelle UT, RE, &c. mais il s'en faut bien que ce ne soit le plus petit intervalle où les voix & les Instrumens puissent aller. Ainsi quand on fera une division plus  
fine.



fine de l'Octave, & qu'il y entrera des intervalles moindres, &, pour ainsi dire, plus délicats, ce seront de nouveaux Systèmes. Par rapport à cette idée, on en a établi trois, le Système Diatonique qui est la suite naturelle des tons, qui n'a point de plus petite partie que le Semiton majeur, & qui est propre pour le Plain-chant, le Chromatique où l'Octave est divisée en douze demi tons, & l'Enharmonique, où ces demi-tons sont encore subdivisez. Il est clair que ces deux derniers doivent donner une Musique plus variée, & plus figurée que le premier.

Le Système Chromatique & l'Enharmonique retombent souvent dans le Diatonique, & ont des parties ou des intervalles communs avec lui, parce qu'enfin les accords parfaits compris dans le Diatonique sont comme des points fixes auxquels il faut toujours revenir, ou dont il n'est permis de s'écarter que très-peu. C'est-là une loi générale & indispensable à laquelle se doivent soumettre tous les Systèmes, tous les Temperamens, en un mot toutes les divisions & toutes les combinaisons possibles de Musique.

Pour pouvoir comparer les différens Systèmes les uns aux autres, & juger de leurs avantages, ou desavantages reciproques, pour reconnoître avec sûreté les erreurs des Systèmes Temperez, & en avoir une mesure exacte, en un mot, pour rassembler en quelque sorte sous un seul-coup d'œil, & pour rapporter à des règles précises, & invariables, la variété infinie dont tous les rapports qui composent la Théorie de la Musique sont susceptibles, il seroit à souhaiter que l'on eût un Système général.

ral dans lequel tous les autres Systèmes imaginables pussent rouler, qui divisât l'Octave en si petites parties qu'il fût impossible ou du moins inutile de la diviser davantage, & qui en même-temps la divisât si juste, que l'Oreille n'eût rien à desirer sur les accords parfaits.

C'est un Système de cette espece que M. *Sauveur* a trouvé, & qu'il propose ici au Public. Il divise le ton moyen en 7 parties, dont il en donne 4 au Semiton majeur, & 3 au mineur, moyennant quoi l'Octave qui contient 5 tons moyens, & 2 Semitons majeurs, a 43 parties, qu'il appelle *Merides*. Chaque Meride se divise en 7 parties qui se nomment *Eptamerides*, & par conséquent l'Octave contient 301 Eptamerides.

Une Eptameride est le rapport de 434 à 435, desorte que quand il manque une Eptameride à un accord ou à un intervalle, c'est un son qui au lieu de faire 435 vibrations en un certain temps, n'en fait que 434, ou au contraire; or cette erreur est ordinairement insensible, même pour les Musiciens; mais enfin pour contenter ceux qui pousseroient la rigueur jusqu'au dernier excès, M. *Sauveur* divise encore chaque Eptameride en dix parties, qu'il appelle *Decamerides*.

On fait donc au juste par son Système l'étendue des erreurs, & jusqu'à quel point on peut se les permettre. De plus comme la division de l'Octave en 301 parties le rend fort ample, tous les autres Systèmes y tournent facilement, & l'on y découvre sans peine tous les rapports qui les composent, plus démêlez, plus développez, & en quelque sorte, mis dans

un

un plus grand jour. C'est ce que l'on verra par l'application de ce Systême à l'ancien Systême des *Grecs*, qui nous paroît aujourd'hui si obscur, & à celui des *Turcs* & des *Persans*, dont la Musique semble être d'une autre espèce que la nôtre. Enfin dans les nombres que M. *Sauveur* a choisis, il y a quelque chose d'heureux & de commode, qui ne manquera pas de se faire sentir par la pratique.

Si selon ce qui a été dit dans l'Histoire de 1700. on peut arriver à la détermination d'un Son fixe, ce sera encore une grande augmentation de beauté pour le Systême de M. *Sauveur*. Tous les Sons possibles partiroient d'un point déterminé, & s'y rapporteroient; en tout cas, si le Son fixe manque, il faudra se contenter du ton de la Chapelle ou de l'Opera, qui n'est déterminé qu'à peu près.

Le Systême nouveau donne une extrême facilité de trouver tous les rapports qui composent les Systêmes particuliers sur lesquels les Instrumens de Musique ont été construits, car ils ont presque tous chacun le leur, & de comparer entre eux ces differens Systêmes, ce qui peut même conduire à imaginer de nouveaux Instrumens, & peut-être plus parfaits.

Comme il arrive souvent qu'une recherche, ou même une découverte, n'est, pour ainsi dire, que l'Episode d'une autre, M. *Sauveur* en examinant la Théorie de certains Instrumens, qui vont par sauts, & passent irrégulièrement d'un ton à un autre, fut obligé, pour en rendre raison, de recourir à des expériences qui lui produisirent un Phenomene dont il fut d'abord extrêmement surpris. Car quel Philosophe auroit cru qu'un corps mis en mouvement

ment de maniere que toutes ses parties y doivent être , en conserve cependant quelques-unes immobiles dans de certains intervalles, ou plutôt en rend quelques-unes immobiles par une certaine distribution qu'il semble faire entre elles du mouvement qu'il a reçu?

Si une Corde d'Instrument est tendue sur une Table, & qu'un Chevalet mobile qui coule sous la Corde soit arrêté sous quelqu'un de ses points, enforte que quand on pincera par le milieu l'une des deux parties déterminées par la position du Chevalet, l'autre ne participe point du tout à l'ébranlement, il est certain & connu de tout le monde, que le ton de la partie pincée sera au ton de toute la corde, selon la proportion des longueurs de cette partie, & de la corde entière. Si cette partie est  $\frac{1}{2}$ , elle sera à l'Octave en enhaut de toute la Corde, si elle est  $\frac{1}{4}$ , elle sera à la double Octave &c. Et si dans ce dernier cas, au lieu de pincer la partie qui est  $\frac{1}{4}$ , on pinçoit l'autre qui est  $\frac{1}{4}$ , il est encore indubitable que les longueurs de cette partie, & de la corde étant 3, & 4, leur accord seroit une Quarte. De même toutes les fois que le Chevalet diviser la corde en parties inégales, l'accord d'une partie ou de l'autre avec la Corde sera différent.

Mais si le Chevalet n'empêche pas entièrement la communication des vibrations des deux parties, si ce n'est qu'un obstacle léger, les deux parties quoiqu'inégales, rendent le même ton, & font le même accord avec la Corde entière.

Il ne seroit pas surprenant qu'elles fussent toutes deux à l'Unisson de la Corde; on conce-

cevrait alors que l'obstacle léger ne les empêcherait point de faire les mêmes vibrations que la corde entière, & qu'il ne tiendrait lieu de rien. Mais il est effectivement obstacle, il détermine les parties de la corde à être effectivement parties, & à rendre un ton différent de celui du tout, & la merveille est qu'à des parties inégales il leur laisse le même ton. Si, par exemple, l'obstacle est au quart de la corde, non seulement ce quart étant pincé rend la double octave aigue de la corde, mais l'autre partie qui est de trois quarts, & qui devrait donner la Quarte de la Corde entière, ne donne que cette même double Octave.

Sur ce Phenomene si bizarre, M. *Sauveur* imagina d'abord que puisque ces  $\frac{1}{4}$  de corde rendoient le même ton que  $\frac{3}{4}$ , ils devoient absolument ne pas faire des vibrations proportionnées à leur longueur, qu'il falloit qu'ils se partageassent en 3 parties égales chacune au premier quart, & qui fissent chacune leurs vibrations séparément. Alors c'étoit la même chose que si on eût pincé à la fois ces 3 parties égales, elles eussent été toutes à l'unisson entre elles, & avec le premier quart, c'est-à-dire à la double octave aigue de la corde.

Cela supposé comme vrai, il y a donc nécessairement entre les vibrations de deux parties égales un point immobile, qui ne suit ni l'une ni l'autre vibration, & par conséquent 2 points immobiles dans les trois quarts de la corde, & 3 dans la corde entière, en comptant pour un de ces points, celui où est posé l'obstacle léger, puisqu'il est effectivement entre deux vibrations. M. *Sauveur* appella ces vibrations partiales & séparées, *Ondulations*, leurs points

points immobiles, *Nœuds*, & le point du milieu de chaque vibration, où par conséquent le mouvement est le plus grand, *Ventre de l'ondulation*. Ces expressions nouvelles, que la nouveauté du sujet rendoit nécessaires, furent tirées de l'Astronomie, & principalement du mouvement de la Lune, & parurent propres à donner une image sensible du fait.

Lorsque M. *Sauveur* apporta à l'Academie cette experience de deux tons égaux sur les deux parties inégales d'une corde, elle y fut reçue avec tout le plaisir que font les premières découvertes. Mais quelqu'un de la Compagnie se souvint que celle-là étoit déjà dans un Ouvrage de M. *Wallis*, où, à la vérité, elle n'avoit pas été remarquée comme elle meritoit, & aussi-tôt M. *Sauveur* en abandonna sans peine tout l'honneur à l'égard du Public. Quant à la pensée des Nœuds, qui n'étoit encore qu'une espece de petit Systeme, on trouva dans l'Assemblée le moyen d'éprouver si elle étoit vraie. On mit sur les points de la Corde, où se devoient faire, suivant la supposition, les nœuds & les ventres des ondulations, de très-petits morceaux de papier à demi pliez, qui devoient tomber sans peine au moindre mouvement, on pinça la corde, & l'on vit avec beaucoup de contentement, & même d'admiration que les petits papiers des ventres tomberent aussi-tôt, & que ceux des nœuds demeurerent en place. Dans la suite pour les distinguer mieux, on fit les uns rouges, & on laissa les autres blancs. Desorte que les blancs & les rouges étoient disposez alternativement. On vit toujours qu'il n'y avoit que ceux d'une couleur qui tombassent.

Ces

Ces points qui d'espace en espace se maintiennent immobiles entre tous les autres points qui se meuvent, & dans un corps qui auroit dû prendre du mouvement selon toute sa longueur, seroient sans doute une grande merveille pour un Physicien qui n'y auroit pas été préparé, & amené par degrez.

Il paroît par là que l'obstacle léger placé, comme nous l'avons toujours supposé jusqu'ici, sur  $\frac{1}{4}$  de la Corde, n'empêche pas à la vérité la communication des vibrations des deux parties inégales, parce qu'il est léger, mais empêche une communication facile, parce qu'enfin il est obstacle. Il détermine d'abord les deux parties à faire leurs vibrations séparément, & indépendamment l'une de l'autre, mais comme elles sont inégales, la plus petite fait ses vibrations beaucoup plus vite, & parce qu'elle communique toujours avec l'autre qui est plus lente, elle la hâte, & la force à suivre son mouvement. Or cette partie plus grande ne peut jamais à cause de sa longueur faire ses vibrations en même temps que la plus petite, & lui obéir, à moins qu'elle ne se partage en parties toutes égales à cette petite, qui domine à cause de sa vitesse.

Si au lieu de mettre l'obstacle sur  $\frac{1}{4}$  de la Corde, on le met sur  $\frac{1}{3}$ , sur  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{7}$  &c. il est clair que ce sera toujours la même chose, & que le ton des  $\frac{2}{3}$ , des  $\frac{4}{5}$ , des  $\frac{5}{6}$  &c. ne sera que celui de  $\frac{1}{3}$ , de  $\frac{1}{5}$  &c. En un mot, l'obstacle léger étant posé sur une partie aliquote quelconque, c'est elle seule qui donne le ton à la partie plus grande qui est de l'autre côté.

Mais si l'obstacle n'est point posé sur une aliquote, par exemple, si la corde ayant 5 parties,

il est sur les  $\frac{2}{7}$ , ces  $\frac{2}{7}$  forçant d'abord les  $\frac{1}{7}$  qui sont de l'autre côté à prendre une vitesse égale à la leur, ces  $\frac{1}{7}$  ne la peuvent prendre qu'en s'accourcissant, & en s'égalant aux  $\frac{2}{7}$ . Il reste donc  $\frac{1}{7}$  qui est la plus petite partie, & dont les vibrations sont les plus promptes. Cette petite partie qui n'a point été déterminée d'abord par la position de l'obstacle, qui ne se forme que dans la suite & par une conséquence de la formation des autres, ne laisse pas de donner la loi à tout le reste, & le ton des  $\frac{2}{7}$ , & celui des  $\frac{1}{7}$  de la corde, n'est également que celui de  $\frac{1}{7}$ . Si l'obstacle étoit mis sur  $\frac{2}{7}$  de la corde, il est évident que par la même raison elle se partageroit en 7 parties. Il en va de même de tous les autres cas semblables.

En appliquant cette hypothèse à un obstacle mis sur les  $\frac{1}{10}$  d'une corde, il semble que ces  $\frac{1}{10}$  partageant d'abord la corde en parties égales à elles, il resteroit pour petite partie qui devoit emporter le reste,  $\frac{9}{10}$  c'est-à-dire  $\frac{1}{10}$ , & qu'ainsi la corde se partageroit en dix parties. Mais il faut remarquer que l'obstacle doit toujours à l'endroit où il est former un nœud, parce qu'effectivement il arrête en partie les vibrations, & est le premier principe qui les change. Or dans la supposition présente si la corde se partageoit en 10, l'obstacle se trouveroit sur un ventre d'ondulation, & non sur un nœud, ce qui est impossible, & par conséquent il faut que la corde se partage en 20.

Donc que l'obstacle soit mis sur une partie aliquote, ou sur une qui ne le soit pas, la corde se partage toujours dans le nombre de parties marqué par le dénominateur de la fraction.



On suppose que cette fraction soit réduite à ses moindres termes, car si l'on prenoit,  $\frac{1}{12}$  de la corde, ce ne sont que  $\frac{1}{4}$ , & la corde se partageroit en 4.

Dela il s'ensuit que quelque différentes que soient les parties où l'on met l'obstacle, le ton est le même toutes les fois que le dénominateur de la fraction est nécessairement le même. Par exemple, la corde étant de 20 parties, il sera indifférent de mettre l'obstacle sur  $\frac{1}{20}$ ,  $\frac{2}{20}$ ,  $\frac{3}{20}$ ,  $\frac{4}{20}$ ,  $\frac{5}{20}$ ,  $\frac{6}{20}$ ,  $\frac{7}{20}$ ,  $\frac{8}{20}$ , mais non pas sur  $\frac{9}{20}$ ,  $\frac{10}{20}$ ,  $\frac{11}{20}$  &c.

En faisant couler l'obstacle successivement sur les 20 divisions de la corde, il est aisé de voir quels seront les accords ou intervalles des sons des différentes parties de la Corde, comparez au son de la corde entière. Soit pour exemple la petite Table suivante.

|                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Parties de la Corde<br>divisée en 20. | Intervalles des Sons de<br>différentes parties à ce-<br>lui de la corde entière. |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 1. | Tierce Majeure de la 4 Octave aigue. |
|----|--------------------------------------|

Car 1 par rapport à 16 donne la 4 Octave aigue, &  $\frac{1}{16}$  ou  $\frac{1}{4}$  est la Tierce majeure.

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 2. | Tierce majeure de la 3 Octave aigue. |
|----|--------------------------------------|

Car  $\frac{2}{20}$  est  $\frac{1}{10}$ . Or 1 par rapport à 8 est la 3 Octave aigue, &  $\frac{2}{8}$  ou  $\frac{1}{4}$  est la Tierce majeure.

|    |                        |
|----|------------------------|
| 3. | Même intervalle que 1. |
|----|------------------------|

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 4. | Tierce majeure de la 2 Octave aigue. |
|----|--------------------------------------|

Car  $\frac{4}{10}$  est  $\frac{1}{2}$ . Or 1 par rapport à 4 est la 2 Octave aigue, &  $\frac{1}{2}$  est la Tierce majeure.

Car  $\frac{5}{10}$  est  $\frac{1}{2}$ . | Seconde Octave aigue.

6 | Même intervalle que 2.

Car  $\frac{6}{10}$  est  $\frac{3}{5}$ , &  $\frac{3}{5}$  donne le même intervalle que  $\frac{1}{10}$ .

7 | Même intervalle que 1.

8 | Même intervalle que 4.

Car  $\frac{8}{10}$  est  $\frac{4}{5}$ .

9 | Même intervalle que 1.

10 | Octave aigue.

Les autres divisions jusqu'à 20 sont les mêmes que les précédentes, car c'est la même chose de mettre l'obstacle sur 11 que sur 9, sur 12 que sur 8 &c.

Il est visible que le mouvement de l'obstacle léger, toujours promené de l'une de ces parties à l'autre, produiroit une suite irreguliere de tons, tantôt les mêmes, tantôt très-différens, & qu'un Instrument de Musique, en qui il se trouveroit quelque chose de pareil, feroit ce qu'on appelle des *Sauts*, & passeroit d'un ton à l'autre, ou reviendrait au même, sans aucune proportion sensible, sans degrez, & contre toutes les regles connues. Aussi la Trompette Marine qui n'est qu'un Monochorde où le doit tient lieu de l'obstacle léger, a-t-elle de ces bizarreries, qui avoient été jusqu'à present inexplicables, & qui deviennent fort claires par le Systême des Ondulations. La Trompette ordinaire, le Cor de chasse, les grands Instrumens à vent, sont pareillement sujets à ces irregularitez.

Ces sortes de Sons, ainsi qu'on le peut voir  
par

par la Table précédente, font toujours un certain nombre déterminé de vibrations, tandis que celui de la corde entière en fait une, en quoi ils different de la Tierce, par exemple, de la Quinte &c. où le rapport des vibrations est 4 à 5, ou 5 à 6, ou 2 à 3. M. *Sauveur* les appelle *Harmoniques*, & le son de la Corde entière qui est toujours 1, *Son fondamental*.

Les Sons harmoniques sont d'autant plus sensibles à l'Oreille, qu'ils sont formez par une plus grande partie de la Corde. Ainsi le son de la moitié ou l'Octave aigue, qui est le second son harmonique, est plus sensible que le son du tiers, ou 3<sup>me</sup> son harmonique, & ainsi de suite. M. *Sauveur* a jugé par experience qu'une corde de 3 piez ne peut guere faire entendre que jusqu'à son 32<sup>me</sup> son harmonique.

Cette matiere pourroit être poussée beaucoup plus loin, elle est aussi féconde que nouvelle, & même à la faveur de toute cette Théorie, M. *Sauveur* entrevoit déjà des Machines d'Acoustique qui seroient aussi excellentes que celles d'Optique. Que ne devoit-on point aux speculations des Philosophes, si elles venoient à donner d'aussi grands secours au Sens de l'Ouïe, que ceux qu'elles ont donnez à la Vûe?


En attendant, M. *Sauveur* offre encore un avantage à la Musique, ou plutôt aux Musiciens, car il ne tiendra qu'à eux d'en profiter; ce sont de nouveaux noms plus commodes qu'il impose aux Sons, & de nouveaux caracteres plus simples & plus faciles dont il se sert pour les exprimer sur le papier. Tout cela est

accommodé à son Systême général des Merides. Si les Langues avoient été faites par des Philosophes, il seroit sans doute beaucoup plus aisé de les apprendre. Ils auroient établi par tout une uniformité & des rapports, qui auroient conduit l'esprit sûrement, & infailliblement, & la maniere dont un mot auroit été formé, auroit emporté sa signification en vertu de certains principes qui auroient d'abord été posez. Les Peuples grossiers, premiers Auteurs des Langues, sont naturellement tombez dans cette idée, à l'égard de certaines terminaisons, ou desinences, qui ont toutes quelque propriété & quelque vertu commune entre elles, mais cet avantage, ignoré de ceux qui l'avoient entre les mains, n'a pas été poussé assez loin. M. *Sauveur* a fait pour les Sons une espece de langue philosophique, toute composée de monosyllabes, où la signification des mots dépend du nombre, de la nature, & de l'arrangement des lettres, & où par conséquent chaque mot porte son sens avec soi. Les Equivoques de l'ancienne Langue, dans laquelle les Tierces & les Quartes, par exemple, signifient différentes choses, sont entièrement ôtées, chaque Son possible a son nom particulier, & cette multitude infinie de noms ne rend pas la langue plus difficile. On apprend par le nom seul d'un son tout ce qui lui appartient, & jusqu'au nombre d'Eptamerides qui entrent dans sa formation, & même jusqu'aux Decamerides, s'il y en entre aussi.

Les Caracteres dont on se servira pour écrire la Musique ont été choisis & disposez avec le même art. Il reste que les Musiciens puissent se resoudre à une pratique beaucoup plus

ai-

aisée ; ce n'est pas une petite difficulté. Cependant l'établissement général, du SI, qui n'a guere que 30 ans, & qui facilitoit beaucoup l'intonation de la Gamme, peut donner quelque esperance.



## MECHANIQUE.

---

### SUR LA POSITION DE L'AXE DES MOULINS A VENT A L'EGARD DU VENT..

**U**N Moulin à vent, à n'y considerer simplement que les quatre Ailes qui tournent par l'impulsion qu'elles reçoivent du vent, est une Machine plus ingenieuse, & qui dépend de principes beaucoup plus fins qu'on ne pense, & quiconque y fera réflexion pour la premiere fois, verra qu'il n'est pas trop aisé de dire pourquoi le Moulin tourne.

Il faut pour cela supposer la Théorie des Mouvemens composez. Un Corps qui se meut perpendiculairement à une surface, la choque avec toute la force qui est en lui ; s'il se meut parallelement à cette surface, il ne la choque point du tout ; enfin s'il se meut & s'il la rencontre obliquement, ce mouvement qui

tient du perpendiculaire & du parallele & en est composé, ne fait d'effet sur la surface qu'entant qu'il est perpendiculaire, n'en fait que selon la proportion de ce qu'il a de perpendiculaire à ce qu'il a de parallele, & ne pousse la surface que selon la direction perpendiculaire qui entre dans sa composition. Ainsi toute direction oblique d'un mouvement est la diagonale d'un parallelogramme, dont les directions perpendiculaire & parallele sont les deux côtez.

Il y a plus. Quand une surface qui étant choquée obliquement n'a reçu que l'impresion perpendiculaire, est disposée, c'est-à-dire par exemple, est attachée à quelque autre corps, de façon qu'elle ne peut suivre cette direction perpendiculaire, mais quelque autre direction qui en approche plus ou moins, alors cette perpendiculaire elle-même devient la diagonale d'un nouveau parallelogramme dont un des côtez est la direction que la surface choquée peut suivre, & l'autre côté, celle qu'elle ne peut suivre. Ainsi quand un Gouvernail attaché au bout de la Quille d'un Vaisseau à laquelle il est oblique, est choqué par le courant de l'eau parallele à cette Quille, & par conséquent en est choqué obliquement, on verra en tirant sur sa surface la ligne de l'impresion perpendiculaire, qu'elle tendroit à le détacher de la Quille & à l'en éloigner, & que cette direction perpendiculaire au Gouvernail est oblique à la Quille. Il s'en éloigneroit donc par un mouvement oblique, mais comme il ne peut s'en détacher, ni par conséquent s'en éloigner, il ne faut prendre dans ce mouvement oblique que celle des deux directions qui  
le

le composent par laquelle il peut se mouvoir sans s'éloigner de la Quille, & laisser comme inutile celle qui l'en éloigneroit. Or la direction selon laquelle il peut se mouvoir sans s'éloigner de la Quille, est celle qui le fait mouvoir circulairement autour de son extrémité comme centre, donc tout l'effet du choc oblique de l'eau sur le Gouvernail se réduit d'abord à une impression perpendiculaire, qui se réduit encore à faire seulement tourner le Gouvernail, ou, si le Gouvernail est immobile, à faire tourner le Vaisseau.

Dans un mouvement oblique & composé, où il n'y a qu'une des directions qui soit utile, plus l'inutile est grande par rapport à elle, moins ce mouvement a d'effet, & au contraire. En examinant les mouvemens composés du Gouvernail, on voit que plus il est oblique à la Quille, plus la direction qui sert à le faire tourner est grande par rapport à l'autre, mais d'un autre côté plus il est oblique à la Quille, & par conséquent au cours de l'eau qu'on suppose y être parallèle, plus il est choqué foiblement. L'obliquité du Gouvernail a donc en même temps & un avantage, & un désavantage, mais comme ils ne sont pas égaux, & que même chacun des deux variant toujours à chaque position différente du Gouvernail, ils se compliquent différemment, desorte que c'est tantôt l'un, tantôt l'autre qui l'emporte, & qui l'emporte plus ou moins, il a été question de trouver la position du Gouvernail où l'avantage fût plus grand qu'en aucune autre position. M. *Renau* dans sa fameuse Théorie de la Manœuvre des Vaisseaux a trouvé que le Gouvernail pour être dans sa  
meil-

meilleure situation devoit faire avec la Quille un angle à peu près de 55 degrez.

Si un Moulin à vent exposé directement au vent, avoit ses quatre ailes perpendiculaires sur l'axe commun où elles sont attachées, elles recevroient le vent perpendiculairement, & il est vñsible que cette impression ne tendroit qu'à les renverser. Il a donc falu les rendre obliques à leur axe commun afin qu'elles reçussent le vent obliquement. Ne considerons qu'une aile verticale. L'impression oblique du vent sur cette aile se réduit à une direction perpendiculaire. Cette direction qui ne peut être entierement suivie par l'aile, est composée de deux, dont l'une tend à la faire tourner sur l'axe, & l'autre à la renverser de devant en arriere. Il n'y a encore que cette premiere direction qui puisse être suivie, par conséquent toute l'impulsion du vent sur l'aile n'a d'autre effet que de la faire tourner de droite à gauche, ou de gauche à droite selon que son angle aigu regarde un côté ou l'autre. Et l'invention de cette Machine est si heureuse, que par les mêmes raisons les trois autres ailes sont déterminées à tourner du même sens.

L'obliquité des Ailes à l'égard de leur axe a précisément le même avantage & le même desavantage que l'obliquité du Gouvernail à l'égard de la Quille, & M. *Parent* ayant cherché par l'Analyse l'inclinaison la plus avantageuse des Ailes sur l'axe, trouva précisément le même angle de 55 degrez à peu près. Apparemment l'experience de ceux qui ont inventé les Moulins, leur aura fait trouver cet angle après avoir long-temps tâtonné, mais comme l'experience apprend aussi que ces pratiques com-  
mu-



munes & grossieres ne sont nullement infail-  
 libles, & que souvent elles s'écartent assez du  
 but, il est bon de les examiner par Géometrie,  
 & de s'assurer si ce qui se fait est ce qu'il y a  
 de mieux à faire.

M. *Parent* a cherché de même s'il n'y avoit  
 rien à reformer à la pratique ordinaire de met-  
 tre l'Axe du Moulin précisément dans la di-  
 rection du vent. Ce ne sont pas là des recher-  
 ches faciles. Il faut par la Méchanique trou-  
 ver le rapport de toutes les différentes for-  
 ces qui entrent dans le mouvement d'une  
 Machine selon toutes ses diverses dispositions  
 possibles, & après leur avoir donné des expres-  
 sions algebriques ou analytiques, il faut par la  
 même analyse trouver celle de toutes ces ex-  
 pressions qui détermine la plus grande Force.  
 Par ce circuit savant, M. *Parent* n'arriva qu'à  
 justifier la pratique commune. Il faut mettre  
 l'axe des Moulins dans la direction du vent,  
 on les y mettoit, mais on n'étoit pas si sûr  
 qu'il les y faut mettre. Si c'étoit en quelque  
 façon un sujet de jalousie pour les Savans qu'une  
 Machine si parfaite où la Science n'a point  
 eu de part, & où elle ne peut rien ajouter, ils  
 devroient s'en consoler parce qu'ils sont du  
 moins les seuls qui ayent pu s'assurer pleine-  
 ment de toute sa perfection.

---

**L**A description de tout ce qui appartient à  
 l'impression a été continuée par Messieurs  
*des Billettes & Faugeon.*

# M A C H I N E S

## A P P R O U V E ' E S

*Par l'Academie des Sciences en 1701.*

### I.

**U**N Cric circulaire par le Sieur *Thomas*, quoiqu'on ait trouvé qu'il ne différeroit en rien d'essientiel d'une autre Machine de *Stevin*, appelée *Pancratium*.

### II.

Une Machine du Sieur *des Fargues* pour remédier à la Fumée causée par toutes sortes de vents soufflans contre la Cheminée excepté peut-être les vents horisontaux, & paralleles aux côtez de la Cheminée, & ceux qui sont produits par le Soleil, lorsqu'elle en est éclairée, & échauffée par ses rayons.

## MEMOIRES

DE

MATHÉMATIQUE

ET

DE PHYSIQUE,

TIREZ DES REGISTRES

*de l'Académie Royale des Sciences,*

De l'Année M. DCCI.

~~~~~

NOUVEAU PHOSPHORE,

Par M. BERNOULLI, Professeur à  
*Groningue,**Extrait d'une de ses Lettres écrite de Groningue le 6. Novembre 1700.*

A RAISON, Monsieur, pour laquelle j'ai un peu tardé à répondre à votre dernière du 4. Septembre, c'est qu'il m'a fallu faire quelques nouvelles expériences pour satisfaire aux objections que vous me faites de la part de quelques-uns des Messieurs de l'Académie : car ces objections ne m'ont pas empêché de poursuivre ma découverte touchant la lumière du Barometre que je pré-

MEM. 1701.

A

tens



tens encore être générale; Au contraire elles m'ont donné occasion d'en faire une nouvelle bien plus importante & plus curieuse: elle consiste à faire du mercure un Phosphore portatif & perpetuel, que je puis transporter & envoyer commodément & sans danger par tout où je voudrai & en tout temps; car il durera éternellement sans que sa lumiere, à la force de laquelle celle du Barometre n'est pas à comparer, se diminue jamais. Comme cette découverte, quoique fort facile, ainsi que vous le verrez ci-après, a été tirée des principes par lesquels j'ai crû & je crois encore avoir expliqué la lumiere du Barometre, j'ai tout sujet d'être persuadé que je ne me suis pas tant égaré dans mon raisonnement, comme vous pensez peut-être avec ceux de vos Messieurs, qui attribuent la lumiere de mes Barometres à la nature de mon vif argent; car vous ne dites mot sur l'explication que j'en avois donnée: c'est apparemment que vous l'avez prise pour un jeu d'esprit, voyant que mes experiences refaites par quelques-uns de vos Messieurs, n'avoient pas eu le succès souhaité; & qu'au contraire le Barometre de M. le Maréchal de *Villeroi*, que Mylord *Portland* lui avoit donné, faisoit de la lumiere même après l'avoir rempli de son vif argent à la maniere ordinaire. Ce sont-là des objections, je l'avoue, lesquelles semblent détruire toutes mes raisons. J'y devrois donc répondre, si je veux maintenir mon invention; mais que dirois-je, si j'avois été present à ces experiences? J'aurois peut-être remarqué cent circonstances dans lesquelles on n'aura pas assez bien observé ma methode de remplir le tuyau:

Par



Par exemple la maniere de le remplir par le moyen d'une bourse de cuir, que vous dites équivaloir à la mienne, a pourtant cela de différent, que c'est ici le mercure qui doit pousser l'air devant lui, lequel en faisant quelque petite resistance, peut laisser attachées aux côtes du verre quelques restes ou bulles d'air, qui suffiront déjà pour engendrer la pellicule de mercure, que j'ai dit empêcher la lumiere; au lieu que par le succement, c'est l'air extérieur qui pousse le vif argent en haut, lequel ne fait par conséquent que suivre le mouvement de l'air intérieur, qui par sa rarefaction sort du tuyau, pour ainsi dire, volontairement. Ce n'est pas que je veuille desapprouver absolument cette maniere de remplir le Barometre par le moyen d'une bourse de cuir: je m'imagine qu'elle doit être assez bonne pour y exciter de la lumiere. C'est donc une autre faute qui se glisse dans les circonstances: peut-être que le tuyau dont on se servit, n'étoit pas assez sec ni assez net; car la moindre humidité ou graisse empêche l'apparition de la lumiere. Ce tuyau étoit aussi trop menu, n'ayant (dites-vous) qu'une ligne & demie de diametre intérieur: Les plus amples tuyaux sont les meilleurs pour cet effet, comme je l'ai reconnu par experience. La raison en est évidente; car outre que le mercure dans un tuyau large peut balancer bien plus librement que dans un étroit, où le frottement du mercure contre le verre diminue la vitesse de la descente: la pellicule qui couvre le mercure (s'il s'en forme une) doit être aussi plus épaisse dans un tuyau étroit que dans un large; parce que ne pouvant

4 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
s'étendre en large, elle s'épaissit en hauteur.

Pour ce qui est de l'autre experience, je doute qu'on ait pû venir à bout de remplir le tuyau de mercure avec la bouche comme moi, sans qu'on y ait laissé entrer un peu d'haleine ou de salive, étant très-difficile de l'empêcher, vû que d'autres n'y ont pû réussir: Il faut une adresse singuliere; pour moi, il ne m'est pas difficile de le faire, pouvant d'ailleurs par je ne sai quelle habitude, tirer avec la bouche d'un petit recipient  $\frac{1}{8}$  de l'air qu'il contient, en sorte qu'il n'y en reste qu'une huitième partie, & même sans me trop efforcer.

J'ai encore d'autres conjectures qui me rendent suspectes les experiences dont vous me parlez; mais comme je n'y ai pas été present, je n'en puis rien dire de certain: j'espere cependant que si ces Messieurs veulent faire pour la seconde fois l'essai de mes experiences, en observant bien ce que je viens de dire, ils auront un meilleur succès. Mais j'aimerois mieux qu'on le fit de nuit que de jour, quoique dans l'obscurité; car vous savez que si de jour on entre subitement dans un lieu obscur, les yeux étant encore éblouis de la trop grande clarté du jour, on ne s'apperçoit pas si bien d'une foible lumiere telle qu'est celle du Barometre, quoique d'ailleurs la nuit elle soit assez vive.

Le Barometre de M. de *Villeroi*, que vous dites avoir fait de la lumiere, même après avoir été rempli à l'ordinaire, me fait, je vous avoue, un peu de difficulté; mais je voudrois l'avoir vû remplir, je ne doute pas que

que je n'y eusse pû trouver de quoi répondre : peut-être qu'en y jettant le vif-argent, on a tenu le tuyau fort obliquement à l'horifon, pour laisser couler doucement les gouttes de vif-argent, comme dedans un canal ; ce qui aura empêché l'air de le tant infecter qu'il auroit fait, si l'on en eût laissé tomber les gouttes verticalement avec impetuosité. En effet après avoir rempli de cette maniere un tuyau de mon vif-argent, j'y ai apperçû de la lumière plus qu'à l'ordinaire, mais toujours bien moins que par les manieres du succement ou de la machine du vuide. En tout cas, pourquoi ne pourrois-je pas dire que le vif-argent du Barometre de M. de *Villeroi* est si extraordinairement bien purifié qu'il n'y a plus de matiere heterogene dont l'attouchement de l'air puisse former une pellicule ? Et ainsi ma maniere d'expliquer la cause de la lumiere du Barometre en seroit plutôt confirmée que détruite.

Au reste, si mon explication n'étoit pas la veritable, & que ce fût à la nature particuliere de mon vif-argent, & non à la maniere dont j'avois rempli les tuyaux, qu'il fallût attribuer la production de la lumiere, dites-moi, je vous prie, pourquoi mon Barometre ordinaire rempli à la façon commune, quoique fortement secoué, ne fait que peu ou point de lumiere ? Au lieu que les autres tuyaux remplis à ma façon du même vif-argent, font une lumiere exquise au moindre balancement ? J'en fis encore pour la seconde fois plusieurs épreuves dès que j'eus reçu votre Lettre. Et pour m'assûrer entierement que cette lumiere n'étoit pas l'effet d'une propriété

singulier de mon vif-argent, que tout autre n'eût pas, j'en empruntai d'autre avec lequel je refis les mêmes expériences & avec le même succès qu'avec le mien. Or il est moralement impossible que ce second vif-argent soit précisément de la même nature que mon premier; puisque (selon qu'on le prétend) ce doit être une qualité si rare, qu'entre cent sortes de mercures, on n'en trouvera peut-être pas un qui fasse un tel effet.

Pour venir présentement à la découverte de mon nouveau Phosphore, j'ai pensé qu'une des principales raisons, pour lesquelles la pellicule empêche l'apparition de la lumière dans les Barometres, pouvoit être la trop grande uniformité du mouvement du mercure dans un tuyau si uniforme: Car en montant & en descendant ainsi le long d'un tuyau cylindrique, la pellicule ne doit jamais changer d'épaisseur ni se déchirer; mais au contraire demeurer toujours attachée à sa surface supérieure avec laquelle elle monte & descend sans la quitter jamais: de sorte qu'il ne s'y fait point d'ouverture par laquelle la matière du premier élément (comme je l'ai appelée avec *M. Descartes*) puisse sortir des pores du mercure de la manière que j'ai dit dans ma dernière Lettre. Or étant si difficile d'éviter cette pellicule des Barometres remplis, même selon mes manières, j'ai conclu que nonobstant cette pellicule (pourvu qu'elle ne fût pas trop épaisse) la lumière devoit pourtant paroître, si par quelque moyen je pouvois la faire crever, ou la disperser en pièces par le mouvement du mercure: ce qui m'a fait juger que rien ne seroit plus propre pour cet effet qu'un mou-



mouvement très-violent, irrégulier & non uniforme du mercure enfermé dans un verre un peu large & d'une figure inégale, dont on auroit vuïdé l'air le mieux qu'il auroit été possible. Ce raisonnement fut confirmé par une heureuse experience, qui fait le sujet de ma découverte: la voici.

Je pris une phiole nette & claire contenant environ  $\frac{1}{2}$  chopine, & aussi assez forte pour soutenir l'agitation du mercure; j'y mis 5 à 6 onces de mercure bien purgé, après cela je cimentai sur le col de la phiole un robinet fort exact que j'appliquai ensuite à la machine du vuide, pour tirer l'air de la phiole; ce qu'ayant executé le plus soigneusement qu'il me fut possible, je fermai le robinet pour empêcher que l'air ne rentrât dans la phiole, étant séparée de la machine du vuide: voilà tout l'artifice.

Voulant donc essayer si j'avois raisonné juste, je portai le même soir la phiole dans l'obscurité, & la tenant ferme par le col, je commençai à l'agiter fortement (comme on fait en rinsant une bouteille) pour donner aussi une grande agitation au vis-argent. Voilà que tout aussi-tôt la phiole parut pleine d'un feu dont la lumiere n'étoit ni interrompue ni entrecoupée comme celle du Barometre, mais qui duroit tant que le mercure étoit en agitation, & de plus avec tant de vivacité qu'elle me faisoit aisément voir les visages des Spectateurs jusqu'à les reconnoître; j'ai réitéré plusieurs fois cette experience avec plus d'une sorte de mercure, & toujours avec le même succès, excepté lorsque je n'ai pas assez exactement tiré l'air de la phiole, ou que j'y en ai

laissé rentrer un peu ; car alors non seulement la lumière paroïssoit beaucoup plus foible, mais elle s'affoiblissoit de plus en plus, nonobstant l'agitation continuelle de la phiole, même jusqu'à disparoître entierement. Après cela, il n'y avoit plus moyen de la faire reparoître, à moins qu'on ne tirât de nouveau l'air de la phiole.

Ayant donc examiné au jour la cause de cet affoiblissement de lumière, j'ai trouvé toute la surface du mercure couverte d'une pellicule non seulement visible, mais si épaisse qu'elle ressembloit à une pâte pêtée de poussière de terre ; nonobstant qu'avant l'agitation la phiole fût très-nette par dedans, & la surface du mercure polie comme la glace d'un miroir. D'où j'ai jugé que l'air agité, quoiqu'en petite quantité, peut extrêmement infecter le mercure, & que c'est-là la raison pour laquelle à mesure que cette pâte se forme, la lumière s'affoiblit, & pour laquelle elle s'évanouit aussi tout à fait quand cette pâte acquiert une si grande consistance qu'elle ne peut plus être mise en pieces, quelque violentes agitations que l'on donne au vif-argent. C'est aussi par-là qu'on peut connoître si la phiole est bien vidée d'air ou non : car si elle est bien vidée, non seulement la lumière ne s'affoiblit pas, & le mercure ne se couvre pas d'ordures ; mais la lumière devient même plus exquise avec le temps, & la pellicule du mercure (s'il y en a eu au commencement) se dissipe entierement : de sorte que le mercure se polit enfin si bien par le fréquent usage, qu'il n'y reste plus aucune tache ; & quand cela arrive, alors la lumière est dans son plus haut degré de

de vivacité , & paroîtra toujours avec la même force toutes les fois qu'on agitera la phiole dans l'obscurité.

Je ne croi pas qu'on ait trouvé jusqu'à présent un Phosphore perpetuel, c'est-à-dire, qui avec le temps ne se consume pas, ou du moins qui ne perde enfin sa vertu; mais en voilà un présentement qui doit durer autant que l'on voudra sans rien perdre de la sienne, pourvû que la phiole demeure toujours bien bouchée & que l'air n'y entre pas; car le mercure enfermé dans le vuide n'est sujet à aucune alteration, en sorte qu'il n'y a point de raison pourquoi il ne devroit pas faire son effet en tout temps.

Il est vrai que le robinet que j'avois cimenté sur la phiole avec laquelle je fis la premiere experience, commençoit à se corrompre par le vif-argent, parce qu'il étoit d'airain; mais j'ai depuis trouvé le secret de boucher la phiole après en avoir tiré l'air sans avoir besoin de robinet. Entre plusieurs moyens qui me sont venus dans l'esprit, le plus sûr & le plus expeditif, est de boucher premierement la phiole avant que d'en tirer l'air, avec un bouchon de liege, & avec de la cire propre pour cela par dessus, puis de faire un petit trou avec une épingle au travers de la cire & du liege, pour donner de l'ouverture à l'air qu'on va tirer de la phiole. Cela étant fait, on enfermera la phiole dans un recipient dont on tirera ensuite l'air le plus exactement qu'il sera possible pour le tirer en même temps de la phiole par l'ouverture du petit trou: la plus grande difficulté est maintenant de fermer ce petit trou avant que de laisser rentrer l'air dans le recipient:

Pour pratiquer cela aisément, il faut exposer le recipient ainsi vuide au Soleil, & par le moyen d'un verre convexe faire un peu fondre l'extrémité de la cire autour du trou: De cette maniere le trou se remplit de cire fondue, & se bouche parfaitement bien soi-même. Cela fait, on peut bien *ex abundanti*, appliquer encore une fois le recipient à la machine du vuide, pour voir si pendant l'operation il ne s'est point glissé dans le recipient quelque peu d'air par quelque ouverture invisible: Le plus sûr est encore de tenir pendant l'operation tous les endroits du recipient, par lesquels il pourroit se glisser de l'air, enfoncez dans l'eau. Etant donc assuré que tout est bien fait, on laissera rentrer l'air dans le recipient, pour en ôter la phiole, laquelle ainsi préparée, servira ensuite de Phosphore toutes les fois qu'on voudra prendre la peine de l'agiter dans un lieu obscur. Je garde depuis 5 à 6 semaines, deux de ces phioles remplies de deux diverses sortes de vis-argent, lesquelles font admirablement bien leur effet. Les curieux auxquels je les ai montrées, ont avoué qu'ils n'ont rien vu de plus rare; effectivement toute la capacité de la phiole est enflammée, & le mercure ressemble à une liqueur ardente. Si j'avois occasion, je pourrois vous envoyer un de ces nouveaux Phosphores; car on les peut aisément transporter sans aucun danger, le verre en étant bien épais & le col bien bouché. Cependant j'espere que vos Messieurs ne manqueront pas de les faire aussi eux-mêmes, si vous voulez prendre la peine de communiquer cette Lettre à l'Academie.

Mais

Mais il faut bien observer ces trois choses :  
 1. Que la phiole soit très-nette & sèche par dedans ; & si on en doute , il vaut mieux en prendre une toute neuve telle qu'elle vient de la Verrerie. 2. Qu'on ne remue pas beaucoup le mercure avant que l'air soit tiré de la phiole. 3. Qu'on vuide l'air de la phiole le plus soigneusement qu'il sera possible. Ce 3. point doit être observé avec toute la précision imaginable, autrement il ne se feroit point de Phosphore , ou s'il s'en faisoit un , il seroit foible & ne dureroit pas long-temps. Il faut donc que la machine du vuide soit excellente ; la mienne (qui a été faite en *Hollande*) l'est à un point que le piston étant tiré depuis le fond du cylindre jusqu'à l'embouchûre, & demeurant dans cet état pendant 24 heures, il ne se glisse pas la 10000 partie de l'air dans la cavité du Cylindre , comme je l'ai reconnu par experience , marque certaine d'une très-grande justesse. Quoique mon Phosphore soit déjà assez recommandable par la seule curiosité, j'entrevois cependant encore une maniere d'en tirer quelqu'usage dont je vous ferai part une autre fois. Je suis, &c.

~~~~~

## OBSERVATIONS

*Sur l'Eau de pluie qui est tombée à l'Observatoire Royal pendant toute l'année 1700. avec quelques remarques sur le Thermometre & sur le Barometre.*

Par M. DE LA HIRE.

\* **P**ENDANT tout le cours de cette année 1700. il est tombé 20 pouces d'eau à l'Observatoire, qui est la quantité moyenne qui tombe chaque année.

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| En Janvier, il en est tombé | 11 Lignes $\frac{3}{4}$ |
| Février                     | 13 $\frac{1}{4}$        |
| Mars                        | 13 $\frac{1}{4}$        |
| Avril                       | 27 $\frac{3}{4}$        |
| Mai                         | 17 $\frac{1}{2}$        |
| Juin                        | 44 $\frac{1}{4}$        |
| Juillet                     | 35 $\frac{3}{4}$        |
| Août                        | 9                       |
| Septembre                   | 1. $\frac{1}{2}$        |
| Octobre                     | 24                      |
| Novembre                    | 25 $\frac{1}{4}$        |
| Decembre                    | 16 $\frac{3}{4}$        |

On peut remarquer que dans les deux seuls mois de Juin & Juillet il en est tombé 80 lignes qui est justement le tiers de ce qui est tombé pendant toute l'année : mais le mois d'Août n'en a donné que 9 lignes, quoiqu'il soit presque toujours le plus abondant en pluie, comme je l'ai remarqué depuis plusieurs

an-

\* 8. Janvier 1701.

années que je fais ces mêmes observations. Ce qu'il y a encore de particulier à la pluie de cette année, c'est qu'il n'en est tombé qu'une ligne & demie pendant le mois de Septembre, d'où il est arrivé que la sécheresse a été fort grande vers la fin de l'été.

Le Thermometre nous a fait connoître que le plus grand froid des mois de Janvier & de Février, a été le 9 Février où mon Thermometre n'est descendu qu'à 28 parties, l'état de la moyenne chaleur ou froidure étant à 48 parties, comme je l'ai verifié pendant quelque temps dans le fond des caves de l'Observatoire où mon Thermometre est toujours demeuré à cette même hauteur. Ce Thermometre descend quelquefois en hiver à 15 parties & au-dessous. Il est exposé à l'air, mais il est à l'abri du grand vent & du Soleil. Dans tout le reste de ces deux mois, il a presque toujours été à 40 parties. On remarquera que toutes les Observations que j'en ai faites chaque jour, ont été vers le lever du Soleil, où l'air est ordinairement le plus froid. Mais le 19 du mois de Decembre le Thermometre est descendu à 25 parties  $\frac{1}{2}$  un peu plus bas qu'au commencement de Février, qui est le temps où il fait ordinairement le plus froid. On voit donc par ces observations que le froid n'a pas été considerable pendant toute cette année.

Pour la chaleur elle a été la plus grande le 21 Juillet, le Thermometre marquant 61 parties  $\frac{1}{4}$ .

On ne doit pas juger du froid de l'air par l'impression qu'il fait sur nos corps: car un grand vent nous fait toujours paroître l'air

beaucoup plus froid qu'il n'est en effet, à cause qu'il fait passer l'air au travers des vêtements, & qu'il chasse celui qui environne la peau & qui en est échauffé. Voici une expérience qui prouve que la violence du vent n'augmente pas le froid de l'air. J'ai soufflé avec un soufflet pendant quelques minutes contre la boule d'un Thermometre, & je n'ai point remarqué de changement sensible dans l'élevation de l'esprit de vin. Cette expérience auroit été plus juste, si je m'étois servi du Thermometre de *Santorius*, où l'impression du chaud & du froid se fait sur l'air même.

Pour le Barometre, celui dont je me sers est placé à la hauteur de la grande sale de l'Observatoire. Sa plus grande hauteur a été le premier jour de Janvier à 28 pouces 4 lignes & plus de deux tiers, avec un vent foible Est-Nord-est, & il s'est toujours tenu fort haut pendant tout ce mois, quoique le vent ait été souvent vers l'Ouest mais participant toujours un peu du Nord; cependant il n'a pas fait froid dans ce même temps, car l'air a presque toujours été dans l'état temperé, & quelquefois plus chaud. Le Barometre a été au plus bas à 26 pouces 8 lignes  $\frac{1}{2}$  le 26 Novembre avec un grand vent Sud & un peu de neige qui s'est fondue aussi-tôt l'air n'étant pas froid. Ainsi la difference entre la plus grande hauteur & le plus grand abaissement du mercure pendant cette année a été d'un pouce 8 lignes & plus.

J'ai trouvé la Declinaison de l'Aiguille aimantée de 8 degrez 12 Minutes vers le couchant le 20 Novembre de l'année dernière 1700. Cette observation a été faite contre un  
des.



des murs de la terrasse de l'Observatoire vers le midi. J'ai trouvé que ce mur étoit placé exactement selon la ligne meridienne; & l'Aiguille dont je me fers a 8 pouces de longueur, & est très-bien suspendue.

~~~~~

## OBSERVATIONS ANALYTIQUES DE LA COLOQUINTHE.

Par M. BOULDUK.

\* **T**OUT le monde fait que la Coloquinte est le fruit d'une Courge sauvage, qui croît & qu'on nous apporte des *Indes*; que c'est un des plus violens & un des plus dangereux purgatifs que nous ayons, *Medicamentum virofissimum & tantum non mors ipsa*; il est vrai qu'elle purge souvent par érosion, d'où s'en ensuit le sang, ce qui a fait dire à quelques-uns, que la Coloquinte abondoit en un sel volatil, d'où elle avoit la propriété de rendre le sang fluide, & d'en empêcher la coagulation.

Quoique je sois persuadé qu'elle puisse ne pas faire cet effet au dehors comme au dedans, je n'ai pas laissé d'en tenter l'expérience, & d'en avoir fait infuser dans du sang nouvellement tiré, & dans du lait nouvellement trait, sans qu'elle en ait empêché la coagulation; mais on peut penser plus à propos que la Co-

lo-

\* 8. Janvier 1701.

loquinthe, comme nombre d'autres purgatifs violens, abondant en un certain sel âcre, ouvre l'orifice des veines, & produit ce mauvais effet.

Les Anciens nous en ont fait sentir une autre raison en disant que la Coloquinthe étant d'une substance très-rare & très spongieuse, au lieu de recevoir une alteration dans les premières voyes telle qu'il conviendrait pour être distribuée comme les autres remèdes, elle s'y gonfle & devient une véritable éponge, en sorte qu'y séjournant du temps, elle s'attache aux membranes, les ulcère & cause les méchans effets qui nous la rendent suspecte.

Le fréquent usage que j'ai fait de la Coloquinthe, m'a fait connoître qu'elle ne produit pas tous ces méchans effets, lorsqu'on en donne seulement l'infusion, mais son insupportable amertume nous a toujours contraint de la donner en substance, parce que de cette manière il est aisé de la couvrir & de l'envelopper.

En effet l'on doit convenir qu'en substance, elle est dans toute sa force & dans toute sa violence, au lieu qu'en infusion l'on peut croire qu'elle n'a pas déposé tous ces principes, étant certain que quelque dissolvant dont on puisse se servir pour étendre les parties constitutives d'un Mixte, il en reste toujours quelque portion dans le résidu, & quelquefois même une essentielle & du caractère à faire du désordre.

Cependant toute suspecte qu'elle est, l'on ne laisse pas d'être obligé de s'en servir & avec assez de succès, jointe à d'autres purgatifs, dont elle est vraiment le véhicule & l'équil-

lon, quand il s'agit de tirer des parties les plus éloignées, cette pituite visqueuse & gluante, qui résiste à tous les autres purgatifs, toutes-fois avec précaution.

Par l'Analyse ordinaire que j'en ai faite, c'est-à-dire, par la distillation, je n'ai remarqué aucun principe excédant & particulier qui m'ait pû convaincre de ce qu'elle étoit; car ainsi que des autres purgatifs, je n'ai d'abord tiré de sa portion pulpeuse & charnue qu'un flegme, ensuite le même flegme accompagné d'un sel acide, & enfin ce même flegme beaucoup moins acide & au contraire plein d'un sel volatil urineux qui frapoit sensiblement l'odorat. Ces trois liqueurs à l'ordinaire contenoient quelques portions d'une huile fœtide: Le sel fixe tiré de cette partie noire & brûlée qui reste dans la Cornue, n'avoit rien de particulier; il a fermenté avec les acides, ainsi que la plûpart de ces sortes de sels.

Un détail plus étendu de cette Analyse seroit fort inutile, puisqu'elle n'a rien que de commun avec les autres. Je passe en peu de mots à celle de cette graine ou pepins que ce fruit renferme en abondance, & que de tout temps on a rejetée de la Medecine comme inutiles.

Les produits m'en ont paru assez semblables, à la différence pourtant, que la dernière portion de liqueur que j'ai tiré de ces pepins, étoit beaucoup moins chargée de sels volatils, que ne l'avoit été la dernière portion que j'avois tiré de la partie charnue; ce fait a été non seulement sensible à l'odorat, mais aussi aux épreuves que j'en ai faites par les essais ordinaires, car la première a considérablement

ment fermenté avec les acides, ce que celle-ci n'a fait que très-legerement.

Ces sortes d'Analyses nous donnant peu de connoissance de la nature & du caractère des Mixtes, j'en ai tenté quelques autres sur la Coloquinthe, comme la fermentation avec le moût de vin dans la saison, la digestion & maceration avec l'eau, son extraction avec l'esprit de vin, & une autre avec l'eau de pluye.

Par la fermentation avec le moût, j'ai tiré au bain vapoureux un esprit assez pénétrant qui a retenu l'amertume de la Coloquinthe, & ensuite un Extrait de la liqueur restante, après en avoir distillé tout ce qu'il y avoit de spiritueux.

L'amertume qui s'étoit conservée dans cet esprit, me fit croire qu'il pouvoit être purgatif; ma conjecture se trouva veritable; j'en fis une espece de Rossoli, dont ayant fait usage, il purgea veritablement, mais il faut avouer que ce ne fut pas sans beaucoup de tranchées accompagnées de nausées, ce qui pourroit ne pas arriver, si on adoucissoit cet esprit par le mélange de quelque remede, mais il étoit question de le connoître seul.

Je pourrois inferer de cette experience, que l'on pourroit exalter la qualité purgative des mixtes par le moyen de la fermentation; mais celle-ci ne suffit pas encore pour en juger absolument, & je ne manquerai pas de m'en assurer dans les temps convenables.

J'ai employé pour cette fermentation 4 onces de pulpe de Coloquinthe, & six livres de moût de vin; après en avoir tiré tout ce qu'il y avoit de spiritueux, comme je viens de le dire,

dire, j'ai fait de la liqueur restante bien déposée de ses terrestritez & clarifiée, deux onces & demie d'Extrait assez solide, qui à l'air s'humecte aisément: cette grande quantité d'Extrait par rapport au peu que j'avois employé de Coloquinthe, provient de l'union qui s'est faite de partie des sels essentiels du vin avec ceux de la Coloquinthe qui n'avoient pû être exhaltez.

J'ai reconnu par l'usage que j'ai fait de cet Extrait, qu'il n'a rien de la violence non seulement de la Coloquinthe, mais encore de toutes ses préparations & corrections qu'on nous en a laissées jusqu'à présent.

Cet Extrait au poids de dix ou douze grains purge doucement & sans irritation; si la suite répond à ces premières tentatives, nous pourrions croire avoir trouvé le moyen de rendre plus familier ce remède violent, aussi-bien que tous les autres de ce caractère; & alors l'on pourroit penser avec quelques-uns que la qualité purgative des mixtes resideroit dans un certain sel volatil plus ou moins abondant, qui par cette préparation seroit fixé par l'acide des sels essentiels de vin, d'où ils deviendroient plus traitables.

Par la digestion & macération que j'en ai faite dans l'eau de pluie, je n'y ai rien remarqué de considérable; car après avoir employé le temps requis pour cette espèce de fermentation, les principes ne m'en ont point paru plus exhaltez, & par la distillation que j'en ai faite au Bain de vapeur, je n'en ai retiré qu'un flegme sans qualité, & qui n'a produit aucun effet.

Mais l'infusion que j'en ai retirée, après  
l'a-

l'avoir séparée de son marc, étoit plus claire, plus transparente & plus dégagée de ses parties crasses, terrestres, & mucilagineuses, que n'a coûtume d'être l'infusion ordinaire.

Par cette longue digestion & au moyen de la chaleur réglée qu'on y observe, ces parties hétérogenes qui sont très-gluantes, non seulement s'étendent dans la liqueur, mais par la suite s'en separent absolument: L'Extrait que j'ai fait de cette infusion étoit plus pur, plus uni, & d'une consistance mieux liée que celui qu'on fait communément.

J'ai remarqué que ces effets en sont plus louables & moins violens.

Cela nous prouve bien que ces parties crasses & mucilagineuses, que l'on peut croire être une portion de la substance même de la Coloquinte, sont cause de la violence de ce purgatif par les raisons que j'ai déjà dites.

J'ai retiré de cette maniere deux onces & demie d'Extrait de seize onces de pulpe de Coloquinte.

Par l'Extraction que j'en ai fait avec l'eau & avec l'esprit de vin séparément, j'ai eu en vûe de connoître si ce mixte abondoit en parties resineuses, parce qu'on a coûtume d'asseoir la violence des purgatifs dans ces parties.

J'étois déjà prévenu par plusieurs experiences, que non seulement ce mixte en contenoit peu, mais aussi que sa violence n'en dépendoit pas entierement.

L'Extraction que j'en ai fait d'abord avec l'eau par de simples & réitérées infusions, n'a differé de la précédente, que j'avois faite par de longues digestions & macerations, qu'en  
ce

ce que dans celle que j'ai faite par simples infusions, les parties hétérogenes ne se séparent pas si aisément des homogenes que dans l'autre, quelque methode qu'on y puisse observer, aussi l'Extrait en est-il plus impur & plus violent dans ses effets.

Je n'ai point remarqué dans le marc de cette dernière infusion non plus que dans l'autre, qu'il y fût resté aucunes parties resineuses, ce dont je me suis assuré par le secours de l'esprit de vin.

Je finis mes observations sur la Coloquinte par l'Extraction que j'en ai fait avec l'esprit de vin, j'ai remarqué de cette maniere, que huit onces de sa pulpe contenoit demie-once d'Extrait resineux, & que le marc contenoit deux onces d'un Extrait grossier & mal lié, que j'ai ensuite tiré avec l'eau.

L'un & l'autre de ces deux Extraits pris séparément, sont plutôt nuisibles qu'avantageux par l'expérience, d'où je puis conclurre que pour se servir utilement & assurément de la Coloquinte, il faut en rassembler toutes ses parties tant resineuses que salines, mais séparées des terrestres & mucilagineuses, par de longues macérations & digestions qui tiennent de près à la fermentation, qui sont la cause principale des irritations & des tenesmes.

~~~~~

## LA QUADRATURE

*Absolue d'une infinité de portions moyennes  
tant de la Lunule d'Hippocrate de Chio,  
que d'une autre d'une nouvelle espece.*

Par M. LE MARQUIS DE L'HÔPITAL.

\* SI l'on décrit un demi cercle  $AMD$ , qui ait pour diametre la droite  $AD$ , & pour centre le point  $C$ ; & qu'ayant mené perpendiculairement à  $AD$ , la droite  $CB$  égale à  $CA$  ou à  $CD$ , on décrive du centre  $B$  & du rayon  $BD$  le quart de cercle  $AND$ : on formera la Lunule  $AMDNA$  d'Hippocrate de Chio, dont on fait depuis plusieurs siècles que l'espace est double du triangle rectangle  $BCD$ .

M. Wallis, dans une Lettre qu'il écrit à M. Sloan, lui fait part de la Quadrature d'une portion quelconque  $AO M$  de cette Lunule renfermée par les arcs  $AO$ ,  $AM$  & par la droite  $OM$  menée du centre  $B$ . Elle lui avoit été envoyée par M. Perks, qui apparemment ne favoit pas que M. de Tschirnaus avoit publié la même chose dès l'année 1687. dans les *Actes de Leipzig*. On trouve cette Lettre de M. Wallis dans les mêmes *Actes* au mois de Juillet de l'année passée, avec les Remarques de Mrs. Gregory & Casuel: mais pas un de ces Géometres, que je sache, ne s'est apperçû qu'on peut trouver dans cette Lunule une infinité

\* 29. Janvier 1701. FIG. 1.



finité d'espaces moyens  $FGMN$  renfermez par les arcs  $GM$ ,  $FN$ , & par les droites  $FG$ ,  $MN$ , perpendiculaires au diamètre  $AD$ , dont la Quadrature est indépendante de celle du cercle. Voici de quelle maniere je les détermine tous.

Soit une ligne courbe  $ASC$  telle qu'ayant mené d'un de ses points quelconques  $S$  une perpendiculaire  $SP$  à  $AD$ , qui rencontre les arcs de cercles  $AND$ ,  $AMD$ , aux points  $N$ ,  $M$ , & ayant tiré  $BM$  qui coupe l'arc  $AND$  en  $O$ ; l'appliquée  $PS$  soit toujours égale au Sinus droit de l'arc  $NO$ . Soit de plus une ligne droite  $IS$  parallèle à  $AD$ , laquelle coupe la courbe  $ASC$  en deux points  $I$ ,  $S$ , par où soient tirées perpendiculairement à  $AD$  les droites  $IG$ ,  $SM$ . Je dis que la portion de Lunule  $FGMN$  renfermée par les deux arcs  $GM$ ,  $FN$ , & par les parties  $FG$ ,  $NM$  de ces deux droites, est égale à l'espace rectiligne  $FGMNK$ , c'est-à-dire au trapeze rectiligne  $FGMN$ , plus le triangle rectangle  $FNK$ , qui a pour ses deux côtes le Sinus droit  $FK$  & le Sinus verse  $NK$  de l'arc  $FN$ .

Car la ligne droite  $IS$  étant parallèle à  $AD$ , les appliquées  $IE$ ,  $PS$  seront égales entr'elles, & partant les Sinus droits des arcs  $FH$ ,  $NO$ , seront égaux, à cause de la propriété de la ligne courbe  $ASC$ . Ces deux arcs le seront donc aussi; & par conséquent l'arc  $FN$  est égal à l'arc  $HO$ . Or les lignes  $CA$ ,  $CB$  étant égales, il est clair que le demi-cercle  $AMD$  étant continué passera par le point  $B$ , & qu'ainsi l'angle  $GBM$ , qui a pour mesure l'arc  $HO$  ou  $FN$  du cercle qui a pour rayon  $BD$ , aura aussi pour mesure la moitié de l'arc  $GM$

$GM$  du cercle qui a pour rayon la ligne  $CA$  ou  $CB$ . Si donc l'on prend l'arc  $FL$  double de  $FN$ , il s'ensuit que les arcs  $FL$ ,  $GM$  seront en même raison que leurs circonferences; & qu'ainsi les segmens  $FNL$ ,  $GM$ , renfermez par ces arcs & par leurs cordes, seront entr'eux comme les quarrés des rayons; c'est-à-dire, comme le quarré de  $DB$  est au quarré de  $CB$ , ou comme 2 est à 1. Cela posé, si l'on mene le rayon  $BN$  qui coupe  $FL$  perpendiculairement & en deux parties égales au point  $K$ , il est clair que l'espace circulaire  $FNK$  sera la moitié du segment  $FNL$ ; & par conséquent égal au segment  $GM$ . Si donc l'on retranche de la portion de Lunule  $FGMN$  d'une part le segment  $GM$ , & que de l'autre on lui ajoute l'espace circulaire  $FNK$  égal à ce segment, il s'ensuit que cette portion de Lunule  $FGMN$  sera égale à l'espace rectiligne  $FCMNK$ . *Ce qu'il falloit démontrer.*

Il est évident que la Quadrature d'une portion quelconque  $AMN$  de cette Lunule, renfermée par les arcs  $AM$ ,  $AN$ , & par la droite  $MN$  perpendiculaire au diamètre  $AD$ , à commencer toujours au point  $A$  (ce qu'on appelle communément Quadrature indéfinie) dépend de la Quadrature du cercle; quoi qu'entre ces espaces il y en ait deux, savoir la Lunule entiere & sa moitié, qui sont quarrables indépendamment de la Quadrature du cercle. Or l'on peut trouver une infinité de Lunules qui ayent les mêmes proprietéz. Je vais donner la description d'une qui se forme par l'addition de segmens de cercles égaux, au lieu que la précédente a été formée par la difference de segmens de Cercles inégaux.

Soit

\* Soit décrit du diametre  $AD$  & du centre  $C$ , un demi cercle  $ARD$ ; & ayant construit deux quarez  $CE$ ,  $CF$  sur les côtez  $CA$ ,  $CD$ ; soient décrits des centres  $E$ ,  $F$ , & des rayons  $EB$ ,  $FB$ , deux quarts de cercles  $BA$ ,  $BD$ : ce qui formera une Lunule  $BARDB$ , comprise par les deux quarts de cercles  $BA$ ,  $BD$ : & par le demi cercle  $ARD$ , dont voici quelques proprietéz.

1. Si l'on tire du point  $B$  une ligne droite quelconque  $BM$ , qui rencontre le quart de cercle  $BA$  au point  $O$ , & le demi cercle  $ARD$  au point  $M$ ; je dis que l'espace  $AMO$  renfermé par les deux arcs  $AM$ ,  $AO$ , & par la partie  $MO$  de cette droite, est égal au triangle  $AMO$  formé par les cordes  $AM$ ,  $AO$ , & par la droite  $MO$ . Car le point  $B$  étant dans la circonference tant du quart de cercle  $BA$ , que du cercle qui a pour diametre  $AD$ ; il est clair que l'angle  $ABM$  aura pour mesure la moitié de l'arc  $AM$ , comme aussi la moitié de l'arc  $AO$ , & qu'ainsi ces deux arcs seront égaux, puisqu'ils appartiennent à des cercles égaux. Si donc l'on mene les cordes  $AM$ ,  $AO$ , les segmens  $AM$ ,  $AO$  seront égaux; & par conséquent l'espace circulaire  $AMO$  sera égal au triangle  $AMO$ . D'où l'on voit que la moitié  $BAR$  de la Lunule est égale au triangle  $BAR$ ; c'est-à-dire au quarré du rayon  $CA$ ; & qu'ainsi la Lunule entiere vaut deux fois ce quarré, ou le rectangle  $ADFE$ .

2. Un point quelconque  $P$  étant donné sur le rayon  $CA$ , on peut toujours trouver un autre point  $Q$  tel que l'espace  $MHLN$  borné par les droites  $MH$ ,  $LN$  tirées des points  $P$ ,  $Q$ ,

MEM. 1701.

B

per-

\* FIG. 2.

perpendiculairement sur  $AC$ , & par les deux arcs  $MN$ ,  $HL$ , sera quarrable absolument. Car si l'on décrit du centre  $H$  & de l'intervalle  $HG$  égal au rayon  $CA$ , un arc de cercle qui coupe  $CR$  en  $G$ , & que du point  $G$  comme centre, on décrive de ce même intervalle un autre arc de cercle  $HL$  qui coupe le quart de cercle  $BA$  en un autre point  $L$ , par lequel on mene parallèlement à  $BR$  la droite  $LN$  qui coupe en  $Q$  le rayon  $CA$ : l'espace moyen  $MHLN$  de la Lunule, sera précisément égal au trapeze rectiligne  $MHLN$ , borné par les mêmes parallèles  $MH$ ,  $LN$ , & par les cordes  $MN$ ,  $HL$  des deux arcs de cercles. La démonstration est si facile, que je ne m'y arrête pas. J'avertirai seulement que la partie  $AP$  doit être moindre ou plus grande que la moitié du rayon  $CA$ ; car si elle lui étoit égale, l'espace  $MHLN$  deviendrait nul, parce que le cercle qui a pour centre le point  $G$ , toucheroit alors le quart de cercle  $BA$ .

~~~~~

### AUTRE REGLE GENERALE DES FORCES CENTRALES

*Avec une maniere d'en déduire & d'en trouver une infinité d'autres à la fois, dépendamment & indépendamment des Rayons osculateurs qu'on va trouver aussi d'une maniere infiniment générale.*

Par M. VARIGNON.

\* **O**UTRE les Regles des Forces centrales que je donnai l'année passée à l'Acadé-

\* 29. Janvier 1701.

cademie, en voici encore une plus générale, & qui se peut démontrer en plusieurs manières toutes très-simples : Voici comment, & avec un Exemple seulement pour en faire voir l'usage, lequel exemple sera suivi de quelques Remarques qui contiendront le reste.

- I. \* Soit donc une Courbe quelconque  $QLM$ , dont les forces centrales tendent toutes au point fixe  $C$ . Soit  $AL$  le rayon de sa Developpée au point  $L$ , &  $LH$  une touchante en ce même point. Ensuite après avoir pris  $Ll$  indéfiniment petite, soient des centres  $C$  &  $L$  les arcs de cercles  $lR$  &  $lE$ ; soit de plus  $RP$  perpendiculaire sur  $Ll$ .

Quant aux noms, soient aussi  $AL = n$ ,  $LR = dx$ ,  $Rl = dz$ ,  $Ll = ds$ ,  $y =$  force centrale en  $L$  vers  $C$ , &  $dt =$  l'instant que le corps à qui elle fait décrire la Courbe  $QLM$ , met à parcourir l'élément  $Ll$  de cette Courbe.

II. Cela posé, les triangles semblables  $ALL$  &  $LlE$  donneront  $AL (n). Ll (ds) :: Ll (ds). lE = \frac{ds^2}{n}$ . De même les triangles semblables  $LlR$  &  $LRP$  donneront aussi  $Ll (ds). Rl (dz) :: LR. RP :: y$  (force suivant  $LC$ ).  $\frac{y dz}{ds}$  (force suivant  $PR$ ). Or à cause de  $PR$  & de  $El$  toutes deux (*byp.*) perpendiculaires sur  $Ll$ , l'espace  $El \left( \frac{ds^2}{n} \right)$  est ce qu'il y en a de parcouru en vertu de cette force  $\left( \frac{y dz}{ds} \right)$  pendant l'instant  $dt$  par le corps qui décrit l'arc élémentaire  $Ll$ , au lieu de suivre la tangente  $LH$ , comme il auroit fait sans cette force ou

B 2

sans

\* FIG. 3.

sans  $y$ . Donc cette force instantanée lui aiant été continuellement appliquée pendant ce temps  $dt$ , & d'ailleurs étant constant que des espaces ainsi parcourus en vertu de forces uniformes & toujours appliquées (ainsi qu'on le pense d'ordinaire de la pesanteur) sont comme les produits de ces forces par les quarrés des temps de leur application non interrompue; l'on aura  $\frac{ds^2}{n} = \frac{y dz}{ds} \times dt^2$ , ou  $y = \frac{ds^3}{n dz dt^2}$  pour la Regle cherchée.

III. *Autrement.* Soit de plus  $lD$  parallele à  $LC$ : il en resultera encore un triangle  $DlE$  semblable à  $LRP$ , lequel donnera  $Rl (dz)$ .  $LR (dx) :: lE (\frac{ds^2}{n})$ .  $DE = \frac{dx ds^2}{n dz}$ . De plus on aura aussi  $Ll (ds)$ .  $LR (dx) :: LR. LP :: y$  (force suivant  $LC$ ).  $\frac{y dx}{ds}$  (force suivant  $LP$ ). Donc on aura encore comme ci-dessus (art. 2.)  $\frac{dx ds^2}{n dz} = \frac{y dx}{ds} \times dt^2$ , ou  $y = \frac{ds^3}{n dz dt^2}$ : c'est-à-dire encore la même Regle que dans l'article précédent.

IV. *Autrement encore.* Les triangles semblables  $DlE$ ,  $LRP$ , &  $LlR$ , donneront aussi  $Rl (dz)$ .  $Ll (ds) :: RP. LR :: lE (\frac{ds^2}{n})$ .  $lD = \frac{ds^3}{n dz}$ . Donc on aura encore comme ci-dessus (art. 2.)  $\frac{ds^3}{n dz} = y dt^2$ , ou  $y = \frac{ds^3}{n dz dt^2}$ : c'est-à-dire la même Regle encore que dans les deux derniers articles précédens.

V. *Corol.* J'ai fait voir dans le Memoire donné à l'Academie le 13. Novembre dernier, qu'afin qu'un corps se meuve uniformément sur une Courbe quelconque, il faut que les directions des forces centrales requises pour la décrire, soient toutes perpendiculaires à cette Courbe. Et par conséquent alors, outre  $dt = ds$ , l'on aura aussi  $dz = ds$ ; ce qui changera la Regle précédente en  $y = \frac{ds^3}{nds^3} = \frac{1}{n}$ . D'où l'on voit qu'en ce cas les forces centrales feroient toujours en raison réciproque des rayons de la Développée de cette Courbe, ainsi qu'on le voit aussi démontré dans ce même Memoire du 13. Novembre dernier, Probl. 7.

VI. *Exemple.* Pour appliquer la Regle précédente (art. 2. 3. 4.) à quelque exemple, \* soit l'Ellipse ordinaire  $ALB$ , dont le grand axé soit  $AB$ , & au foyer  $C$  de laquelle tendent les forces centrales ( $y$ ) nécessaires, par exemple, à quelque Planete pour la décrire dans l'hypothese de *Kepler* qui fait les temps ( $t$ ) comme les aires  $ACL$ , c'est-à-dire (en supposant  $CL = r$ )  $dt = r dz$ .

En faisant  $dz$  constante, l'*Analyse des infiniment petits*, art. 78. donne ici le rayon ( $n$ ) de la Développée,  $= \frac{r ds^3}{dz ds^2 - r dx ddr}$  (soit du centre  $C$  l'arc  $LH$ , &  $AH = x$ )  $= \frac{r ds^3}{dx ds^2 + r dx ddx}$ .

Or (art. 2. 3. 4.) la force centrale  $y = \frac{ds^3}{ndx ds^2}$ .

Donc aussi  $y = \frac{ds^2 + r d dx}{r dt^2}$  (à cause de  $dt = r dz$ )

.B 3-

$= \frac{ds^2 + rddx}{r^3 dx^2} = \frac{ds^2}{r^3 dx^2} + \frac{ddx}{rr dx^2}$ . Or (si  
 outre  $AB=a$ , on fait encore la distance des  
 foyers  $DC=c$ ,  $bb=aa-cc$ , &  $dz$  constan-  
 te) l'équation  $bdr=dz\sqrt{4ar-4rr-bb}$   
 au foyer  $C$  de l'Ellipse  $ALB$ , donnera  $ddr$   
 ou  $-ddx = \frac{2adr dx - 4rdr dz}{b\sqrt{4ar-4rr-bb}}$  (à cause de  
 $dr = \frac{dz\sqrt{4ar-4rr-bb}}{b}$ )  $= \frac{2adz^2 - 4rdx^2}{bb}$ .

Donc  $y = \frac{ds^2}{r^3 dx^2} - \frac{2a+4r}{bbrr} = \frac{dx^2 + dz^2}{r^3 dx^2}$   
 $- \frac{2a+4r}{bbrr} = \frac{dx^2}{r^3 dx^2} + \frac{1}{r^3} - \frac{2a+4r}{bbrr}$  (à  
 cause de  $dx^2 = dr^2 = \frac{4ardx^2 - 4rrdx^2 - bbdx^2}{bb}$ )  
 $= \frac{4ar - 4rr - bb}{r^3 bb} + \frac{1}{r^3} - \frac{2a+4r}{bbrr} =$   
 $\frac{2ar}{bbrr} = \frac{2a}{bb} \times \frac{1}{rr} = \frac{2a}{bb} \times \frac{1}{CL}$  : c'est-à-dire,

les forces centrales tendantes ici en  $C$ , en rai-  
 son reciproque des quarrés des rayons  $CL$ ;  
 ainsi que nous l'avons déjà trouvé (le 13. Nov.  
 de 1700.) par l'autre Regle, & que Messieurs  
*Newton & Leibnitz*, l'ont aussi trouvé chacun  
 à sa maniere.

VII. Il est à remarquer que si j'eusse appel-  
 lé seulement  $LR$ ,  $dr$ ; sans me mettre en pei-  
 ne du nom de  $AH$ , ce dernier calcul auroit  
 été un peu plus court: mais l'affinité de ce  
 Memoire avec celui du 13. Novembre de 1700.  
 m'a porté à y parler le même langage.

Par exemple, si sans se mettre en peine de  
 $x$  ni de  $dx$ , l'on fait  $CL=r$ ,  $LR=dr$ ,  
 & le reste comme ci-dessus; l'art. 78. de  
 l'*Analyse des infiniment petits*, donnant  $n =$   
 $rs^2$



$\frac{rds^3}{dxds^2 - rdxddr}$  en faisant  $dz$  constante, & Kepler voulant  $dt = r dz$ ; l'on aura dans son hypothese  $y \left( \frac{ds^3}{n dx dt^2} \right) = \frac{ds^2 - rddr}{r^3 dx^2} = \frac{dr^2 + dx^2 - rddr}{r^3 dx^2} = \frac{dr^2}{r^3 dx^2} + \frac{1}{r^3} - \frac{ddr}{r dx^2}$  (à cause que  $dr = \frac{dz \sqrt{4ar - 4rr - bb}}{b}$ ) est l'équation au foyer  $C$  de l'Ellipse  $ALB$ , laquelle en faisant  $dz$  constante, donne aussi  $ddr = \frac{2adr dx - 4rdr dx}{b \sqrt{4ar - 4rr - bb}} = \frac{2adx^2 - 4rdx^2}{bb}$  )  
 $= \frac{4ar - 4rr - bb}{r^3 bb} + \frac{1}{r^3} - \frac{2a + 4r}{rrbb}$   
 $\frac{2ar}{bb r^3} = \frac{2a}{bb} \times \frac{1}{rr} = \frac{2a}{bb} \times \frac{1}{CL^2}$ . Ce qu'il falloit encore trouver.

VIII. Schol. \* Toutes choses demeurant les mêmes, si présentement on suppose  $LD = QL$ , c'est-à-dire l'espace  $LCI = QCL$ , ou  $LCI \left( \frac{r dx}{2} \right)$  constant; l'on aura  $DE = dds$ . Ainsi la ressemblance des Triangles  $DEL$ ,  $LPR$ ,  $LRI$ , donnera  $LR(dx) : RI(dz) :: DE(dds) : EI = \frac{dx dds}{dx}$ . Mais d'un autre côté  $AL(n) : LI(ds) :: LI(ds) : EI = \frac{ds^2}{n}$ . Donc  $\frac{dx dds}{dx} = \frac{ds^2}{n}$ , ou  $n(AL) = \frac{dx ds^2}{dx dds}$ . Ce qui est déjà une nouvelle maniere de trouver les rayons des Développées, dans laquelle  $rdz$  (hyp.) constant donnera  $ddz = -\frac{dr dx}{r} = \frac{dx dx}{r}$ .

B.

De

De plus, puisque cette hypothese de  $rdz$  constant, donne  $n = \frac{dx ds^2}{dz dds}$ , si l'on substitue cette valeur de  $n$  dans la formule générale  $y = \frac{ds^3}{n dx ds^2}$  des forces centrales trouvée ci-dessus art. 2. 3. & 4. l'on aura aussi  $y = \frac{ds^3}{dz ds^2} \times \frac{dx dds}{dx ds^2} = \frac{ds dds}{dx ds^2}$ , qui est la première que j'ai donnée dans les Memoires de 1700. laquelle, comme l'on voit, se trouve aussi fixée à cette hypothese de  $rdz$  constant, au lieu que la Regle précédente  $y = \frac{ds^3}{n dx ds^2}$  ne supposant rien de tel, se trouve diversifiable en autant d'autres, qu'il y a d'expressions possibles des Rayons des Développées: c'est-à-dire, en une infinité d'autres Regles des forces centrales, vû celles que voici de ces sortes de Rayons, que j'appellerai aussi dans la suite, *Rayons osculateurs*.

## R E M A R Q U E I

*Manière infiniment générale de déterminer les Rayons des Développées.*

IX. Entre plusieurs moyens que j'ai pour trouver tout ce qu'on a donné jusqu'ici d'expressions des Rayons osculateurs, en voici un qui outre ces expressions, quelque générales qu'elles soient, peut en fournir encore une infinité d'autres tout aussi générales, même dans une seule, laquelle se diversifiera en toutes celles-là, selon la variété infinie de tout ce qu'on y pourra supposer de constant, & qui

qui pour cela se peut appeller *infiniment générale*.

Mais afin d'y pouvoir plus aisément reconnoître tout ce qu'on en a donné jusqu'ici, je substituerai dans la suite les noms qu'on y emploie d'ordinaire, à la place de ceux dont je viens de me servir: c'est-à-dire,  $y$  &  $dx$  à la place de  $r$  & de  $dz$ , en conservant seulement  $ds$ , & en omettant tout-à-fait ce qui s'appelloit  $x$ ; Et ce d'autant plus à propos que ces noms  $y$ ,  $dx$ ,  $ds$ , entrent (dis-je) d'ordinaire dans l'expression des Courbes en question.

\* Pour cela soit une Courbe quelconque  $DABC$  dont les Ordonnées concourent en  $E$ , d'où partent trois d'entre elles  $EA$ ,  $EB$ ,  $EC$ , indéfiniment proches les unes des autres, de manière que le petit côté  $AB$  prolongé fasse la tangente  $BR$ , laquelle soit rencontrée par l'Ordonnée  $EC$  prolongée en  $S$ . Soit de plus l'angle  $SBP = SEB$ ; l'arc  $CM$  décrit du centre  $B$ , lequel rencontre la droite  $BP$  en  $N$ , laquelle  $BP$  soit aussi rencontrée en  $L$  par  $KL$  parallèle à  $SE$ . Soient enfin  $BV$  &  $CV$  deux rayons de la Développée de la Courbe en question, du centre  $E$  les arcs  $AG$  &  $BH$ , dont le premier rencontre  $BE$  en  $G$ ; le second  $SE$  &  $LK$  en  $H$  & en  $K$ .

Cela fait, soient donc appellées  $AE$  ou  $BE$  ou  $CE$ ,  $y$ ;  $AG$  ou  $BH$ ,  $dx$ ;  $AB$  ou  $BC$ ,  $ds$ ; &  $BV$  ou  $CV$ ,  $z$ .

X. Tout cela (dis-je) supposé, les angles  $ABE$  &  $BPE$  étant externes par rapport aux triangles  $EB S$  &  $BPS$ , l'on aura l'angle  $ABE = BES + BSE$  (*art. 9.*)  $= PBS + BSE = BPE$ . Donc les angles en  $G$  & en

B-5 H

\* FIG. 5.

*H* étant droits, les triangles *ABG* & *BPH* seront semblables entr'eux; Et par conséquent (*art. 9.*) les triangles *ABG* & *BLK* le feront aussi: De sorte que si l'on suppose de plus  $BK = AG$ , ces deux derniers triangles seront non seulement semblables, mais encore égaux en tout. Donc  $AB(ds) = BL = BC(ds) + NL$ : Et par conséquent  $NL = -dds$  négatif, les  $ds$  allant ainsi en diminuant pendant que les  $dx$  (*BH*) vont en croissant; Ce qui donnera au contraire  $HK = ddx$  positif. D'où l'on aura aussi  $BH(dx) \cdot BP(ds) :: KH(ddx) \cdot LP = \frac{ds ddx}{dx}$ . Donc  $NP$

$$(NL + LP) = -dds + \frac{ds ddx}{dx} = \frac{ds ddx - dx dds}{dx}.$$

Mais la ressemblance (*art. 9.*) des triangles *PNC* & *PHB*, donne  $PH$  ou  $CH(dy) \cdot BH(dx) :: PN \left( \frac{ds ddx - dx dds}{dx} \right) \cdot NC = \frac{ds ddx - dx dds}{dy}$ . De même la ressemblance (*art. 9.*) des triangles *BEH* & *MBN*, donnera  $BE(y) \cdot EH(dx) :: BM(ds) \cdot MN = \frac{dx ds}{dy}$ . Donc  $MC(MN + NC) = \frac{dx ds}{dy} + \frac{ds ddx - dx dds}{dy} = \frac{dx dy ds + y ds ddx - y dx dds}{y dy}$ .

Or (*art. 9.*) les deux rayons *BV* & *CV* de la Développée de la Courbe *DABC*, & l'arc *MC* décrit du centre *B*, rendant aussi les triangles *BVC* & *MBC* semblables entr'eux, l'on aura de plus  $MC \left( \frac{dx dy ds + y ds ddx - y dx dds}{y dy} \right) \cdot BC(ds) :: BC(ds) \cdot CV(n) = y dy ds^2$ .

$\frac{ydyds^2}{dx dy ds + ydsddx - ydxdds}$ . Laquelle expression des Rayons osculateurs ne suppose encore rien de constant; ce qui la doit rendre infiniment générale, en ce que susceptible qu'elle est de tout ce qu'on peut imaginer de constant dans les autres, elle les doit comprendre toutes à l'infini, quelque générales qu'elles soient chacune en particulier.

Et si l'on y introduit alternativement les valeurs de  $ddx$  & de  $dds$ , qui résultent en général de  $dsdds = dxddx + dyddy$ , la substitution de la première de ces valeurs changera cette formule en  $CV(n) = \frac{ydxds^2}{dsdx^2 + ydydds - ydsddy}$ ; De même en substituant la valeur générale de  $dds$ , cette première formule se changera aussi en  $CV(n) = \frac{yds^3}{dxds^2 + ydyddx - ydxddy}$ . De sorte que ces trois formules, qu'on voit revenir à la même, seront toutes également & infiniment générales; Aussi ne les doit-on préférer l'une à l'autre dans la pratique, que selon la commodité du calcul.

*Formules infiniment générales des Rayons des Développées.*

$$1^{\circ}. CV(n) = \frac{ydyds^2}{dx dy ds + ydsddx - ydxdds}$$

$$2^{\circ}. CV(n) = \frac{ydxds^2}{dsdx^2 + ydydds - ydsddy}$$

$$3^{\circ}. CV(n) = \frac{yds^3}{dxds^2 + ydyddx - ydxddy}$$

XI. Pour voir présentement quelques-uns des changemens qui peuvent arriver à ces

Formules selon ce qu'on leur supposera de constant,

1°. Soit  $dx$  constante, c'est-à-dire par tout  $BH = AG$  (art. 10.)  $= BK$ : alors ayant  $HK$  ou  $ddx = 0$ , la première des trois formules précédentes se changera en  $CV(n) = \frac{y dy ds^2}{dx dy ds - y dx ds}$ ; Et la troisième, en  $CV(n) = \frac{y ds^3}{dx ds^2 - y dx dy}$ , laquelle est la même que celle qu'on vient d'emprunter (art. 6.) de l'Anal. des infin. petits art. 78.

2°. Si l'on fait  $dy$  constante, c'est-à-dire par tout  $BG$  ou (art. 10.)  $LK = CH$ ; ayant aussi alors  $TL$  ou  $ddy = 0$  en faisant  $CT$  parallèle à  $HK$ , la seconde des formules générales de l'article 10. se changera ici en  $CV(n) = \frac{y dx ds^2}{dx ds^2 + y dy ds}$ ; Et la troisième, en  $CV(n) = \frac{y ds^3}{dx ds^2 + y dy dx}$ .

3°. De même si l'on fait  $ds$  constante, c'est-à-dire par tout  $AB$  ou (art. 10.)  $BL = BC$ ; ayant alors  $LN$  ou  $dds = 0$ , la première des formules générales de l'art. 10. se changera ici en  $CV(n) = \frac{y dy ds}{dx dy + y ddx}$ ; Et la seconde se changera de même en  $CV(n) = \frac{y dx ds}{dx^2 - y dd y}$ .

XII. Supposons présentement que l'espace  $BEC$  ( $\frac{y dx}{2}$ ). soit constant, en sorte que par tout l'on ait cet espace  $BEC = AEB = Ec$ . ou sa différence  $dy dx + y ddx = 0$ ; Et par conséquent  $ddx = -\frac{dy dx}{y}$ . La substitution  
de.

de cette valeur particuliere de  $ddx$  dans la première & dans la troisième des formules générales de l'art. 10. changera la première en

$$CV(n) = \frac{y dy ds^2}{dx dy ds - dx dy ds - y dx ds} = \frac{dy ds^2}{-dx ds}; \text{ Et la troisième, en } CV(n) = \frac{y ds^3}{dx ds^2 - dx dy^2 - y dx dy} = \frac{y ds^3}{dx^3 - y dx dy}.$$

XIII. Telle est la maniere dont les formules générales de l'art. 10. fourniront différentes expressions des Rayons osculateurs, selon ce qu'on y supposera de constant, comme l'on vient de faire  $dx$ ,  $dy$ ,  $ds$ , &  $y dx$ , dans les articles 11 & 12. lesquels font assez voir l'immense fécondité de ces formules, & comment elles doivent fournir de même des expressions des Rayons osculateurs à l'infini, selon ce qu'on y supposera de constant de tout ce que les valeurs arbitraires des exposans  $m$ ,  $n$ ,  $p$ ,  $q$ ,  $r$ , peuvent faire trouver de termes dans  $y^m s^n dx^p dy^q ds^r$ , pris comme l'on voudra: c'est-à-dire, non seulement un à un, mais deux ou plusieurs ensemble liez à discretion par les signes  $+$  ou  $-$ .

XIV. Il est encore à remarquer que suivant les noms donnez ci-dessus art. 1. & 9. la première des deux formules de l'art. 12. est la même que celle de l'art. 8. Quant à ce qu'on a publié jusqu'ici de pareilles formules des Rayons osculateurs, elles se trouvent encore toutes dans le seul art. 11. ci-dessus, excepté les quatre que M. Bernoulli Professeur à Bâle, donna sans Analyse dans les *Actes de Leipsik* au mois de Juin de 1694. Mais voici avec quelle facilité elles suivent encore des formu-

les générales de l'art. 10. ci-dessus, en supposant seulement l'arc  $DEOQ = z$ , décrit du centre  $E$  & du rayon  $DE = a$ : Car alors ayant  $OE(a)$ .  $BE(y)$ :  $OQ(dz)$ .  $BH(dx)$ . c'est-à-dire,  $dx = \frac{y dz}{a}$ , &  $ddx = \frac{y dy dz + y d dz}{a}$ ;

Ces valeurs de  $dx$  & de  $ddx$ , substituez dans les formules générales de l'art. 10. les changeront en d'autres tout aussi générales, d'où celles de M. Bernoulli suivent immédiatement & sans aucun calcul: Les voici.

*Autres Formules infiniment générales des Rayons des Développées.*

$$1^{\circ}. CV(n) = \frac{a dy ds^2}{2 dz dy ds + y ds d dz - y dz d ds}$$

$$2^{\circ}. CV(n) = \frac{a y dz ds^2}{y ds dz^2 + a dy d ds - a ds d dy}$$

$$3^{\circ}. CV(n) = \frac{a ds^3}{dx ds^2 + dz dy^2 + y dy d dz - y dz d dy}$$

XV. Pour tout usage de ces nouvelles formules, je me contenterai d'en tirer seulement celles de M. Bernoulli. Pour cela,

1°. Soit  $dz$  constante, c'est-à-dire  $ddz = 0$ ; ce qui est la même chose (art. 14.) que  $\frac{dx}{y}$  constante, ou  $y d dx - dx dy = 0$ . En ce cas, la première des formules précédentes (art.

14.) donnera  $CV(n) = \frac{a dy ds^2}{2 dz dy ds - y dz d ds}$ ;

Et la troisième,  $CV(n) = \frac{a ds^3}{dx ds^2 + dz dy^2 - y dz d dy}$ .

2°. Si l'on suppose  $dy$  constante, c'est-à-dire  $ddy = 0$ : alors la seconde des précédentes formules générales (art. 14.) donnera  $CV(n) =$   
 $a y d$



$$\frac{aydxds^2}{ydsdx^2 + aadydds}; \text{ Et la troisi me, } CV(n) = \frac{dxds^2 + dx dy^2 + ydyddx}{aydxds^2 + aadydds};$$

3°. Si l'on fait  $ds$  constante, c'est- dire  $dds = 0$ : alors la premi re des pr c dentes formules g n rales (art. 14.) donnera  $CV(n) = \frac{adyds}{2dx dy + yddx}$ ; Et la seconde,  $CV(n) = \frac{aydxds}{ydx^2 - aaddy}$ .

XVI. La seconde, la quatri me, & les deux derni res de ces six formules particuli res, sont les quatre de M. Bernoulli. Je les trouvai encore d'une autre mani re peu de temps apr s qu'il les eut rendues publiques, comme il paro t par l'Analyse que j'en pr sentai   l'Academie le 27. Novembre de la m me ann e 1694. Cette Analyse m'en donna aussi six dont les deux autres  toient  $CV(n) =$

$$\frac{ayydxds^3}{aads^4 - y^3 dx^2 ddy - aady^4} \text{ en supposant } dz \text{ constante, \& } CV(n) = \frac{ayydx dx^3}{aads^4 + y^3 dy dx dx^2 - aady^4}$$

en supposant  $dy$  constante, lesquelles formules r pondent   la premi re &   la troisi me du pr c dent article 15. avec lesquelles il est ais  de les concilier. Les six de cet article 15. se tiroient encore de m me de l'article 11. en y substituant les valeurs de  $dx$  & de  $ddx$ , contenues dans l'article 14. Les formules g n rales de cet article 14. en fourniront encore autant d'autres que  $z^m y^n dx^p dy^q ds^r$ , pourra fournir de termes constans, c'est- dire encore   l'infini; mais en voil , ce me semble, assez pour en  tre convaincu. Passons donc   l'usage de ces formules pour l'in-

ven-

40 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
vention des forces centrales dont il est ici  
question.

## REMARQUE II.

*Usage des Rayons Osculateurs précédens, pour  
rendre aussi infiniment générale la Regle des  
Forces centrales des art. 2. 3. & 4.*

XVII. Ci-dessus (art. 2. 3. & 4.) en appel-  
lant  $dz$  ce que nous appellons ici  $dx$ , & en  
prenant  $y$  pour le nom des forces centrales  
que nous appellerons dorénavant  $f$ , l'on a  
trouvé  $y = \frac{ds^3}{n dx dt^2}$ . Donc en prenant encore  
ici comme là,  $ds$  pour l'élément de la Courbe,  $dt$   
pour l'instant employé à le décrire ou à le  
parcourir,  $n$  pour son Rayon osculateur, &  $dz$   
comme dans l'art. 14. Nous aurons aussi ici  
 $f = \frac{ds^3}{n dx dt^2}$  (art. 14.)  $= \frac{ads^3}{ny dx dt^2}$ , dans la-  
quelle équation il n'y a plus qu'à substituer les  
fix valeurs infiniment générales de  $n$ , trouvées  
ci-dessus articles 10. & 14. pour en faire autant  
d'autres Regles des forces centrales de la mê-  
me étendue que ces valeurs de  $n$ : Les voici.

*Formules ou Regles infiniment générales des  
Forces centrales.*

$$1^{\circ}. f = \frac{dx dy ds^2 + y ds^2 ddx - y dx ds dd}{y dx dy dt^2}$$

$$2^{\circ}. f = \frac{dx^2 ds^2 + y dy ds dd - y ds^2 ddy}{y dx^2 dt^2}$$

$$3^{\circ}. f = \frac{dx ds^2 + y dy ddx - y dx ddy}{y dx dt^2}$$

4.

$$4^{\circ}. f = \frac{2dzdyds^2 + yds^2ddx - ydxsdd s}{ydydxds^2},$$

$$5^{\circ}. f = \frac{ydx_2ds^2 + aadydsdds - aads_2ddy}{yydx^2ds^2}.$$

$$6^{\circ}. f = \frac{dxds^2 + dx dy^2 + ydyddx - ydxddy}{ydxds^2}.$$

XVIII. Ces six formules des forces centrales en général, se diversifieront comme celles des rayons osculateurs des art. 10. & 14. ci-dessus, selon ce qu'on leur supposera de constant. Par exemple,

1<sup>o</sup>. Si l'on suppose  $dx$  constante, c'est-à-dire  $ddx=0$ , la première des précédentes formules générales article 17. donnera  $f = \frac{dyds^2 - ydsdds}{ydyds^2}$ ; Et la troisième,  $f = \frac{ds^2 - yddy}{yds^2}$ .

2<sup>o</sup>. Si l'on fait  $dy$  constante, c'est-à-dire  $ddy=0$ , la seconde de ces mêmes formules générales de l'article 17. donnera  $f = \frac{dx^2ds^2 + ydydsdds}{ydx^2ds^2}$ ; la troisième,  $f = \frac{dxds^2 + ydyddx}{ydxds^2}$ ;

La cinquième,  $f = \frac{ydx^2ds^2 + aadydsdds}{yydx^2ds^2}$ ;

Et la sixième,  $f = \frac{dxds^2 + dx dy^2 + ydyddx}{ydxds^2}$ .

3<sup>o</sup>. Si l'on fait  $ds$  constante, c'est-à-dire  $dds=0$ , la première des mêmes formules générales de l'article 17. donnera  $f = \frac{dxdyds^2 + yds^2ddx}{ydx dy ds^2}$ ; La seconde,  $f = \frac{dx^2ds^2 - yds^2ddy}{ydx^2ds^2}$ ;

La quatrième,  $f = \frac{2dx dy ds^2 + yds^2ddx}{ydydxds^2}$ ;

Et la cinquième,  $f = \frac{ydx^2ds^2 - aads^2ddy}{yydx^2ds^2}$ .

4<sup>o</sup>. Enfin si l'on fait  $dz$  constante, c'est-à-dire  $ddz=a$ ; ce qui est encore la même chose

se (art. 14.) que  $\frac{dx}{y}$  constante, ou  $y ddx - dx dy = 0$ : La quatrième des mêmes formules générales de l'article 17. donnera  $f = \frac{2dyds^2 - ydsdds}{ydydt^2}$ ; Et la sixième,  $f = \frac{ds^2 + dy^2 - yddy}{ydt^2}$ .

De ces douze formules les quatre premières, la septième, & la huitième, sont les mêmes que j'ai déjà données dans la Remarque qui est à la fin du Memoire du 13. Novembre de 1700. Et les six autres sont de surplus. On les auroit encore toutes en substituant les douze valeurs de  $n$  des articles 11. & 15. ci-dessus, dans la seconde équation  $f = \frac{ds^3}{ndxdts^2} = \frac{ads^3}{nydxdt^2}$  de l'art. 17.

XIX. Si l'on fait présentement  $y dx$  constante, c'est-à-dire  $dydx + yddx = 0$ , ou  $ddx = -\frac{dx dy}{y}$ ; la substitution de cette valeur de  $ddx$  dans la première & dans la troisième des formules générales de l'art. 17. changera la première en  $f = \frac{-dsdds}{dydt^2}$ , & la troisième en  $f = \frac{dx^2 - yddy}{ydt^2}$ , qui sont aussi les deux formules que j'ai encore données dans le Memoire du 13. Novembre de l'année passée. La substitution des valeurs de  $n$  de l'art. 12. dans la seconde équation  $f = \frac{ds^3}{ndxdts^2}$  de l'art. 17. les donneroit encore toutes deux.

C'est ainsi que les six formules générales de l'art. 17. en produiront de nouvelles à l'infini, selon la variété infinie des termes constants que

que peut fournir  $z_1 y^m s^n dz^\lambda dx^p dy^q ds^r$ ; ce qui est présentement trop visible pour s'y arrêter davantage. Passons donc à une autre manière de trouver ces mêmes formules générales indépendamment des Rayons des Développées.

## REMARQUE III.

*Autre manière infiniment générale de déterminer les Forces centrales sans le secours des Rayons des Développées, &c.*

XX. Pour déterminer présentement les Forces centrales sans le secours des Rayons des Développées, & cependant d'une manière aussi générale que ci-dessus art. 17. il faut reprendre le commencement de l'art. 10. lequel donne en général  $NP = \frac{ds ddx - dx dds}{dx}$ ;

Et la ressemblance (art. 9.) des triangles  $PHB, PNC$ , donnera  $PH(dy).BP(ds) :: NP(\frac{ds ddx - dx dds}{dx}). PC = \frac{ds_2 ddx - dx ds ds}{dx dy}$ .

De plus les angles  $SBP$  &  $SEB$  (art. 9.) égaux entr'eux, & l'angle  $S$  commun aux deux triangles  $BSP$  &  $ESB$ , rendant ces triangles semblables, l'on aura aussi  $SE(y).$

$SB(ds) :: SB(ds). SP = \frac{ds^2}{y}$ . Donc  $SC$   
 $(SP + PC) = \frac{ds^2}{y} + \frac{ds_2 ddx - dx ds ds}{dx dy} =$   
 $\frac{dx dy ds_2 + y ds^2 ddx - y dx ds ds}{y dx dy}$ .

Mais  $SC$  étant l'espace que la force centrale ( $f$ ) tendante en  $E$ , suivant  $SE$ , fait faire en ce sens au corps qui décrit la Courbe  $DABC$ , dans

dans l'instant  $dt$  qu'il parcourt  $BC$ , au lieu de suivre la tangente  $BR$ : Et cet espace parcouru en vertu de cette force constante à chaque instant, étant d'ailleurs en raison composée de cette force & du quarré de cet instant; L'on aura aussi  $SC = fdt^2$ . Donc enfin

$$fdt^2 = \frac{dx dy ds^2 + y ds^2 ddx - y dx ds dds}{y dx dy},$$

ou bien  $f = \frac{dx dy ds^2 + y ds^2 ddx - y dx ds dds}{y dx dy dt^2}$ ;

Ce qui est la première des six formules ou Regles infiniment générales de l'article 17. Et par conséquent les cinq autres s'en déduiront de la même manière que des six formules infiniment générales des Rayons osculateurs des articles 10. & 14. les cinq dernières ont été déduites de la première. Tout cela est présentement trop aisé pour s'y arrêter davantage.

XXI. J'ajouterais seulement que si ces Rayons osculateurs ont servi (art. 17.) à trouver ces Forces centrales, ces mêmes Forces peuvent aussi servir à trouver ces Rayons d'une manière encore infiniment générale. En effet puisque (art. 20.)  $SC = fdt^2$ , l'on aura

$$\text{aussi } \frac{SC}{dt^2} = f (\text{art. 20.} = \frac{dx dy ds^2 + y ds^2 ddx - y dx ds dds}{y dx dy dt^2}),$$

$$\text{c'est-à-dire } SC = \frac{dx dy ds^2 + y ds^2 ddx - y dx ds dds}{y dx dy}.$$

Or à cause des triangles (art. 9.) semblables  $SHB$  &  $SMC$ , l'on aura  $BS (ds)$ .  $BH (dx) :: SC \left( \frac{dx dy ds^2 + y ds^2 ddx - y dx ds dds}{y dx dy} \right)$ .

$$MC = \frac{dx dy ds + y ds ddx - y dx dds}{y dy}.$$

Donc les Rayons  $BP$ ,  $CV$ , de la Développée,

loppée, & l'arc  $MC$  décrit du centre  $B$ , rendant aussi (art. 9.) les triangles  $MB C$  &  $BVC$  semblables, l'on aura enfin  $MC$

$$\left( \frac{dx dy ds + y ds ddx - y dx dds}{y dy} \right) . BC (ds) ::$$

$$BC (ds) . CV = \frac{y dy ds^2}{dx dy ds + y ds ddx - y dx dds}$$

Ce qui est justement la première des expressions infiniment générales des Rayons osculateurs de l'article 10. Ainsi les deux autres formules de cet article, & les trois de l'art. 14. s'en déduiront encore comme dans ces mêmes articles.

XXII. En un mot les Forces centrales étant toujours  $f = \frac{S C}{ds^2}$ , il est visible que leur expression étant donnée, l'on aura aussitôt celle de  $SC$ , laquelle servira à trouver les Rayons des Développées de la manière ci-dessus art. 21.

Réciproquement le Rayon de la Développée étant toujours  $CV = \frac{ds^2}{MC}$ , il est pareillement visible que son expression étant donnée, l'on aura aussi toujours celle de  $MC$ , laquelle donnera ensuite celle de  $SC$ , en ce que  $BH (dx) . BS (ds) :: MC . SC = \frac{MC \times ds}{dx}$ . Et l'expression de  $SC$  étant ainsi trouvée, celle des Forces centrales se trouvera comme ci-dessus art. 20.

D'où l'on voit en général qu'il y a autant de manières de trouver les Rayons des Développées, qu'il y en a de trouver les Forces centrales; Et réciproquement.

J'ai encore une autre manière infiniment gé-

générale de trouver ces Rayons & ces Forces indépendamment les uns des autres; Mais celle des articles 10. & 20. suffit. Ainsi passons à d'autres Regles encore plus générales des Forces centrales.

XXIII. \* Soit donc encore la Courbe  $DBC$  dont les Ordonnées concourent en  $E$ , mais dont les Forces centrales concourent présentement en tel autre point  $F$  qu'on voudra du plan de cette Courbe. Soient, dis-je, encore  $BC = ds$  les élémens de cette Courbe; Ses Ordonnées  $CE = y$ ;  $DE = a$  une droite constante; Les arcs  $DQ = z$ , &  $BH = dx$  (art. 14.)  $= \frac{y dz}{a}$ , décrits du centre  $E$ ; le nom des Forces centrales tendantes en  $F$ , &  $dt$  celui de l'instant employé à décrire chaque élément  $BC$  de la Courbe en question. Si de plus sur le diametre  $EF$  on fait le cercle  $EMF$ , qui rencontre  $EC$  en  $M$ ; & qu'après avoir fait  $EM = m$ , on fasse aussi la droite  $FM = n$ , &  $CF = r$ ; L'on aura encore les Regles suivantes, lesquelles sont d'autant plus générales que les précédentes n'en sont même qu'un Corollaire: Les voici les dernières, parce qu'elles me sont venues de même en suivant la route des précédentes.

*Regles des Forces Centrales, plus générales encore que celles de l'art. 17.*

$$1^{\circ}. f = \frac{r dx dy ds^2 + r y ds^2 ddx - r y dx ds dds}{y dy ds^2 x y dx - m dx + n dy} \cdot$$

$$2^{\circ}. f = \frac{r dx^2 ds^2 + r y dy ds dds - r y ds^2 ddy}{y dx ds^2 x y dx - m dx + n dy} \cdot$$

3<sup>o</sup>. f

\* FIG. 6.



$$3^{\circ}. f = \frac{rdxdx_1 + rydyddx - rydxddy}{ydt^2xydx - mdx + ndy} \cdot$$

$$4^{\circ}. f = \frac{zrdxdyds^2 + ryds^2ddx - rydxdsds}{dydt^2xyydx - mydx + andy} \cdot$$

$$5^{\circ}. f = \frac{rydx^2ds^2 + aardydsdds - aards^2ddy}{ydxdt^2xyydx - mydx + agdy} \cdot$$

$$6^{\circ}. f = \frac{rdxdx_1 + rdx dy^2 + rydyddx - rydxddy}{dt^2xyydx - mydx + andy} \cdot$$

XXIV. Voila d'une manière encore infiniment générale (c'est-à-dire sans y supposer encore rien de constant, hors la grandeur  $a$ ) pour l'hypothese des Ordonnées concourantes en un même point  $E$ , pendant que les Forces centrales tendent à un autre quelconque  $F$  pris aussi dans le plan de la Courbe. Mais si l'on veut que ces deux points soient le même comme ci-dessus, art. 17. 18. 19. 20. 21. & 22. Alors  $EF$  se trouvant nulle; & par conséquent aussi  $EM(m) = 0 = MF(n)$ , &  $CF(r) = CE(y)$ , ces six formules du précédent article 23. se changeront en celles de l'art. 17. que je ne répète point ici, étant aisé de les déduire de celles-ci.

Je ne dirai rien non plus de tout ce que ces six Regles du précédent article 23. pourroient encore en fournir de particulières, selon que l'on rendroit  $E$  ou  $F$  infiniment éloigné, & selon la variété infinie de tout ce qu'on y peut supposer de constant; tout cela étant présentement trop aisé pour s'y arrêter davantage.

Tout ce que l'on peut faire d'hypotheses des temps, peut aussi diversifier ces Regles en une infinité d'autres manières: Par exemple, si l'on

l'on veut avec *Kepler*, *M. Newton*, & *M. Leibnitz*, que les temps  $dt$  soient comme les produits  $CF \times BL$  correspondans, ou  $dt = CF \times BL$ , dont  $BL$  est un arc décrit du centre  $F$ ; cet arc étant  $= \frac{y dx - m dx + n dy}{r}$

(art. 14.)  $= \frac{yy dx - my dz + a ndy}{ar}$ , &  $CF = r$ , il n'y aura qu'à substituer  $y dx - m dx + n dy$  à la place de  $dt$  dans les trois premières de ces six Regles, &  $\frac{yy dz - my dz + a ndy}{a}$

dans les trois dernières, pour les rendre toutes propres & particulières à l'hypothèse de ces trois Auteurs, sans cependant qu'elles cessent d'être infiniment générales, cette hypothèse n'y introduisant encore rien de constant. Toutes ces Regles se réduiront de même à telle autre hypothèse des temps qu'on voudra faire; ainsi cet exemple suffit.

XXV. Je finis donc en remarquant seulement que si au lieu des temps qui entrent dans les Regles précédentes des Forces centrales, on y veut introduire les vîteses des corps qui décrivent les Courbes en question, il n'y aura (en prenant  $v$  pour ces vîteses) qu'à y substituer par tout  $\frac{ds^2}{vv}$  à la place de  $dt^2$ , à cause de  $\frac{ds}{dt} = v$ , ou de  $\frac{ds}{v} = dt$ . Ce qui pourra être d'un grand usage tant pour le choix des hypothèses & des temps en Astronomie, que pour la Solution des Problèmes où les vîteses seroient données au lieu des temps.

Par exemple dans l'art. 6. ci-dessus, ayant trouvé  $\frac{2a}{bbr} = y = \frac{\frac{ds^2}{r^2 dx^2} - \frac{2a+4r}{bbr}}$ , ou  
4a. - 4r

$$\frac{4a-4r}{bb r} = \frac{ds^2}{rr dz^2} \text{ (hyp.)} = \frac{ds^2}{dt^2} = vv; \text{ l'on}$$

aura  $v = \frac{2}{b} \sqrt{\frac{a-r}{r}}$  pour la vitesse de la Pla-

nete ou du corps qui décriroit l'Ellipse ordinaire dans l'hypothese de  $dt = r dz$ , c'est-à-dire, dans des Temps qui seroient comme les Aires prises à la manière de *Kepler*, de *M. Newton*, & de *M. Leibnitz*.

De même si l'on introduit  $v$  à la place des valeurs de  $\frac{ds}{dt}$ , qu'on a trouvées dans le *Memoire* du 13. Novembre de 1700. où j'ai démontré les Forces centrales ou les Pesanteurs nécessaires aux Planetes pour leur faire décrire les Orbes qu'on leur a supposé jusqu'ici, on trouvera aussi

$$\text{Prob. 1. } v = \frac{2}{b} \sqrt{\frac{a-r}{r}}.$$

$$\text{Prob. 2. } v = \frac{2}{mb} \sqrt{\frac{a-r}{r \times a-r}}.$$

$$\text{Prob. 3. } v = \frac{2ar \sqrt{2aam + 2r^2 - ccr}}{3r^2 + aam - ccr}.$$

$$\text{Prob. 4. } v = \frac{2am \sqrt{2aam + 2r^2 - ccr}}{3aamr + r^2 - ccr}.$$

$$\text{Prob. 5. } v = \frac{4a^3 + 4acc - 2arr}{3aab + bcc - brr}.$$

$$\text{Prob. 6. } v = \frac{2a}{rr + aa - cc}.$$

Dans lesquelles valeurs de  $v$ , il n'y a que  $r$  de grandeurs variables. Ce qui donnera le rapport des vitesses de la Planete dans tous les points de son Orbe, selon l'une & l'autre hypothese des temps proposez dans ces Problèmes; & ce qui comparé aux observations Af-

50 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
tronomiques peut aider aussi à déterminer la-  
quelle de ces deux hypotheses est préférable à  
l'autre. Mais cela nous meneroit trop loin,  
outre que je ne me suis peut-être déjà que  
trop étendu pour un simple Memoire.

~~~~~

## OBSERVATIONS DES TACHES DU SOLEIL,

*Qui ont paru vers les derniers jours du mois  
de Decembre de l'année derniere 1700.*

Par M. DE LA HIRE.

\* **L**E 30. de Decembre dernier j'apperçus  
plusieurs Taches dans le Soleil, qui  
faisoient ensemble une masse fort considerable;  
la plus obscure de ces Taches qui étoit la sui-  
vante, passa au Meridien à  $17^{\circ} \frac{1}{2}$  après le cen-  
tre du Soleil, & par conséquent elle étoit éloi-  
gnée d'un Meridien mené par le centre du So-  
leil de  $4^{\circ} 22''$ . Toutes ces Taches ensemble  
occupoient sur la surface du Soleil  $2' \frac{1}{2}$  envi-  
ron, ce qu'on ne pût pas déterminer bien ex-  
actement à cause qu'il y en avoit une grande  
quantité de petites qui environnoient les plus  
grosses. Les deux jours suivans le ciel fut  
couvert, & on ne pût pas les voir; mais le 2.  
jour de Janvier de cette année 1701. je les ob-  
servai encore & elles étoient environ aux trois  
quarts du Soleil & très-proche du parallele  
qui passoit par son centre.

On

\* 29. Janvier 1701.

On ne peut pas douter que ces Taches n'aient paru tout d'un coup sur le disque du Soleil & plus grandes que dans la suite. Car le 28. de Decembre, deux jours avant que je les eusse apperçues, j'examinai avec soin le disque apparent du Soleil & je n'y remarquai aucune Tache, quoiqu'elles eussent dû paroître vers le quart de son diametre, si elles avoient été visibles; le 29. le ciel fut couvert & je les apperçus le 30. à midi.

Le ciel ayant toujours été couvert jusqu'au temps où elles ont dû passer dans la partie opposée du Soleil, je n'ai pu les suivre: mais depuis, après le temps dans lequel elles ont dû faire une demi revolution derriere le Soleil, j'ai cherché avec soin s'il n'y avoit point quelque reste de ces Taches vers l'endroit où elles devoient reparoître, mais je n'y ai pu rien apercevoir.

Je remarque que l'on pourroit croire que ces Taches seroient les mêmes que celles qui parurent deux mois auparavant, & qu'elles s'étoient cachées au dedans du Soleil suivant le système que j'ai fait de ces Taches: Mais ce qui me paroît plus digne de consideration dans ces Taches, c'est qu'elles paroissent d'abord presque toujours plus grandes que dans la suite & qu'elles ne disparoissent jamais tout d'un coup comme elles commencent à paroître, mais peu à peu, jusqu'à ce qu'elles se dissipent entierement.

Si je compare ces Taches avec celles qui avoient paru deux mois auparavant, & si l'on suppose que ce soit la même matiere qui les ait produites, suivant mon système, je trouve qu'elles devroient avoir fait deux revolu-

tions entieres dans l'espace de 54. jours à peu près, ce qu'on ne peut pas bien déterminer par les raisons que j'ai dites ci-devant, & par conséquent leur revolution autour du Soleil seroit de 27. jours environ, ce qui ne s'écarte pas beaucoup de la revolution que j'avois déterminée par la précédente en la comparant avec celle qui avoit paru 5 ans auparavant. Mais il vaut bien mieux pour ces sortes de déterminations, se servir d'un grand nombre de revolutions que de deux ou trois seulement. On peut voir dans les figures suivantes la forme & la disposition de ces Taches comme je les ai observées avec une grande Lunete.



## OBSERVATIONS

## SUR LE RAFFINAGE DE L'ARGENT.

Par M. HOMBERG.

\* **L**A maniere ordinaire dont on se sert pour raffiner l'Or & l'Argent consiste en une operation qu'on appelle communément la coupelle. Elle se fait ou par le moyen du Plomb ou par le moyen de l'Antimoine, l'une & l'autre sont des operations fort penibles lorsqu'on les veut faire un peu en grand.

J'ai fait plusieurs tentatives pour abreger cette operation, j'en ai rapporté mes observations à la Compagnie, il y a quatre ou cinq ans. J'ai donné dans ce temps differens moyens pour purifier l'Argent selon les diffé-

rens.

\* 26. Février 1701.

rens metaux dont l'Argent peut être allié, parmi lesquels j'ai proposé de le calciner par le soufre commun lorsqu'il est allié de cuivre, ce qui se fait fort aisément, & de le dégager ensuite du soufre par les sels fixes, le cuivre par ce moyen reste dans les scories & l'Argent paroît fin, le tout avec moins de peines & en moins de temps que si on avoit mis l'Argent au plomb pour le séparer du cuivre.

Mais comme les sels fixes qu'on employe pour absorber le soufre commun qui avoit servi à calciner l'Argent, ne laissent pas d'être chers, & qu'il faut beaucoup d'attention pour ne pas perdre de l'Argent, je me suis avisé de me servir d'un autre moyen qui fait mieux & qui coûte moins, que voici.

L'on calcine l'Argent par la moitié de son poids de soufre commun, & lors que le tout est bien fondu ensemble l'on jette dessus à différentes reprises de la limaille de fer autant qu'il en convient, ce qui se juge aisément dans l'opération, ce soufre quitte aussi-tôt l'Argent se joint au fer, & ils se convertissent tous deux en scories qui furnagent l'Argent, & l'Argent se trouve fin au fond du creuset.

Je me suis servi dans le commencement des sels alcalis pour absorber les sels acides du soufre commun, qui avoient réduit l'Argent en masse brune & aiguillée approchante de l'Antimoine. Les effets connus & très-communs de ces deux sels, lorsqu'ils se rencontrent m'ont donné cette idée, dont j'ai été d'abord assez content; mais ayant considéré la grande avidité avec laquelle le soufre commun s'attache au fer & se joint avec lui presque inséparablement, je me suis imaginé qu'il

qu'il le pourroit bien faire aussi dans cette operation.

C'est une observation fort curieuse en Chimie qu'un même dissolvant qui peut dissoudre plusieurs métaux, en dissout toujours les uns plus aisément & les autres plus difficilement, & lors qu'il en a dissout un des difficiles à dissoudre, qu'il le lâche & le laisse tomber en Chaux; lors qu'on met dans cette dissolution un de ces métaux qu'il dissout plus aisément, ce qui se voit aussi-bien dans les Eaux regales que dans les Eaux fortes; j'appelle un metal plus difficile à dissoudre que l'autre, lors qu'il demande un dissolvant plus deslegmé que l'autre pour en être dissout.

Quand on a dissout de l'Or dans l'eau regale, si l'on met de l'étain dans cette dissolution, l'Or se précipitera au fond du vaisseau en une poudre violette à mesure que l'eau regale dissoudra l'étain, il arrive la même chose lors qu'on met un morceau de cuivre dans la dissolution de l'Argent, l'eau forte quitte l'Argent en rongant le cuivre, ce qui fait que l'Argent se précipite en une Chaux argentine au fond du vaisseau à mesure que le cuivre s'y dissout, & si ensuite on met du fer dans cette dernière dissolution, le cuivre s'y précipite en une poudre rouge par l'approche du fer comme l'Argent s'étoit précipité par l'approche du cuivre.

Il arrive à peu près la même chose dans notre raffinage de l'Argent par le soufre commun, & par la limaille de fer. Le soufre commun contient une grande quantité de sels acides semblable à l'eau forte, ces sels étant mis en mouvement par le feu, sont capables  
de



de dissoudre l'Argent, & lors qu'on y ajoûte du fer, le dissolvant, ou le soufre, quitte l'argent en dissolvant le fer, qui est un metal plus aisé à dissoudre que n'est l'Argent.

La cause pourquoi un metal est plus aisé à dissoudre qu'un autre, dépend apparemment de la tissure differente de ces metaux, & selon que les petites parties d'un metal sont plus approchées les unes des autres, les pointes du dissolvant doivent trouver plus de resistance à s'introduire dans les interstices pour écarter ces petites parties les unes des autres, car nos dissolvans n'entrent pas dans la substance même des metaux, pour en desunir les principes qui les composent, ils ne font que se glisser dans les interstices de ces petites parties, en les rangeant & en les écartant les unes des autres sans blesser ces petites parties, comme feroit à peu près un poinçon qui perce une corde de crin sans percer aucuns des crins qui composent la corde.

Nous disons donc que ces pointes des dissolvans trouvent des entrées plus faciles dans un metal dont le tissu n'est pas bien pressé que dans un autre metal dont le tissu est plus pressé, ce qui convient assez avec les differens poids des metaux qui se dissolvent par un même dissolvant, en prenant les metaux les plus legers pour ceux qui ont le tissu plus lâche & *vice versa*. Ainsi l'étain étant plus léger que n'est l'Or, il se dissout plus aisément que ne fait l'Or; & le fer étant plus léger que n'est le cuivre, & le cuivre plus léger que n'est l'Argent, ils se dissolvent selon cet ordre les uns plus aisément que les autres, & se précipitent

de même les uns les autres. Et le même métal, lors que par une industrie on en a referré les pores, *p.e* en l'écruisant, est plus long à dissoudre que lors que par la recuite ces pores se sont remis à leur état naturel.

J'ai dit que dans les dissolutions par l'eau forte, le cuivre précipite l'Argent, & que le fer précipite le cuivre, c'est-à-dire que le métal le plus difficile à dissoudre se précipite le premier, & que le moins difficile se précipite ensuite. Il paroît qu'il n'arrive pas tout-à-fait la même chose dans notre operation par le soufre, puisqu'il ne s'y précipite que l'Argent seul, le cuivre restant mêlé avec le fer dans les scories, ce qui paroît se contredire. La raison de cette difference ne consiste qu'en ce qu'on ne laisse pas assez long-temps le mélange au grand feu pour que le fer puisse absorber aussi-bien le soufre commun qui a dissout le cuivre, comme il avoit absorbé celui qui avoit dissout l'Argent ce qui arriveroit infailliblement, si on continuoît le feu, mais comme les métaux qui sont les plus difficiles à dissoudre, se précipitent les premiers, & que d'ailleurs on ne fait cette operation que pour separer le cuivre d'avec l'Argent, on retire le creuset du feu, dès qu'on juge que l'Argent s'est précipité, sans attendre que le cuivre se soit précipité aussi, ce qui se connoitra assez dans l'operation même. Le temps où je retire le creuset du feu, est lors que le fer commence à être en parfaite fusion. Si on le laisse plus long-temps, une partie du cuivre se précipite aussi, il se remêle avec l'Argent, & il faut recommencer l'operation.

~~~~~

## REMARQUES SUR L'ECLIPSE DE LUNE

*Arrivée le 22. Février 1701.*

Par M. DE LA HIRE.

\* **L**E ciel ayant été entièrement couvert à *Paris* dans le temps de cette Eclipe, on n'en a pû faire aucune observation. Mais elle a été vûe en plusieurs endroits dont voici un Extrait de ce qui m'en a été envoyé par les Astronomes qui l'ont observée.

Le Reverend Pere *Simeon de S. Jean Baptiste* Carme Déchaussé, a observé à *Toulon* le commencement à 10<sup>h</sup>. 33'. 45". Le milieu à 11<sup>h</sup>. 44'. 8", & la fin à 12<sup>h</sup>. 56'. 30". Sa durée 2<sup>h</sup>. 22'. 46". Sa quantité 6 doigts 8'  $\frac{1}{2}$ . Il ne me marque point dans sa Lettre, de quels instrumens il s'est servi pour observer, ni de quelle horloge, ni enfin comment il l'avoit réglée.

Mais M. *Eisenachmid* fort habile Astronome, & qui nous est connu par les correspondances Astronomiques que nous entretenons avec lui, a eu aussi le temps très-favorable à *Strasbourg*, & voici l'observation qu'il en a faite.

Commencement de la Penombre, 10<sup>h</sup>. 34'. 9".  
Commencement de l'Eclipe, 10<sup>h</sup>. 37'. 37".  
E 5. L'om-

\* 12. Mars 1701.

# 18 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

L'ombre au commencement de la mer des humeurs,	10 <sup>h</sup> . 46'. 1".
Le milieu de Tycho par l'om- bre & Grimaldi,	10 53 51
L'ombre à Fracastorius,	11 28 49
Petavius dans l'ombre,	11 40 11
Grimaldus sort de l'ombre,	11 46 53
Langrenus dans l'ombre, ce qu'elle n'a pas passé,	12 0 45
Le milieu de Gassendi,	12 24 16
Tout Tycho sorti de l'ombre,	12 36 37
Fin de l'Eclipse,	12 56 45
Fin de la Penombre,	12 59 19

Ainsi suivant l'observation de M. *Eisenchmid*, la durée de cette Eclipsé n'est que de 2<sup>h</sup>. 19'. 8". & le milieu a été à *Strasbourg* à 11<sup>h</sup>. 47'. 11". Mais si on réduit ce temps à *Paris* en ôtant 22' d'heure qui est la différence de longitude de ces deux Villes, comme nous le faisons par plusieurs observations exactes des *Satellites* de 24, le milieu auroit dû être à *Paris* à 11<sup>h</sup>. 25'. 11", lequel on a mis dans les *Ephemerides* de l'Academie à 11<sup>h</sup>. 18'. 41". Donc différence de l'observation 6'. 30". ce qui ne me paroît pas considerable dans les circonstances de cette Eclipsé dont l'ombre n'a pas été bien terminée, comme le remarque M. *Eisenchmid*, & sur tout dans l'observation du commencement & de la fin qui sont toujours très-difficiles à observer dans les Eclipses partiales, c'est pourquoi il ajoute dans sa Lettre que cette observation ne pourroit pas servir commodément à trouver les différences de longitude.

Pour ce qui est de la durée de cette Eclipsé, on l'avoit donnée de 2<sup>h</sup>. 20'. 8". & celle du  
Pere

Pere *Simeon*, de 2<sup>h</sup>. 22'. 46". & si les observations ne s'accordent pas entr'elles, on ne doit pas s'étonner si le calcul s'en écarte un peu.

M. *Eisenchmid* dit que la quantité a été de 6 doigts assez précisément & non pas plus, mais comme le bord de l'ombre n'étoit pas bien terminé, elle a pû paroître plus grande qu'elle n'étoit, en effet on l'avoit marquée dans les Ephemerides de l'Academie de 5 doigts 44'.

Enfin si l'on compare l'observation de M. *Eisenchmid* avec celle du Pere *Simeon* les ayant reduites toutes deux au même meridiem, on trouve qu'elles sont différentes de plus de 4'  $\frac{1}{2}$  ce qui me fait soupçonner quelque erreur dans l'observation, ou de la difficulté à la déterminer.

On pourroit encore ajouter qu'il y a toujours dans les Eclipses de lune, & sur tout dans les partiales des causes physiques qui peuvent les éloigner du vrai temps où elles pourroient paroître, & comme ces causes sont inconstantes & variables, on ne sauroit pour l'ordinaire donner ces sortes d'Eclipses par le calcul, qu'à quelques minutes près de ce qu'elles paroissent, comme j'en ai averti dans la Préface de mes Tables tant de la premiere Edition que de la seconde.

Cette Eclipe suivant les Ephemerides de *Mezzavacca* reduites à Paris, devoit commencer à 10<sup>h</sup>. 0'. 31'. & finir à 11<sup>h</sup>. 25'. 21". Son milieu auroit donc été à 11<sup>h</sup>. 12'. 56", & la quantité de 7 doigts 6'. ce qui s'écarte beaucoup des observations que je viens de rapporter, comme on le peut voir.

## OBSERVATION

*D'Aldebaram caché par la Lune à Marseille le 26. Février 1701. au soir.*

**A**ldebaram sur le bord Oriental qui est le bord obscur de la Lune, à  $6^h. 43'. 53''$ . occultation entiere d'Aldebaram, à  $6^h. 46'. 18''$ .

Elle s'est faite vers la partie obscure de la Lune au milieu de Mare-Imbrium dans une ligne droite qui passeroit entre Timocharis & Archimede, & qui iroit aboutir à la tache de Cleomede, au côté le plus proche de Mare-Grifium.

Commencement de la sortie  
d'Aldebaram.  $7^h. 55'. 53''$ .

Aldebaram entierement sorti  
à l'extrémité.  $7. 58. 23$ .

La Lunette dont on s'est servi dans cette observation, est de 18 pieds de foyer à deux verres convexes.

## REMARQUES

*Sur une Comete observée à Pèkin le mois de  
Février de l'Année 1699. par le P. de  
Fontenay de la Compagnie de J. E. S. U. S.*

**L**E P. Fontenay apperçut le 17. Février 1699.  
à Pèkin à 9. heures du soir une étoile ne-  
bu-

Buleuse proche le genouil droit de Cephée, appelé *y* dans *Bayer*.

Il observa regulierement tous les jours depuis le 17. jusqu'au 26. Février au soir.

Le 17. cette étoile lui parut de la 2<sup>e</sup> grandeur. Le 23. elle lui parut de la 3<sup>e</sup> grandeur tout au plus, le 25. de la 4<sup>e</sup> & le 26. de la 6<sup>e</sup> grandeur.

Afin de déterminer dans le ciel le lieu de cette Comete, il imagina des lignes droites, qui menées par différentes étoiles, se coupoient dans la Comete ou fort près d'elle au temps de chaque observation. Il nous a marqué ces étoiles par leurs constellations, & par les Lettres qui les distinguent dans *Bayer*. Quoique cette methode ne soit pas des plus exactes, elle suffit néanmoins pour les Cometes, sur tout lorsqu'elle est pratiquée par un homme accoûtumé à observer le ciel.

Avec les élémens que donne le P. de *Fontenay* j'ai tracé la route de cette Comete, sur les Cartes celestes du P. *Pardies* & sur les globes de *Coronelli*, pour en conclurre les Declinaisons & les Ascensions droites de la Comete: les conclusions se sont trouvées les mêmes presque par tout, excepté lorsque les positions des étoiles dans les Cartes ont été différentes des positions sur le globe.

Jours Heures Declinaison Ascension droite.

17	9 $\frac{1}{2}$ soir	77°	35°	30.
18	4 $\frac{1}{2}$ matin	76 40'	71	4.
19	9 soir	74	37	3
20	8	57 30	69	1
21	8 $\frac{1}{2}$	48 30	72	30
22	8 $\frac{1}{2}$	41 50	74	40
C 7				Jours.

## 62 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

Jours	Heures	Declinaison	Ascension droite
23	8 soir	35° 40'	77° 40'
25	8	27 10	80 20
26	7	23 30	81

La difference d'Ascension droite du 17. à 9.  $\frac{1}{2}$  jusqu'au 18. à 9h, est de 41° 30'.

Du 18. à 9h. jusqu'au 20 à 8h. de 37°.

Du 20. au 21. 3 30'

Du 21. au 22. 3 20'

Du 22. au 23. 3

Du 23. au 25. 2° 40'

Du 25. au 26. 40'

Le mouvement de cette Comete étoit d'Occident en Orient, déclinant du Septentrion au Midi; ce mouvement d'Occident en Orient, a été plus lent, lorsque la grandeur apparente de la Comete a diminué.

La trace de cette Comete dans le ciel, est sensiblement une portion d'un grand cercle de la Sphere, qui coupe l'écliptique vers le 21. des Jumeaux.

L'angle de ce cercle avec l'écliptique est d'environ 73° 56'

On peut comparer les observations de *Pekin* avec celles qui ont été faites à l'Observatoire Royal.



~~~~~

## COMPARAISON

*Des Observations de la Comete de 1699. faites à la Chine par le R. P. Fontenay, rapportées à l'Academie par le R. P. Gouye, le 12. Mars 1701. avec celles qui en furent faites à l'Observatoire Royal de Paris.*

Par MRS CASSINI & MARALDI.

**L**E P. *Fontenay* apperçut cette Comete à *Pekin* le 17. Février à 9 heures du soir en forme d'une étoile nebuleuse proche le genouil droit de Cephée. Pour lors elle lui parut de la deuxième grandeur. Le 23. elle lui parut de la troisième grandeur, le 25. de la quatrième & le 26. de la sixième grandeur.

M. *Maraldi* apperçut cette Comete à l'Observatoire Royal dans l'ouverture des nuages le soir du 19. Février après plusieurs jours de mauvais temps en forme d'une étoile nebuleuse de la troisième grandeur.

Nous marquâmes sa situation à l'égard de quatre petites étoiles qui sont proche du cercle Polaire arctique entre la chaire de Cassiopée & la tête de la grande Ourse presque en ligne droite entre elles & avec le Pôle, avec lesquelles on s'apperçut en peu de temps qu'elle changeoit de configuration, allant par son mouvement propre vers le Midi, déclinant vers l'Occident. A 8 heures & un quart, elle étoit

étoit à l'Occident de deux plus Septentrionales avec lesquelles elle faisoit un triangle presque équilateral.

En continuant de la comparer par cette manière aux étoiles prochaines jusqu'au 26. de Février, on trouva qu'elle venoit de passer ce jour-là l'Ecliptique en 22. degrez & demi des Jumeaux.

Le P. Gouye ayant calculé les lieux de la Comete jusques à ce jour-là par les observations du P. Fontenay, trouve que sa route décrite sur le globe coupoit l'Ecliptique vers le 21 degrez des Jumeaux, & en ce même jour il lui assigne la déclinaison de 23 degrez & demi, qui est la déclinaison qui lui convenoit à l'heure de l'observation de la *Chine*, même par nos observations.

Le P. Gouye calcule l'angle que le cercle de la Comete fit avec l'Ecliptique de 73 degrez 56 minutes, & nous trouvâmes par nos observations que la Comete passa à 14. degrez de distance du Pôle de l'Ecliptique, ce qui peut servir à examiner sa parallaxe.

Nous continuâmes à voir la Comete à la vûe simple, jusques au 2 de Mars, & la comparant aux étoiles de la main Orientale & de la tête d'Orion, nous la trouvâmes en 24 degrez 35. minutes des Jumeaux avec 9. degrez 15. minutes de latitude meridionale.

Le 6. Mars on ne la voyoit plus à la vûe simple, mais nous la trouvâmes par la Lunette d'un sextans proche des étoiles, qui sont dans l'épaule orientale d'Orion.

On ne l'a plus vû depuis ce temps-là, tant à cause des nuages, qu'à cause de la clarté de la Lune qui traversa le chemin de la Comete

le

le 10. Mars à l'endroit où elle avoit passé le dernier Février.

En comparant les observations ensemble nous trouvâmes par la méthode que nous avons expliquée dans le Livre de la Comete de 1664. que celle-ci avoit été à son Perigée le matin du 17. Février qui fut le même jour que le P. *Fontenay* la vit le soir à *Pekin*.

Quand il s'est rencontré que cette Comete étoit proche de deux étoiles qui étoient ensemble dans sa route, nous l'avons observée à diverses heures de la nuit, quand sa route passoit presque par notre Zenith, & quand elle en déclinait beaucoup, & pour lors nous n'y avons pas trouvé de variation qu'on pût attribuer à sa parallaxe.

Cette maniere de la chercher est plus certaine que celle de la déterminer par des observations faites à la hâte en des lieux éloignez l'un de l'autre.

Comme les étoiles avec lesquelles nous comparâmes la Comete le 19. de Février, nous parurent dans une configuration un peu différente de celle que nous avons décrite autrefois, nous les comparâmes avec les descriptions qui en avoient été faites par d'autres Astronomes, pour voir si elles s'accordoient ensemble. *Tycho-Brabé* les décrit dans la constellation de la petite Ourse, & il en met quatre en ligne droite entre elles, & avec le Pôle, & fait la plus Septentrionale de ces quatre un peu plus Meridionale que le cercle Polaire arctique. *Bayer* les décrit dans la constellation de Persée, & il fait la quatrième vers le Midi un peu plus Occidentale que les trois autres.

Il a été imité dans cette description de plusieurs autres Auteurs. Le Pere *Riccioli* les rapporte de *Tycho* avec la correction de peu de minutes. M. *Royer* & le Pere *Coronelli* se conforment au P. *Riccioli*, & les mettent dans la Girafe dans la même configuration.

Au temps de nos observations de la Comete, les deux plus Meridionales se voyoient en ligne droite avec la plus Septentrionale, mais la plus proche de la plus Septentrionale paroïsoit beaucoup plus Occidentale que les autres.

Cette difference nous donna lieu de douter si elle ne seroit point arrivée par quelque mouvement particulier de cette étoile vers l'Occident, qui seroit une nouveauté bien considerable, n'y en ayant point jusqu'à present parmi celles qui passent pour fixes, qui aït tant changé de situation à l'égard des autres. On douta aussi, si l'étoile marquée par tant d'Astronomes en ligne droite avec les trois autres, n'auroit point disparu, comme il est arrivé à d'autres étoiles fixes, & si celle qui se voyoit si éloignée de cette ligne droite, ne seroit pas imperceptible quand l'autre qui est dans cette ligne droite est visible. Il paroît que cette étoile a été observée attentivement par *Tycho*, puisqu'il la nomme obscure, & en effet elle est plus obscure que les trois autres. Par la Lunette elle paroïsoit double.

Nous y avons fait attention depuis, & il nous a paru que parmi ces étoiles & les prochaines, il y en a de celles qui se voyent beaucoup plus clairement en certains temps qu'en certains autres, comme il arrive à quelques autres étoiles qui sont en d'autres constella-

tella-

tellations, & qui sont sujètes à une variation si grande, qu'elles se perdent pendant longtemps de vûe, & ensuite paroissent de nouveau.

Ayant décrit ces étoiles de la maniere qu'on les voyoit alors avec la situation de la Comete à leur égard, & l'observant dans la suite autant de fois que le ciel se decouvroit en cet endroit, on s'apperçut évidemment que son mouvement qui la portoit du Septentrion vers le Midi, étoit dirigée vers la petite constellation de la Chevre, & vers sa belle étoile de la premiere grandeur.

Après avoir remarqué à 8 heures & un quart, qu'elle étoit à l'Occident des deux plus Septentrionales qui sont proches du cercle Polaire, & faisoit avec elles un triangle presque équilateral, les nuages ne permirent pas de déterminer plus exactement sa situation.

Mais à 9<sup>h</sup> 45', la Comete s'étoit plus approchée de la seconde, & son bord Meridional touchoit une ligne droite qui va de la seconde à une plus Orientale. Le triangle avec les deux plus Septentrionales étoit rectangle à la seconde, & la Comete étoit un peu plus proche de la seconde que de la premiere. Sa configuration avec ces étoiles corrigées montre sa situation en 13 degrez des Jumeaux, avec une latitude Septentrionale de 41 degrez.

A 11<sup>h</sup> 15', le bord suivant de la Comete quittoit cette ligne droite. A 11<sup>h</sup> 38', elle faisoit un triangle isoscele avec la premiere & la troisieme, d'où elle étoit éloignée de deux tiers de la distance de ces deux étoiles; Elle me paroissoit à la vûe simple un peu moindre que les étoiles de la troisieme grandeur, mais  
par

par la Lunette elle paroïsoit plus grande que Jupiter ne paroît par la même Lunette. Elle avoit une petite chevelûre dont la direction étoit difficile à déterminer.

Le matin suivant à 5<sup>h</sup> 25', la Comete s'étoit approchée de la troisième de ces étoiles que *Tycho* appelle la Seconde en les comptant du Midi au Septentrion, & étant observée par la Machine parallatique, elle parut plus Occidentale de 18' 53" de temps, qui font 4. degrez 43' de difference d'Ascension droite, & plus Septentrionale de 8'. Ayant supposé la longitude & la latitude de cette étoile corrigée par les observations, on a calculé la longitude de la Comete en 14 degrez 12' des Jumeaux avec une latitude Septentrionale de 37. degrez 57. minutes.

On prit la hauteur meridienne de l'étoile la plus Septentrionale des 4 dans la partie inférieure de son cercle de 24 degrez 40'. En ayant ôté 2' de refraction, reste la hauteur corrigée de 24<sup>d</sup> 38', qui étant ajoûtée à la bassesse de l'Equinoxial sous l'horison de 41<sup>d</sup> 10' donne sa déclinaison Septentrionale de 65<sup>d</sup> 48'

Le cercle Polaire est éloigné de l'Equinoxial de 66 31.

Donc cette étoile est éloignée du cercle Polaire vers le Midi de 43'. On tire la même distance de cette étoile au cercle Polaire des Tables Tyconiciennes. Le même jour 20. Février à 8<sup>h</sup> du soir, le ciel s'étant découvert à l'endroit où étoit la Comete, on la vît éloignée de 4<sup>d</sup>, de la plus Meridionale des 4. décrites ci-dessus, & dans une ligne droite avec cette étoile & avec la moyenne de trois autres plus Meridionales, qui se trouve par les obser-

servations en  $15^{\circ} 3'$ . des Jumeaux, avec une latitude Septentrionale de  $30^{\circ} 50'$ . Les Cartes & les Catalogues les marquent dans une situation différente de celle qu'on observe présentement.

En même temps la Comete étoit aussi dans une ligne droite avec Capella, & avec la plus Meridionale de ces trois dont la longitude est  $15^{\text{d}} 50'$ . environ des Jumeaux avec une latitude Septentrionale de  $28^{\text{d}} 40'$ . Suivant la correction de ces étoiles, la Comete étoit en  $17^{\text{d}} 37'$  des Jumeaux avec une latitude Septentrionale de  $32^{\text{d}} 10'$ .

On observa que pendant  $3^{\text{h}}$  la Comete qui s'avançoit vers le Midi, ne quittoit point la ligne droite qui alloit par l'étoile plus Meridionale des trois à Capella. Quoique dans la revolution journaliere d'Orient en Occident, cette ligne changeât d'inclinaison au cercle vertical, & que vers les  $11^{\text{h}}$  du soir elle fut presque parallele à l'horison. Ce que l'on remarqua pour pouvoir juger de la parallaxe de la Comete en comparant cette observation avec les precedentes & les suivantes.

Les deux jours suivans le ciel fut couvert, de sorte qu'il nous fut impossible de voir la Comete.

Nous perdîmes donc l'occasion de la voir au Zenith, où elle devoit passer le 24 au soir, ce qui nous auroit donné la plus grande commodité qu'on pût souhaiter de faire pendant toute la nuit des observations propres pour trouver sa parallaxe, & déterminer sa distance de la terre, en comparant les observations faites au Zenith le soir avec celles qu'on auroit faites proche de l'horison le matin.

Nous

Nous perdîmes aussi la belle observation que nous aurions pû faire de la conjonction de la Comete avec Capella, qu'elle dût presque toucher par sa chevelûre, ce qui auroit aussi servi excellemment au même usage; & enfin nous perdîmes la commodité de voir la Comete dans le parallele qui rase l'horison de *Paris*; qui furent les Phenomenes qui arriverent pendant ces jours de mauvais temps.

Cependant ayant tiré un grand cercle par les lieux de la Comete observez jusqu'alors, nous trouvâmes qu'il passoit à peu de degrez de distance du Pôle Septentrional, ce qui pourra avoir donné occasion aux gens de mer qui observent souvent l'étoile Polaire de voir cette Comete, qui les jours précédens en avoit passé assez proche, lorsque le ciel étoit couvert à *Paris*.

Nous vîmes aussi que ce grand cercle passoit par la constellation de Cephée, comme la Comete du mois de Septembre précédent, & qu'elle y avoit passé par un mouvement opposé.

Nous trouvâmes qu'elle avoit passé à 12 degrez de distance du Pôle de l'Écliptique un peu plus près que la précédente.

Le peu de temps pendant lequel nous avions jusqu'alors pû voir la Comete ne nous permettoit pas encore de trouver le temps & le lieu de son Perigée avec assez de justesse; mais les observations que nous y ajoûtâmes dans la suite employées de la maniere que nous avons déjà expliquée à l'Academie, nous firent connoître que la Comete avoit été à son Perigée le matin du 17 de Février, & que sa plus grande



de vitesse apparente n'avoit pas été moindre que celle de la Comete qui parut au mois de Septembre dernier.

Pour savoir où il falloit chercher la Comete les jours suivans quand le ciel se feroit éclairci, nous remarquâmes que le grand cercle qu'elle montrait décrire par le dos, & par la jambe Occidentale d'Auriga, coupoit l'Ecliptique entre la constellation du Taureau & celle des Jumeaux, qu'il passoit par les parties plus Orientales d'Orion, & de la Colombe; ce que nous écrivîmes à nos Correspondans après l'observation du 20.

Avant que nous eussions corrigé la configuration des quatre étoiles avec lesquelles nous avions comparé la Comete, la direction de la ligne de son mouvement tirée à leur égard, la portoit beaucoup plus proche du Pôle du monde d'où nous trouvons présentement que dans sa plus grande déclinaison, elle en a été éloignée de 13 degrez, presque autant qu'elle a passé loin du Pôle de l'Ecliptique.

Le 23. Février le ciel s'étant éclairci nous trouvâmes la Comete sur la cuisse Orientale d'Auriga. Elle étoit beaucoup diminuée de grandeur apparente. Nous déterminâmes sa situation à l'égard des étoiles voisines & particulièrement de trois marquées par *Bayer*  $\sigma$ ,  $\phi$ ,  $\chi$ , dont elle étoit plus Orientale.

A 7<sup>h</sup> & 30 minutes, nous la trouvâmes à 19<sup>d</sup> 58' des Jumeaux, avec une latitude Septentrionale de 11<sup>d</sup> 50'

Le 24. elle étoit sur la jambe Orientale d'Auriga un peu plus meridionale qu'une petite étoile de la sixième grandeur qui n'est pas marquée dans les Cartes; elle passa par le meridien

ridien 10 secondes après cette étoile à 6<sup>h</sup>. 44<sup>h</sup>.  
 & sa hauteur meridienne fut trouvée de 71<sup>d</sup>  
 16', d'où l'on calcula son Ascension droite de  
 79<sup>d</sup> 52' sa déclinaison 30<sup>d</sup> 8', sa longitude en  
 21<sup>d</sup> 11" des Jumeaux, avec une latitude bo-  
 reale de 6<sup>d</sup> 37'.

On voyoit dans l'ouverture de la Lunette  
 du quart de cercle la Comete avec une étoile,  
 d'où elle s'éloignoit & avec trois autres plus  
 meridionales dont elle s'approchoit; & conti-  
 nuant à marquer la trace de son mouvement à  
 l'égard de ces étoiles jusques à 1 heure & 5  
 minutes après minuit, on remarqua que cette  
 trace étoit droite, quoique par le mouvement  
 journalier à l'Occident elle changeât sensible-  
 ment d'inclinaison à l'égard du vertical & de  
 l'horizontal, ce qu'elle n'auroit pas fait, si  
 elle avoit eu une parallaxe assez sensible.

Le 25. le ciel fut couvert.

Le 26. la Comete avoit passé l'Ecliptique  
 entre la corne Meridionale du Taureau, & le  
 pied Septentrional des Jumeaux.

A 7<sup>h</sup> 50' on détermina la situation de la Co-  
 mete par comparaison aux étoiles prochaines,  
 & on la trouva en 22<sup>d</sup> 45 minutes des Ju-  
 meaux, avec une latitude Meridionale de 45  
 minutes. En comparant cette observation  
 avec la précédente, on trouva que la Come-  
 te, qui par les observations précédentes avoit  
 montré devoir couper l'Ecliptique en 22<sup>d</sup> &  
 demi des Jumeaux, l'avoit coupée plus préci-  
 sement en 22<sup>d</sup> 35' ce qui étoit arrivé le même  
 jour.

Le 27. à 8<sup>h</sup> 35' on ne vît la Comete que  
 pendant quelques minutes que la constellation  
 d'Orion se découvrit. Elle étoit proche de  
 deux

deux étoiles dans la massue d'Orion, entre la plus Occidentale de ces deux, & la pointe de la corne meridionale du Taureau.

Le 28. à 7<sup>h</sup> 10' la Comete vûe avec la Lunette du quart de cercle étoit proche d'une petite étoile qui n'est point marquée dans les Catalogues, entre la tête & la main orientale d'Orion. Nous déterminâmes sa situation en 23 degrez 50' des Jumeaux, avec une latitude Meridionale de 5 degrez 25 minutes.

Le premier Mars à 9<sup>h</sup> 10' la Comete étoit un peu plus meridionale que la ligne droite qui passe par les deux plus claires de la main orientale d'Orion éloignée de la plus proche à l'Occident du double de la distance de ces deux étoiles. Sa longitude étoit en 24 degrez 10 minutes des Jumeaux, avec une latitude Meridionale de 7<sup>d</sup> 30'.

Le 2. Mars à 7<sup>h</sup> 30' elle étoit un peu plus Septentrionale que la ligne droite tirée de la plus Occidentale de deux claires de la main à celle de la tête d'Orion en 24<sup>d</sup> 35' des Jumeaux, avec 9<sup>d</sup> 15' de latitude Meridionale. L'observation que nous en fîmes encore le 6. Mars quand elle étoit dans l'épaule orientale d'Orion ne fût pas assez précise pour en déterminer la longitude & la latitude.

Il n'y eut que 17 jours entre la premiere observation de cette Comete faite à la *Chine* & la derniere qui fut faite à l'Observatoire Royal, & pendant ce temps elle a parcouru environ 80<sup>d</sup> d'un grand cercle.

## DESCRIPTION

*Des quatre Etoiles proche du cercle Polaire,  
avec lesquelles on commença de voir  
cette Comete à Paris.*

**A**FIN qu'à l'avenir l'on puisse verifler, s'il y a d'un temps à l'autre une variation si grande dans la configuration des quatre étoiles, avec lesquelles on trouva la Comete dans nos premieres observations, que celle qu'on y trouvoit en les comparant avec les descriptions de divers Astronomes; *M. Maraldi* a déterminé leurs longitudes & latitudes de la maniere qu'on les trouvoit en ce temps-là, & on les a comparées avec celles qui leur sont assignées par le *P. Riccioli* qui les met dans la seconde classe, comme tirées des seules observations de *Tycho*.

|                                      | Par les Observa-<br>tions de 1699. |        | Par les Tables<br>de <i>Riccioli</i> . |        | Difference. |     |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|-------------|-----|
|                                      | D                                  | M      | D                                      | M      | D           | M   |
| La plus proche du<br>cercle Polaire, | II                                 | 16 48' | II                                     | 19 33' | 2           | 45' |
| Latitude Boreale,                    |                                    | 43 19  |                                        | 42 53  | 0           | 26  |
| La seconde obf-<br>cure,             | II                                 | 15 58  | II                                     | 19 17  | 3           | 19  |
| Latitude,                            |                                    | 40 45  |                                        | 40 10  | 0           | 35  |
| La troisième,                        | II                                 | 17 5   | II                                     | 18 58  | 1           | 53  |
| Latitude,                            |                                    | 37 21  |                                        | 37 17  | 0           | 4   |
| La quatrième,                        | II                                 | 17 19  |                                        | 18 48  | 1           | 28  |
| Latitude,                            |                                    | 35 52  |                                        | 35 47  | 0           | 5   |
| La                                   |                                    |        |                                        |        |             |     |

La seconde de ces étoiles par la Lunette se voit double.

Le P. Gouye en rapportant aux Globes & aux Cartes les observations de cette Comete faites à la Chine à l'égard de diverses étoiles fixes, pour en tirer l'Ascension droite, & la déclinaison, a remarqué qu'il y a quelquefois des différences d'un Auteur à l'autre dans la description des mêmes étoiles. C'est pourquoi il ne faudra pas faire un grand fondement sur la différence qui se trouvera entre la description de la route de cette Comete faite sur les observations de *Pekin*, & celle qui est tirée des observations de *Paris*, pour en conclurre la parallaxe, qui après la réduction d'un méridien à l'autre, quelquefois seroit fort sensible.

Le mouvement apparent de cette Comete proche de son Perigée, ayant été presque aussi vite que le mouvement de la Lune, elle pourroit bien avoir eu une parallaxe presque aussi grande.



## OBSERVATION

*De la Conjonction de la Lune avec l'œil du  
Taureau Aldebaram le 19. Août 1699,*

Par M. CASSINI.

**P**OUR tirer tous les avantages que l'on pouvoit de cette conjonction, on a observé le 18 Août le passage de la Lune & de cette

cette étoile par le meridien, qui n'est sujet à aucune variation causée par la parallaxe & par la refraction qui ne détournent point les Astres du meridien. On a aussi observé le passage des mêmes Astres par le meridien le jour suivant pour le comparer au passage du jour précédent, & trouver le retardement de la Lune à l'égard de l'étoile fixe dans l'intervalle de temps entre les passages de ces deux jours sans aucune alteration.

On a fait aussi le matin du 19. les observations nécessaires pour déterminer le passage de la Lune & de l'étoile fixe par le cercle de six heures, où arrive la plus grande difference du passage causée par la parallaxe de la Lune, & où ces deux Astres avoient presque la même refraction pour être alors à peu de distance l'un de l'autre: & l'on a vu que la Lune au passage par ce cercle a retardé 2 minutes & demi plus qu'elle ne devoit faire par un retardement proportionel à celui qui a paru entre les deux passages par le meridien, ce qui sert à trouver la parallaxe de la Lune en Ascension droite.

On a été attentif à observer la conjonction de la Lune avec Aldebaran par une Lunette de 9 pieds, par laquelle on voyoit toute la Lune & les étoiles prochaines, & qui servoit à mesurer la difference de leurs passages,

## OBSERVATION

*Des passages de la Lune & de l'œil austral  
du Taureau par le meridien le 18. &  
le 19. Août 1699.*

*Le 18. Août,*

**A** 5 heures 37' 38" du matin à l'Observatoire Royal, le centre de la Lune passa au meridien,  
à 5 heures 38' 46" le bord de la Lune quitta le meridien.

Le demidiametre de la Lune passa en 1 8"

|   |                                 |                        |
|---|---------------------------------|------------------------|
| { | Hauteur meridionale de la corne |                        |
|   | superieure de la Lune,          | 55 <sup>d</sup> 7' 10" |
|   | De la corne inferieure          | 54 36 10               |
| { | Hauteur du centre de la Lune,   | 54 51 40               |

Le même jour à 6h 28 0 Aldebaram passa par le meridien.

Hauteur merid<sup>e</sup>. d'Aldebaram 57<sup>d</sup> 25'

Aldebaram passa donc après le centre de la Lune en 0 50 22

Aldebaram retourna au meridien

en 23 56 20

Aldebaram fut au cercle de 6 heures à 0 25' 15" après le minuit suivant.

*Le 19. Août,*

Le 19 au matin à 0 48' 25" le centre de la Lune passa par le cercle horaire, où l'on attendoit Aldebaram.

D 3

Al-

78 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

Aldebaram passa par le même  
cercle horaire à  $0^h 50' 52''$

Le centre de la Lune précéda  
Aldebaram de  $2' 27''$


Le bord suivant de la Lune  
précéda Aldebaram de  $1' 19''$

A  $1^h$  10 le bord suivant de la Lune  
précéda Aldebaram de  $51''$

A  $1^h$  11 50 le même bord précé-  
da Aldebaram de  $27''$

A  $1^h$  23 20 le même bord précé-  
da Aldebaram de  $2''$

Aldebaram étoit alors plus Septentrional que  
le bord.



A  $1^h 24 20$  le bord suivant de la Lune étoit  
avec Aldebaram dans le même cercle horai-  
re en A.  $1^h 40'$



1h 40 31 Aldebaram étoit éloigné de son diamètre du bord Oriental de la Lune.

1 40 53 Il touchoit la Lune.

1 41 31 Il est entré entièrement.

En entrant dans la Lune il a paru un peu long, quoiqu'il parut rond auparavant.

2 19 21 Aldebaram sort du bord obscur de la Lune, & il parut au même instant gros comme à son ordinaire en C.

En comparant l'entrée totale avec la sortie, on trouve la conjonction de la Lune avec cette étoile à 2h 0' 26"

Dans la figure ci jointe, on donne la situation de la Lune à l'égard des Hyades dont la situation est déterminée par les Observations de leur ascension droite & déclinaison faites par M. *Maraldi*.

Parmi ces étoiles, celle qui dans *Bayer* est marquée  $\sigma$ , est composée de deux étoiles égales, éloignées entre elles de 6 minutes, & celle qui est marquée *H* par *Bayer* de la sixième grandeur, est un assemblage de six étoiles vûe par la Lunette à peu près égales entre elles.

On fit quantité d'autres observations pour déterminer la parallaxe de la Lune.

On observa le même jour 19 le passage d'Aldebaram par le méridien à 6 24 20

Le centre de la Lune arriva au méridien à 6 33 4

Et le bord suivant à 6 34 13

Donc Aldebaram précéda le centre de la Lune de, 8 44  
Ayant

Ayant comparé les différences des temps entre le passage de la Lune, & d'Aldebaram par le meridien le 18 & 19 d'Août, avec la différence des temps entre leur passage par les cercles horaires proche du cercle de 6 heures du matin par la methode expliquée au long dans le Livre de la Comete de 1680. nous avons trouvé la parallaxe horizontale de la Lune le matin du 19 Août de 56 minutes & demi.

~~~~~

## OBSERVATIONS

*D'Aldebaram joint à la Lune, faites à  
Marseille & à Bologne, rapportées  
à notre figure.*

## A MARSEILLE.

Par LE P. FEUILLE'E Minime.

1699. **L**A nuit du 8. Novembre, la Lune touche Aldebaram à son bord Oriental vers Galilée,  
à  $9^h\ 11' - 9''$ .

Aldebaram paroît sur le bord Occidental de la Lune vers Firmicus; entre la Caspie & Taruntius,  
à  $10^h\ 15' - 41''$ .

1700. Le 2. Janvier la Lune cache Aldebaram dans la partie Orientale obscure vers Galilée, sur une ligne qui passoit sur le bord Septentrional de cette tache,  
à  $6^h\ 31' - 33''$ .

Al.

Aldebaram paroît sur le bord Occidental de la Lune, sur une ligne qui ra-  
 soit le bord Meridional de Firmicus, &  
 passoit par une tache qui est au-dessus  
 du même bord, & fort près de celui de  
 la Lune,  
 à 7<sup>h</sup> 42' 32".

## A B O L O G N E.

Par M. M A N F R E D Y.

Le 2. Janvier 1700. la Lune cache Al-  
 debaram en ligne droite avec Copernic  
 & Denis,  
 à 7<sup>h</sup> 3' 42".

La Lune quitte Aldebaram en ligne  
 droite avec Taruntius & Copernic,

Et en une autre, par Firmicus & la  
 partie de Mare Crisium la plus occiden-  
 tale.

à 8<sup>h</sup> 16' 32".

~~~~~

## O B S E R V A T I O N

*De l'Eclipse de Lune du 22. Février 1701.*

## A C O L L I O U R E.

Par M<sup>rs</sup>. CASSINI, MARALDI, CHA-  
 ZELLES, ET COUPLET.

**L** A Lune vûc un moment entre les nuages,  
 parut encore entière à 10<sup>h</sup> 16'

La Lune s'étant un peu découverte parut obscurcie dans son bord, mais on ne distinguoit ni le bord de l'ombre ni les Taches de la Lune, 10<sup>h</sup> 21'

Elle parut entre les nuages éclipsée presque de la quatrième partie de sa circonférence, 10 35' 26"

Les deux Taches de Snellius & Furnerius, parurent au bord de l'ombre, 11 6 58

L'ombre passoit proche la Tache la plus occidentale des trois qui forment le Sinus Medius, laquelle étoit au milieu du disque de la Lune,

Elle étoit éloignée de la Tache de la largeur de cette Tache, 11 12 39

L'ombre à Petavius, 11 20 10

Le milieu de Petavius dans l'ombre, 11 22 20

L'ombre au bord clair de la Tache occidentale de Sinus Medius, qu'elle a frisé long-temps, 11 23 40

Petavius est encore tout dans l'ombre, 11 25 40

Grimaldus sort de l'ombre, 11 26 20

Le milieu de Grimaldus sort, 11 26 58

Grimaldus est entièrement sorti de l'ombre, 11 29 35

L'ombre s'éloigne sensiblement de la Tache occidentale de Sinus Medius, 11 31 41

L'ombre au bord de Langrenus, 11 38 22

Hauteur du bord supérieur de la Lune, 57<sup>d</sup> 54' 40". 11 58 58

Hauteur du bord inférieur, 57<sup>d</sup> 19' 40". 11 59 40

La

|                                             |                 |    |     |
|---------------------------------------------|-----------------|----|-----|
| La Lune suivoit le fil horizontal,          |                 |    |     |
| Langrenus est tout hors de                  |                 |    |     |
| l'ombre,                                    | 12 <sup>h</sup> | 5  | 45" |
| On voit Tycho dans l'ombre                  |                 |    |     |
| sur le bord,                                | 12              | 15 | 17  |
| Le milieu de Tycho sort,                    | 12              | 16 | 31  |
| La blancheur de Tycho sort,                 | 12              | 17 | 46  |
| La bordure brune de Tycho est               |                 |    |     |
| sortie,                                     | 12              | 18 | 46  |
| Petavius est sorti d'un mouve-              |                 |    |     |
| ment fort lent,                             | 12              | 20 | 26  |
| Deux doigts par estimation res-             |                 |    |     |
| tent éclipsés,                              | 12              | 23 | 47  |
| Furnerius & Snellius sont sor-              |                 |    |     |
| tis entierement de l'ombre,                 | 12              | 29 | 20  |
| Un doigt par estimation reste               |                 |    |     |
| éclipsé,                                    | 12              | 29 | 58  |
| Fin de l'Eclipse.                           | 12              | 36 | 57  |
| La plus grande obscurité de l'Eclipse mesu- |                 |    |     |
| rée par le Micrometre parut de 5 doigts 55  |                 |    |     |
| minutes.                                    |                 |    |     |

Les observations suivantes faites en *Espagne* nous ont été communiquées par les Observateurs.

### M A D R I D.

Cette Eclipsé fut observée à *Madrid* dans le College Impérial de la Compagnie de JESUS par les Peres *Pierre de Ulboa*, & *Joseph Cassani*, par des Lunettes de différentes grandeurs, & deux Horloges à Pendules qui marquoient les secondes réglées aux observations du midi pendant plusieurs jours avant & après, qui donnoient le temps de ces Phases.

## 84. MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

Entrée dans l'ombre, 9h 45' 17"

Immersion.

|                                            |    |    |    |
|--------------------------------------------|----|----|----|
| Vingius,                                   | 9  | 51 | 24 |
| Tycho,                                     | 10 | 10 | 58 |
| Regio-montanus,                            | 10 | 26 | 25 |
| Keplerus,                                  | 10 | 30 | 14 |
| Arzakel,                                   | 10 | 31 | 37 |
| Ptolomeus,                                 | 10 | 40 | 47 |
| Hipparchus,                                | 10 | 41 | 18 |
| Margo orientalis maris nectaris,           | 10 | 42 | 22 |
| Fracastorius,                              | 10 | 47 | 38 |
| Sancta Catharina                           | 10 | 49 | 20 |
| Pars meridionalis sinus estuum,            | 11 | 50 | 27 |
| Medium Eclipsis ad medium<br>sinus estuum, | 11 | 52 | 45 |

Commencement.

Emerfions.

|                                                 |     |    |     |
|-------------------------------------------------|-----|----|-----|
| Keplerus,                                       | 10h | 56 | 15" |
| Sinus estuum,                                   | 10  | 57 | 22  |
| Grimaldus,                                      | 11  | 1  | 26  |
| Sancta Catharina,                               | 11  | 2  | 34  |
| Albategrius,                                    | 11  | 3  | 7   |
| Cristmanus,                                     | 11  | 37 | 24  |
| Cichus,                                         | 11  | 26 | 10  |
| Walterus,                                       | 11  | 50 | 9   |
| Maginus,                                        | 11  | 55 | 20  |
| Finis umbræ,                                    | 12  | 7  | 34  |
| Penumbræ densioris,                             | 12  | 8  | 26  |
| Penumbræ rarioris & totalis il-<br>luminatio.   | 12  | 10 | 56  |
| La durée totale de l'Eclipse pa-<br>roit ici de | 2h  | 22 | 17" |
| Le milieu de l'Eclipse                          | 10  | 56 | 26  |
| Immersion de Sancta Catharina                   | 10  | 49 | 20  |

Emer-

Emerſion de même Tache, II 2 34  
 Milieu tiré de ces deux Phafes, 10<sup>h</sup> 55' 57"

Une partie des Taches dont on marque ici les Immerſions & les Emerſions ſont trop difficiles à diſtinguer dans les Eclipſes. C'eſt pourquoi nous nous ſommes bornés à celles que nous avons marquées par des nombres dans la figure de la Lune qui nous montrent à part les noms de ces Taches plus faciles à diſtinguer dans les Eclipſes de la manière qu'ils ont été impoſés par *Riccioli*.

## A C O R D O U E.

*Dom Pedro Antonio de Blancas*, nous envoya l'obſervation de la même Eclipſe qu'il avoit faite à *Cordoue*, ſe ſervant d'un quart de cercle qui donnoit diſtinctement les minutes.

Au commencement de l'Eclipſe, il prit la hauteur de l'œil du Taureau de 35 degrez 0'

Et ayant ſuppoſé la hauteur du Pôle de 38 degrez 0' qu'il devoit avoir trouvée par d'autres obſervations, & la déclinaïſon de cette étoile de

45<sup>d</sup> 53'

& ſon Aſcenſion droite de 64 23

& l'Aſcenſion droite du Soleil de 336 6

il trouva 9<sup>h</sup> 45' au commencement de l'Eclipſe.

A la fin de l'Eclipſe il obſerva la hauteur de *Capella* de 29<sup>d</sup> 4', & ayant ſuppoſé la déclinaïſon de cette étoile de 45<sup>d</sup> 40', & ſon Aſcenſion droite de

73<sup>d</sup> 38',

& l'Aſcenſion droite du Soleil de 356 8, il trouva à 2<sup>h</sup> 11' la fin de l'Eclipſe. Ces obſer-

86 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
 vations donnerent la durée de l'Eclipsé de  
 2h 26' & le milieu à 10h 58'.

La comparaifon de ces observations avec la  
 nôtre fut rapportée au 25 Juin.

~~~~~

## COMPARAISON

*Des Phases principales de l'Eclipsé de Lune  
 du 22. Février de cette année 1701. ob-  
 servées en diverses Villes d'Europe, rap-  
 portées à l'Academie le 25. Juin.*

Par M. CASSINI.

### A COLLIOURE.

LE commencement n'y pût être observé à  
 cause des nuages, mais en comparant en-  
 semble les Phases de la même grandeur avant  
 & après le milieu de l'Eclipsé, on trouva le  
 milieu de l'Eclipsé, à 11h 27' 40"  
 La fin totale fut observée à 12 36 57  
 Donc la moitié de la durée fut de 1 9 17  
 Et le commencement de l'E-  
 clipse à 10 18 23

### A PARIS.

Les nuages empêcherent d'observer cette  
 Eclipsé, mais nous avons trouvé par la suite  
 de nos triangles que cette Ville est plus occi-  
 dentale que Collioure de 3 minutes d'heure à  
 une seconde près que nous négligerons ici;  
 ayant



ayant donc ôté 3' des Phases précédentes, le commencement de l'Eclipse aura été à Paris

à	10 <sup>h</sup> 15' 23"
Le milieu à	11 24 40
La fin à	12 33 57.

Nous nous servirons de ces Phases pour trouver la différence des Meridiens des autres lieux où l'on aura observé cette Eclipsé.

## A MADRID.

Par LES PP. ULBOA & CASSANI Jésuites.

à Paris, différence des Meridiens.

Le commen-								
cement à	9 <sup>h</sup> 45' 17"	10	15	23	30	6		
La fin à	12 7 38	12	33	57	26	19		
La durée	2 22 21	2	18	34				
La moitié	1 11 10	1	9	17				
Le milieu	10 56 27	11	24	40	28	13.		

Ces différences des Meridiens sont si différentes entre elles qu'on ne sauroit s'y arrêter. Celle qui est tirée de la fin diffère moins de celle qui a été observée autrefois de 23 à 24 minutes.

## A CORDOUE.

Par D. PEDRO ANTONIO DE BLANCAS.

Le commencement	9 <sup>h</sup> 45'				30'	23"		
La fin	12 11				22	57		
La durée	2 26							
La moitié	1 13							
Le milieu	10 58				26	40		

La

# 88 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

La difference tirée de la fin paroît préférable à celle qui est tirée des autres Phases.

## A P A U.

Par LE P. PALLU Jesuite.

		difference des Meridiens.
Le commencement	10 <sup>h</sup> 4	11 23
La fin	12 20	12 57
La durée	2 16	
La moitié	1 8	
Le milieu	11 12	12 40.

Les differences tirées du milieu & de la fin ne different que de peu de secondes.

## A A V I G N O N.

Par LE P. BONFA Jesuite.

		difference des Meridiens.
Le commencement	10 26 44	11 21
La fin	12 43 28	9 31
La durée	2 16 44	
La moitié	1 8 22	
Le milieu	11 35 6	10 26

La difference tirée de la fin s'accorde assez avec les observations qu'on en a fait autrefois.

## A M A R S E I L L E.

Par LE P. LAVAL Jesuite.

		difference des Meridiens.
Le commencement	10 <sup>h</sup> 28' 30"	13 7
La		

# DES SCIENCES. 89

La fin	12 <sup>h</sup> 45' 40"	11	43
La durée	2 17 10		
La moitié	1 8 35		
Le milieu	12 37 5	12	25
Par les Satellites de 2 <sup>e</sup> différence	des Meridiens.	13	40
Par l'Eclipsé du Soleil 1699.		12	28

## A S T R A S B O U R G.

Par M. EISEMSCHMID.

Le commencement	10 37 37	22	14
La fin	12 56 45	22	48
La durée	2 19 8		
La moitié	1 9 34		
Le milieu	11 47 11	22	31
Par l'Eclipsé du Soleil 1699.		22	7
Difference des Meridiens.		21	21

## A N U R E M B E R G.

Par M. WURSELBAUR.

			difference des Meridiens.
Le commencement un peu douteux	10 50 *	34	47
La fin douteuse	13 7 36	33	39
La durée	2 17 36		
La moitié	1 8 48		
Le milieu	11 56 48	34	8
Par les Satellites de 2 <sup>e</sup> différence	des Meridiens	34	33

A B E R-

## A B E R L I N.

Par M. KIRCHIUS.

différence des  
Meridiens.

Le commencement	10 <sup>h</sup>	59'	36	44'	13"
La fin	13	18	40	44	43
La durée	2	19	4		
La moitié	1	9	32		
Le milieu	12	9	8	44	28
Par le milieu de Tycho,				44	32

## A K I E L.

Par M. REHYER.

Le commencement	10 <sup>h</sup>	45'		
Le milieu	12	0	35	20
La fin	13	15		
La durée	2	30		
Grandeur	6 $\frac{1}{4}$			

ECLIP-

## ECLIPSIS LUNÆ,

Anno 1701. die 22. & 27. Februarii vesperi & mane observata Berolini, à Godfido Kirchio.

Ordo obser- vatio- num.	Tempo- ra ser. Morol. ostil.	Par- tes mi- cro- me- tri. 10 ped.	Altitu- dines & di- stanciz. De- G.M.S. scd. rect. Dig. H.M.S.	Tempo- ra ex al- titud.
----------------------------------	---------------------------------------	---	--	-------------------------------

<b>D</b> ie 22. Februarii ante meridiem,				
1	9 13 50	Altitudo So- lis,	18 5 0	9 14 56
2	9 23 25	Eadem altitu- do,	19 0 0	9 23 44
3	9 29 5	Denuo capta,	19 20 0	9 28 52
4	9 35 52	Altitudo So- lis,	20 18 0	9 37 12
5	10 34 19	Eadem altitu- do,	24 47 0	10 35 32
6	10 36 45	Rurfus obser- vata,	24 58 0	10 38 32
Die 22. Februarii post meridiem,				
7	3 46 0	Stella ☽ s. l. à limbo ☽ prox.	64 10 9 18	3 45 48
8	3 56 0	Distantia re- petita,	90 0 13 4	3 55 40
9	10 6 20	Altitudo Pa- lilicii,	29 0 0	10 6 6
10	10 10 15	Eadem altitu- do,	28 30 0	10 9 26
11	10 13 21	Rurfus,	28 0 9	10 12 45
				Ordo

# 92 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

Ordo obser- vatio- num.	Tempo- ra sec. Horol. ofcil.		Par- tes mi- cro- me- tri 10 ped.	Altitu- dines & di- stantiz. G.M.S.	Tempo- ra ex al- titud. De- Cor- rect. Dig. H.M.S.
12	16	15 29	Altitudo Pa- lilicii,	27 32 0	10 15 53
13	10	19 20	Eadem altitu- do,	27 2 0	10 19 12
14	10	22 15	Denuo,	26 40 0	10 21 40
15	10	45 0	Diameter Lu- nz,	234 0 33 59	10 44 23
16	10	50 0	Palus Marco- tis, à limbo D prox.	8	10 49 22
17	10	52 0	Lacus niger major, à limbo D prox.	24	10 57 32
18	10	55 0	Diameter Lu- nz,	232 0 33 42	10 54 21
19	10	56 0	Penumbra densa,		10 55 21
20	10	58 0	Penumbra densissima,		10 57 21
21	10	59 0	Nondum ve- rum Ini- tium,		10 58 21
22	11	0 15	Initium ve- rum,		10 59 36
23	11	2 0	Umbra certe intra dif- cum,		11 1 20
24	11	4 30	Chorda de- fectus,	80 0 11 37	11 3 50
25	11	10 30	Partes obscu- ratæ,	27 0 4 4 1 27	11 9 49
26	11	16 0	Palus Marco- tis incipit,		11 15 18
27	11	17 15	Mons Sinai incipit,		11 16 33
28	11	19 0	Medium mon- tis Sinai tectum.		11 18 18
					Ordo

Ordo obser- vatio- num.	Tempo- ra sec. Horol. oscil.	Par- tes mi- cro- me- tri 10 ped.	Altitu- dines & di- stantiz. G.M.S.	Tempo- ra ex al- titud. Cor- rect. H.M.S.
			De- fect. Dig.	
29	11 20	• Mons Sinai totus tectus,		11 19 18
30	11 20 35	Medium pa- ludis ma- reotis tec- tum,		11 19 53
31	11 22 15	Palus marzo- tis tota tectis		
32	11 23 10	Partes obscu- ratz,	56 0 8 8 2 53	11 22 27
33	11 25 0	Partes obscu- ratz,	58 0 8 27 2 59	11 24 17
34	11 27 45	Chorda partls Eclipsatz,	190 0 27 36	11 27 12
35	11 31 50	Partes Luci- dx,	160 0 23 14 3 46	11 31 6
36	11 37 15	Chorda,	206 0 29 55	11 36 30
37	11 40 0	Lacus niger major à limbo )) prox.	24 0 3 29	11 39 15
38	11 42 0	Orient. termi- nus major à limbo )) prox.	22 0 3 12	11 41 14
39	11 45 0	Occid. termi- nus major à limbo )) prox.	8 0 1 10	11 44 14
40	11 48 0	Latitudo Pa- ludis Mzo- tis,	14 0 2 2	11 47 14
41	11 51 0	Diameter Lu- nx,	233 0 33 50	11 50 13
42	11 55 30	Partes Luci- dx,	134 0 19 28 5 6	11 54 42
43	12 0 0	Partes Luci- dx,	130 0 18 53 5 18	11 59 11
				Ordo

# 94 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

Ordo obser- vatio- num.	Tempo- ra sec. Horol. oscil.	Par- tes mi- cro- me- tri 10 ped.	Altitu- dines & di- stantiz. G.M.S.	Tempo- ra ex al- titud. Cor- rect. H.M.S.
			De- fect. Dig.	

Die 23. Februarii ante  
meridiem.

44	0 5	0 Palus Mareo- tis incipit Partes Lu- cidz,	128	0 18 35 5 25	0 4 11
45	0 1 55	Partes Luci- dz,	126	0 18 18 5 31	0 7 6
46	0 8	0 Medium Ma- reotis,			7 11
47	0 9	0 Partes Luci- dz,	124	0 18 1 5 37	0 8 14
48	0 12	0 Partes Luci- dz,	124	0 18 1 5 37	0 11 10
49	0 13	0 Tota Palus Mareotis illuminata,			0 12 10
50	0 21	0 Partes Luci- dz,	128	0 18 35 5 25	0 20 9
51	0 26 45	Partes Luci- dz,	130	0 18 53 1 18	0 25 53
52	0 31 30	Partes Luci- dz,	136	0 19 45 5 12	0 30 37
53	0 37	0 Partes Luci- dz,	140	0 20 20 4 47	0 36 6
54	0 42 35	Partes Luci- dz,	150	0 21 47 4 16	0 41 41
55	0 44 45	Chorda partis Eclipsata,	208	0 4 13	0 43 50
56	0 48	0 Partes obscu- rata,	72	0 10 27 3 42	0 47 5
57	0 50 35	Partes obscu- rata,	68	0 9 53 3 30	0 49 39
58	0 55	0 Chorda,	184	0 26 43	0 54 3
59	0 59	0 Mediū mon- tis Sinai partes ob- scur.	50	0 7 16 2 34	0 58 3

Ordo



Ordo obser- vatio- num.	Tempo- ra sec. Horol. oscil.	Par- tes mi- cro- me- tri ro ped.	Altitu- dines & di- stantiz. G.M.S.	De- fect. Dig.	Tempo- ra ex al- titud. Cor- rect. H.M.S.
60	I 0 10	Totus Mons Sinai reg- tus,			0 59 13
61	I 1 45	Partes obscu- rata,	42 0 6 6 2 10	I 0 47	
62	I 4 25	Chorda,	150 0 21 47	I 3 27	
63	I 7 15	Partes obscu- ratz,	32 0 4 39 1 39	I 6 17	
64	I 10 40	Chorda,	120 0 17 26	I 9 41	
65	I 12 15	Partes obscu- ratz,	20 0 2 54 1 2	I 11 16	
66	I 14 0	Chorda,	100 0 14 31	I 13 1	
67	I 15 31	Partes obscu- rata,	10 0 1 27 0 31	I 14 35	
68	I 17 0	Chorda,	60 0 8 43	I 16 0	
69	I 18 40	Ferè finis,		I 17 0	
70	I 19 0	Finis Eclip- scos,		I 18 40	
71	I 30 0	Mons Sinai, à limbo )) prox.	36 0 5 14	I 28 58	
72	I 32 0	Diameter Lu- næ,	232 0 33 43	I 30 57	

LUNÆ

## LUNÆ ECLIPSIS

*Partialis Norimbergæ observata, Anno  
1701. die 22. Februarii à J. P. Wur-  
zelbaur.*

## TRACTATUS PHASIUM.

## Tempora Phasium

H. M. S. Ordo quantit.  
dig.

X. 40 0

**P**Enumbra jam ab aliquot minutis evidenter ingruit, umbra rara plus solito adeoque commixta, ut terminum inter utramque ægrè discernere licuerit.

50 0

Initium haud satis certum, è regione sinus Sirbonis, sive (maris Humorum.)

57 46

1 1½

Infra dictum sinum (mare).

XI. 4 56

2 2½

A parte inferiori paludis Mareotidis (Grimaldi) trans medium sinum Sirbonis (M. humor.) ad Insulas Didymas.

9 55

3 2½

Trans med. p. mareot: (Grim:) & montem Sinai (Tychonem)

Tem-

## Tempora Phasium

H.	M.	S.	Ordo	quantit. dig.	
17	44	4	3 $\frac{1}{4}$	A parte superiori pal. mareot. (Grim.) trans Ins. Rhodum.	
28	3	5	4 $\frac{2}{3}$	Super pal. mareot. (Grim.) infra Ins. Lem- non ad Paropamis.	
34	36	6	5 $\frac{1}{2}$	A partibus infer: Ins. Cercinna (ventorum.) sinus Syrticus, super Lemnon ad Lacum Thospit:	
42	46	7	5 $\frac{2}{3}$	A sinu Syrtic. trans M: M. Sipyl. & Didym. (Ptolemæum & Albate gn. & sinum extremum Ponti (mare Nectaris) ad oram sinus inf. maris Caspîi (maris fœcundi- tatis)	
52	50	8	5 $\frac{1}{2}$	Trans part. superior pal. Mareot. (Grim.) ad montem Olympum (Hip- parchum) ad Caucasum superiorem.	
58	14	9	5 $\frac{2}{3}$	Trans pal. Mareot. (Grim.) ad ins. Mal- tam Montem Olympum (Hipparch. Colchidem & mare Caspium (fœ- cunditatis)	
XII.	4	8	10	5 $\frac{1}{4}$	Infra pal. Mareot. (Grim.) super Mont. Olymp. (Hipparch.)

MEM. 1701. E Tem

H. M. S. Oido quant.  
dig.

				ad ins. Maj. maris Caspii (fœcundit.) Obscuratio circ. maxima.
13	42	11	5 $\frac{1}{2}$	Trans mare Ægypt. Peloponnes. & Colchida.
20	44	12	5	Trans sinum Sirbonis (mare humor.) ins. Melos & Colch.
28	56	13	4 $\frac{1}{2}$	Trans oram inferiorem finus Sirbonis (mare humorum) ad Ins. Rhodum (Profatium) trans Colchidem ad Insulam majorem maris Caspii (fœcunditatis)
37	20	14	3 $\frac{1}{4}$	Per Insulas Didymas ad montis Libani partem superiorem (Purbachium) trans fretum Ponticum & mare Casp. (fœcund.)
43	41	15	3 $\frac{1}{4}$	Super montem Sinai (Tychonem) & sinum infer. M. Casp. (fœc.)
49	40	16	2 $\frac{1}{4}$	Infra medium montis Sinai (Tychonem) trans sinum inferiorem maris Caspii (fœcundit.)
54	5	17	2	A Monte Hajalon ad montem Nerosum.
57	20	18	1 $\frac{1}{2}$	Super montem Coibacaran: trans suphian.

Tem-

## Tempora Phasium

H. M. S. Ordo quantit.

XIII.	2	42	19	0 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	Inter montes Delanguer & circa finem ins. Scit- bicus.
	7	36	20	0 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	An finis dubius (Ma- nilius) & ins. Rho- dus (Profatius)
	12	50			Finis in eodem ferè verti- cali constituebantur)

Umbra Telluris toto defectûs tempore præ-  
ter aliquatenus rubentem convexitatem extre-  
mam, colore ferrugineo, intra penumbram  
latius protensam terminis minus distinctis &  
quasi lanugine latè fimbriata apparuit usque,  
ut neque initium neque finem Eclipsæos mo-  
mentis satis certis assignare licuerit.

Ratio semidiametrorum Lunæ & umbræ  
Telluris erat quasi 270. ad 750.

Anno 1700.

Primus Satelles  
Jovis.


d. 15. Junii.	h. 2. m. 22.	f. 15. a. M.	immergebatur
d. 10. Augusti.	h. 7. m. 50.	p. m.	jam emerferat, ob- servatio tempeſtiva impedita
d. 17. Augusti.	h. 9. m. 41.	f. 42. p. m.	emerſit
d. 2. Septembr.	h. 8. m. 7.	p. h.	propter statutum in loco emerſionis ſa- tellitæ alium emer- ſio non illi dubie dijudicari poterat
d. 9. Septembr.	h. 10.	p. m.	eadem contingit in- commoditas
d. 12. Decembr.	h. 5. m. 37.	f. 10. p. m.	trans aërem nebu- loſum dubia emerſio obſervata fuit.

DECLINATIONES ACÛS MAGNETICÆ  
observatæ Norimbergæ à J.P. Wurzelbaur.

Anno 1686. mense Octobri	5° 45'	} à Septen- trione in Occa- sum.
1691. Septembri	6 30	
1695. Junio	8 30	
1697. Junio	9 0	
1699. Junio	9 30	
1700. Junio	10 0	

Anno 1700. à d. 7. in 13. Novembris obser-  
vatæ fuerunt maculæ solares.  
d. 9. Novembris hora 9<sup>na</sup>. a. m. hac figura. \*

*Cette Tache est celle dont il est parlé à la  
fin de la page. 102.*



## TACHES DANS LE SOLEIL

Observées le 29. Mars 1701. par Mrs. Caffini & Maraldi à Montpellier. Envoyé à M. l'Abbé Bignon, & rapporté à l'Academie le 9 Avril.

Détermination de la situation de la Tache  
plus grande.

Première ob-  
servation.


3<sup>h</sup> 49' 51" le bord du Soleil au fil horizontal de  
la Lunette

3.50 15 le bord précédent au ver-  
tical,

Autre déter-  
mination.

4<sup>h</sup> 11' 9"

4 11 42



3 51	23½	la Tache à l'horizontal	4 <sup>h</sup> 12' 39"
3 52	53	le bord inférieur à l'horizontal	4 14 10
3 53	8	le bord suivant au vertical	4 14 38½
		Hauteur du Soleil,	18 <sup>d</sup> 18' 50"

Ayant trouvé les Pôles de la revolution du Soleil autour de son axe, & leur situation dans son disque apparent, & tracé l'Equinoxial des taches & leur meridien, qui passoit par le centre du Soleil. Et le cercle de déclinaison de la tache plus grande à quatre heures du soir, on a trouvé sa latitude ou déclinaison à l'égard de l'Equinoxial de 12 degrez vers le Midi, & sa longitude Orientale à ce temps-là de 2 degrez 10 minutes, que la tache parcouroit presque en 4 heures. Elle passa donc par le centre du Soleil le 29 Mars 1701. à 8 heures du soir.

La Tache que nous avons observé à *Rhodes* du mois de Novembre 1700. avoit eu une latitude meridionale à l'égard de l'Equinoxial des Taches de 9 degrez & demi, vers le Midi, & par conséquent elle étoit plus proche de l'Equinoxial du globe du Soleil de 2 degrez & demi.

Entre le 7 Novembre 1700. que la tache passa par le milieu du Soleil, & le 29. Mars 1701. il y a 142 jours, qui donneroient 5 revolutions de 28 jours  $\frac{2}{3}$ , si c'étoit la même Tache, au lieu que les revolutions ordinaires des Taches, même quand le Soleil passe par son Perigée, où elles paroissent un peu plus lentes qu'ailleurs, n'excedent gueres 27 jours & 14 heures. Son mouvement seroit donc plus



plus lent que celui des autres Taches, & elle auroit aussi une irregularité qui la feroit changer de latitude.

M. Wurzelbaur observa la Tache de 1700. depuis le 7. jusques au 13. de Novembre. Il nous communiqua cette observation avec celle de l'Eclipse de Lune du 22. Février sans détermination de sa situation dans le disque du Soleil.

Il compara son diametre à celui du Soleil, qui dans la figure qu'il en donne, n'est que la septieme partie d'un doit y compris sa bordure brune.

*Nous ajoûterons ici diverses differences des Meridiens tirées des Eclipses du Soleil.*

## COMPARAISON

*De diverses Observations de l'Eclipse du Soleil du 23. Septembre 1699. faites en diverses Villes d'Europe.*

**A** MESURE que nous avons reçu les observations de cette Eclipsé faites en divers lieux, nous les avons portées dans la figure que nous dressons ordinairement à cet usage, pour en tirer la difference des meridiens entre les lieux où elle a été observée. Nous commenterons par la nôtre, à laquelle principalement nous avons comparé les autres. Et nous ajoûterons aux observations des autres les heures qui étoient alors à Paris, tirées de notre figure.

## A PARIS, dans l'Observatoire Royal.

M<sup>RS</sup>. CASSINI & MARALDI.

Le commencement de l'E-			
clipse observé à	8h	15'	0" mat.
La plus grande obscurité de 9			
doigts 29 minutes à	9	27	
La fin de l'Eclipse à	10	45	5
La durée	2	30	5

## A CHATENAY.

M. DE MALESIEU.

Le commencement de l'E-			
clipse à	8h	15'	0"
Fin de l'Eclipse	10	47	0
La durée	2	32	
Le meridian de <i>Chatenay</i> est très-proche du			
meridian de l'Observatoire vers l'Occident			

## A MARSEILLE.

M. CHAZELLES, LE P. FEUILLE'E &  
LE P. DE LAVAL.

Commencement de l'Eclipse ob-			
servée à <i>Marseille</i>	8h	30'	3"
Par la figure à <i>Paris</i>	8	17	20
Difference des meridiens	0	12	43

La fin de l'Eclipse observée à			
<i>Marseille</i>	11	1	13
Par la figure à <i>Paris</i>	10	49	0
			Diffe

DES SCIENCES.	105	
Difference des meridiens	12	13
Milieu entre les deux	12	28
Grandeur de l'Eclipse à <i>Marseille</i>		
8 doigts $\frac{1}{2}$		
Par la figure 8 doigts $\frac{1}{2}$		
La durée	2	31 10

### A A V I G N O N.

LE P. BONFA Jesuite.

Commencement de l'Eclipse à <i>Avignon</i>	8	25	0
Par la figure à <i>Paris</i>	8	16	40
Difference des meridiens	8	20	
La fin de l'Eclipse à <i>Avignon</i>	10	57	17
Par la figure à <i>Paris</i>	10	47	30
Difference des meridiens	9	47	
milieu	9	3	
Grandeur de l'Eclipse observée à <i>Avignon</i>	8	doigts $\frac{1}{2}$	
Par la figure	8	doigts $\frac{1}{2}$	
La durée	2	32	17

### A A R L E S.

M. D A V I Z A R D.

Commencement de l'Eclipse à <i>Arles</i>	8	24	30
Par la figure à <i>Paris</i>	8	16	55
Difference des meridiens	0	7	35
Fin de l'Eclipse à <i>Arles</i>	10h	53	30
Par la figure à <i>Paris</i>	10	46	10
Difference des meridiens	0	7	20
E 5			mi-

		milieu	7	27
A	8h. 29'	grandeur de l'Eclipsé		
		à Arles 8 doigts		
		Par la figure	7	$\frac{4}{5}$
A	8	36 grandeur de l'Eclipsé	8	$\frac{1}{2}$
		Par la figure à Paris	8	0
La durée			2	29

## A L A R O C H E L L E.

M. DES HAYES.

Commencement de l'Eclipsé à la				
<i>Rochele</i>	7	58	17	
Par la figure à Paris	8	13	0	
Difference des meridiens		14	43	
Fin de l'Eclipsé à la <i>Rochele</i>	10	23	7	
Par la figure à Paris	10	37	15	
Difference des meridiens		14	8	
		milieu	14	26
La durée	2	24	50	

## A G E N E S.

LE MARQUIS DE SALUAGO & LE MARQUIS  
ALEXANDRE GRIMALDI.

L'Eclipsé avoit déjà commencé				
à Genes à	8	45	7	
Le commencement de l'Eclipsé				
par la figure à Paris	8	19	40	
donc la difference des meri-				
diens seroit moindre de	0	25	27	
La fin de l'Eclipsé à Genes	11	19	42	
Fin par la figure à Paris	10	55	35	
			Durée	

## DES SCIENCES. 107

Difference des Meridiens	24	7
La grandeur de l'Eclipse par la figure 8 doigts	45	
La durée	2	34 35

## A LYON.

LE P. S. BONET Jesuite.

L'Eclipse avoit déjà commencé à <i>Lyon</i> à	8 <sup>h</sup>	26	25
Par la figure à <i>Paris</i>	8	16	0
Donc la difference des Meridiens seroit moindre que	10	25	
Fin de l'Eclipse à <i>Lyon</i>	10	57	20
Par la figure à <i>Paris</i>	10	48	20
Difference des Meridiens	9	0	

## A MADRID.

LE DUC D'UZEDA, L'ABBE' SCOTTI,  
LE P. KREZA Jesuite.Le commencement ne fut point observé à  
*Madrid* à cause du mauvais temps.

L'Eclipse a un doigt & demi à <i>Madrid</i>	7	59	45
Par la figure à <i>Paris</i>	8	23	0
Difference des Meridiens.	0	23	15
La fin à <i>Madrid</i>	10	7	0
Par la figure à <i>Paris</i>	10	29	10
Difference des Meridiens	22	10	

À *Madrid* par l'observation, la grandeur de  
l'Eclipse n'arriva pas à 7 doigts

## 108 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

Par la figure 6 doigts 26'  
La durée plus de 2<sup>h</sup> 7' 15"

## A M O D E N E.

LE PERE FONTANA Theatin.

Commencement à <i>Modene</i>	8	55	0
Par la figure à <i>Paris</i>	8	20	45
Difference des Meridiens	0	34	15

La fin de l'Eclipse à <i>Modene</i>	11 <sup>h</sup>	33	20
Par la figure à <i>Paris</i>	10	59	10
Difference des Meridiens		34	10

Grandeur de l'Eclipse observée à <i>Modene</i> 9 doigts $\frac{1}{2}$			
Par la figure	8	56	
La durée	2	38	20

## A S T R A S B O U R G.

M<sup>rs</sup>. EISENSCHMID & SCHMID.

Commencement de l'Eclipse à <i>Strasbourg</i>	8	41	27
Par la figure à <i>Paris</i>	8	19	20
Difference des Meridiens		22	7

Fin de l'Eclipse à <i>Strasbourg</i>	11	15	21
Par la figure à <i>Paris</i>	10	54	0
Difference des Meridiens		21	21

Grandeur observée à <i>Strasbourg</i> 10 doigts 0			
Par la figure	10	doigts 0	
La durée	2	33	54

A B O-

## A B O L O G N E.

M<sup>RS</sup>. MANFREDI & STANCARI.

Commencement à <i>Bologne</i>	8	56	30
Par la figure à <i>Paris</i>	8	21	20
Difference des Meridiens		35	10
Fin de l'Eclipse à <i>Bologne</i>	11	36	49
Par la figure à <i>Paris</i>	11	1	1
Difference des Meridiens		35	49
Grandeur de l'Eclipse observée à <i>Bologne</i>			
		9	doigts
Par la figure		9	doigts un peu plus
La durée		2	40 19

A 12 milles de P A R M E à l'Occident.

LE P. BECCATELLI Jesuite.

Commencement à <i>Parme</i>	8	55	38
Par la figure à <i>Paris</i>	8	22	0
Difference des Meridiens		33	38
Fin de l'Eclipse	11 <sup>h</sup>	39	54
peut-être	11	36	54
Par la figure à <i>Paris</i>	11	2	20
Difference des Meridiens	0	34	24
Grandeur observée à 12 milles de <i>Parme</i>			
		9	doigts $\frac{2}{3}$
Par la figure à <i>Paris</i>		9 <sup>d</sup>	un peu plus
La durée		2	44 16

## A D A N T Z I C.

Nous avons deux observations de *Dantzic*,

E 7

sans

# 110 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

fans les noms des Observateurs, qui ne s'accordent pas bien ensemble. Une qui nous a été communiquée par M. *Hartsoeker*, faite par un de ses amis, qui donne;

Le commencement à	9 <sup>h</sup> 37' 9"
La fin à	12 5 58
La grandeur de l'Eclipsé	11 doigts $\frac{2}{3}$
Sa durée auroit été de	2 28 49

L'autre qui nous a été communiquée par M. *Reyher*, donne le commencement à.. 9 27 20 dix minutes plutôt que la précédente.

La fin à	12 0 48
----------	---------

cinq minutes plutôt que la précédente.

Sa durée auroit été de	2 33 28
------------------------	---------

Il est inutile de chercher la différence des Meridiens par des observations qui s'accordent si peu ensemble, l'ayant d'ailleurs avec plus de justesse par la comparaison des observations des Eclipses de Lune faites à *Dantzic* par M. *Hevelius*, & par nous à *Paris*.

M. l'Evêque de *Babylone* étant à *Damadun* en *Perse*, dit que l'Eclipsé y fut très-considérable, qu'elle y dura plus d'une heure, & qu'elle arriva un peu après midi; mais comme il étoit indisposé il n'en observa pas les particularitez.

## A N U R E M B E R G.

Par M. WURZELBAUR.

Le commencement de l'Eclipsé	8 57 14
Par la figure à <i>Paris</i>	8 22 55
Difference des Meridiens	34 19
Fin à <i>Nuremberg</i>	11 <sup>h</sup> 33 56

Par



Par la figure à <i>Paris</i> .	10	59	30
Difference des Meridiens		34	26
Le milieu		34	22
Grandeur observée	10 doigts	$\frac{1}{4}$	
La durée	2	36	32

## A' K I E L.

Par M. R E I H E R.

La fin de l'Eclipse	11	33	
Par la figure à <i>Paris</i>	10	57	15
Difference des Meridiens		35	45

Ni le commencement ni le milieu ne purent être observez à cause des nuages. Il y eut une obscurité plus grande que celle qui arrive ordinairement après le coucher du Soleil.

## A GRIPSWALD en Pomeranie.

Par M. P Y L E.

Le commencement ne pût être observé à cause des nuages. On observa deux doigts & demi d'Eclipse à :

	9	37	
Par la figure à <i>Paris</i>	8	44	15
Difference des Meridiens		52	45
La fin fut observée à :	11	40	30
Par la figure à <i>Paris</i>	10	47	50
Difference des Meridiens		52	40

à 10 heures 22' il ne parut rester que 4 minutes d'un doigt du Soleil qui ne fut couvert.

L'obscurité fut si grande qu'on ne pouvoit lire ni écrire. Il y eut des personnes qui virent quatre étoiles, Venus qui étoit au Nord du

112 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
du Soleil, & les autres, peuvent être Mer-  
cure, la queue du Lion, & l'épi de la Vierge.

*A STRALSUND en Pomeranie.*

Par une Lettre qui nous a été communi-  
quée par M. de *Villarmont*, l'obscurité causée  
par l'extrémité de la Lune étoit si épaisse que  
les étoiles paroissoient, comme en pleine nuit.

---

*Voici encore les differences des Longitudes de  
plusieurs Villes de la France, tirées des  
Observations de l'Eclipse du Soleil du  
12. Juillet 1684.*

*A P A R I S.*

Par M. CASSINI.

Le commencement de l'Eclipse 2<sup>h</sup> 26' 55"  
tiré des Phases suiv.

La fin 4 43 23  
observée immédiatement

La grandeur de l'Eclipse 7 doigts  $\frac{7}{8}$ .

*A A I X en Provence.*

Par M. LE PRIEUR GAULTIER.

Le commencement à 2 54 30

La fin à 5 9 6

Heure de la fin au meridiem  
de *Paris* par la figure 4 55

Diffe-

Difference des Meridiens 14 6 à l'Orient

Difference de longitude 3<sup>d</sup> 31 30

La grandeur de l'Eclipse à *Aix* 8 doigts & demi.

### A AVIGNON.

Par LE PERE BONFA.

Le commencement 2<sup>h</sup> 43' 27"

La fin 5 4 37

Heure de la fin au Meri-  
dien de *Paris* par la

figure 4 56 3

Difference des Meridiens 8 34 à l'Orient

Difference de longitude 2<sup>d</sup> 8 30

La grandeur de l'Eclipse à *Avignon* 9 doigts

### A LYON.

Par LE R. PERE HOSTE.

La fin de l'Eclipse 4 59 20

Le temps de la fin au  
Meridien de *Paris* par

la figure 4 51<sup>h</sup> 20

Difference des Meridiens 8 0 à l'Orient

Difference de longitude 2<sup>d</sup> 0

La grandeur de l'Eclipse à *Lyon* 8 doigts &  $\frac{1}{2}$ .

### A HONFLEUR.

Par M. DE GLOS Professeur d'Hydrographie.

Le commencement de  
l'Eclipse

2 15 0

La fin

4 35 30

Le

# 114 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

Le temps de la fin au Meridien de *Paris* par  
la figure 4 42 0

Difference des Meridiens 6 30 à l'Occident

Difference de longitude 1 d 37 30

La grandeur de l'Eclipse à *Honfleur* plus de  
8 doigts.

A P A U.

Par LE PERE RICHAUD.

La fin de l'Eclipse 3 45

Le temps de la fin au

Meridien de *Paris*

par la figure 4 54

Difference des Meridiens 9 à l'Occident

La grandeur de l'Eclipse à *Pau* 10 doigts.

D E V A N T R O S E S.

Par M. CHAZELLES.

Le commencement 2h 40 0

La fin 5 1 30

Le temps de la fin au

Meridien de *Paris* par

la figure 4 57 30

Difference des Meridiens 4 0 à l'Orient

Difference des longitudes 1 degré.

La grandeur de l'Eclipse à *Roses* 10 doigts.

Cette dernière observation qui montre *Roses*  
plus orientale que *Paris* d'un degré, fait voir  
que la Meridienne de *Paris* ne va pas à *Per-*  
*pignan* comme par les Cartes de la *France*,  
mais qu'elle passe par les montagnes occiden-  
tales du *Roussillon*.

Cette

Cette détermination qui paroissoit alors extraordinaire a été confirmée par la Meridienne de l'Observatoire, prolongée jusques à ces montagnes l'an 1701.

M. *Maraldi* l'avoit employée dans sa Carte de la *France*, publiée par le Sieur *Jaillot* l'an 1700, qui est la première où le Meridien de *Paris* ait été dirigé par la *France* à son véritable terme meridional dans les *Pyrénées*.

~~~~~

## OBSERVATIONS SUR UN FOETUS HUMAIN MONSTRUEUX.

Par M. LITTRE.

\* **P**remière Observation. Dans l'arrière-faix de ce Foetus, outre le chorion & l'amnios, il y avoit une troisième membrane faite comme les deux autres, & non pas en boudin, de même que celle qu'on trouve en certains animaux, & qu'on appelle, Allantoïde. Je separai entièrement avec le doigt ou par le soufflé, cette membrane de celle de l'amnios, & je la separai du chorion jusqu'à l'endroit où celui-ci est adhérent au placenta, & même d'une partie de cet endroit, mais avec un peu plus de peine. Cette troisième membrane étoit un peu plus mince que l'amnios & aussi épaisse que le chorion; elle n'avoit aucun vaisseau sanguin sensible; je n'observai aucune

\* 6. Avril 1701.

liqueur entre elle & le chorion, - mais entre l'amnios & cette membrane particuliere, il y avoit une demi-once de liqueur mucilagineuse & jaunâtre. Cette liqueur étoit vraisemblablement la partie la plus gluante de l'urine, laquelle à cause de sa viscosité, n'avoit pu s'écouler avec les autres, après la rupture des membranes dans le temps du travail pour accoucher. C'est peut-être cette matiere qui restant entre ces deux membranes, après l'écoulement des parties les plus tenues de l'urine, les colle ensemble, & fait qu'on les prend pour une seule. Depuis ce temps-là j'ai trouvé la même membrane dans plusieurs Foetus humains parfaitement bien formez en m'y prenant comme j'avois fait dans le Foetus monstrueux.

L'usage de la troisième membrane de l'arriere-faix des Foetus humains est vraisemblablement le même, que celui de l'Allantoïde des animaux, où elle se trouve, je veux dire que l'urine, qui ne peut être contenue dans les bassinets des reins, dans les ureteres ni dans la vessie, passe de la vessie par l'ouraque dans la cavité formée par l'amnios & par la membrane particuliere, pour y être en reserve jusqu'au temps de l'accouchement.

L'ouraque dans les Foetus humains, est un tuyau creux d'une demi-ligne de grosseur, dans lequel on insinué facilement une soie de porc; il part du milieu du fond de la vessie, & se porte entre les deux arteres ombilicales au nombril, & de-là le long du cordon jusques dans la cavité formée par l'amnios & par la membrane particuliere, au lieu que dans les animaux, il se porte dans la cavité de l'Allan-

lantoïde. Voici quelques observations, qui prouvent le passage de l'urine dans les Foetus humains de leur vessie par l'ouraue dans la cavité, dont je viens de parler.

J'ai ouvert le cadavre d'un garçon de 12 ans, qui avoit toujours rendu presque toutes ses urines par le nombril. J'ai remarqué au dedans du cou de sa vessie, une chair fongueuse qui bouchoit ce passage : que l'ouraue étoit creux depuis le fond de la vessie jusqu'au nombril ; & que sa cavité avoit une ligne & demie de diametre. D'où il paroît que la cause de l'évacuation de l'urine par cette voie extraordinaire, étoit le fongus, dont je viens de parler, & que l'urine passoit de la vessie au nombril par l'ouraue.

J'ai connu un homme âgé de 30 ans, lequel depuis qu'il étoit au monde, rendoit les urines par le nombril, ce qui ne se pouvoit faire que par l'ouraue.

Enfin j'ai remarqué dans le cadavre d'un jeune homme de 18 ans, que son ouraue, que j'ai fait voir à l'Academie, étoit creux du côté de la vessie de la longueur de 5 travers de doigt, & que dans cette étendue elle avoit 3 lignes de diametre. Une pierre de figure conique, grosse par la base de 4 lignes qui étoit engagée dans la cavité du cou de la vessie, & qui la bouchoit presque tout-à-fait, avoit donné lieu à la dilatation de cet ouraue. Si ce jeune homme avoit encore vécu du temps, son urine qui ne pouvoit sortir par le cou de la vessie, qu'avec beaucoup de peine & en très-petite quantité auroit vraisemblablement achevé de dilater l'ouraue jusqu'au nombril. Enfin les urines se seroient écou-

118 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
écoulées par cette voye comme dans les deux  
autres.

Ces dilatations extraordinaires d'ouraque  
ne paroissent possibles, que dans les enfans,  
où les parois de ce conduit ne sont pas encore  
assez dures ni assez fortement collées ensem-  
ble pour resister aux efforts, que l'urine fait  
contre toute la vessie, lorsqu'elle trouve son  
passage naturel fermé par quelque cause étran-  
gere.

*Seconde Observation.* Le cordon ombilical  
du Fœtus monstrueux étoit extrêmement en-  
tortillé, raccourci de la moitié & gros seule-  
ment comme une petite plume d'Oye à écrire  
hormis en quelques endroits, où il y avoit  
des tumeurs grosses comme de petites noi-  
fetes.

L'entortillement du cordon ombilical avoit  
été vraisemblablement causé par des douleurs  
aigues, que le Fœtus avoit ressenties dans le  
ventre de sa mère. Cet entortillement avoit  
donné lieu non seulement au raccourcissement,  
au retrecissement & aux tumeurs du cordon,  
mais encore à l'accouchement prématuré de  
la mère, & à la mort du Fœtus.

L'effort égal des liqueurs sur tout le cor-  
don pour le traverser, & la resistance inégale  
dans quelques-unes de ses parties, y ont cau-  
sé les tumeurs dont je viens de parler.

L'entortillement du cordon a donné occa-  
sion à l'accouchement prématuré. 1. En em-  
pêchant les arteres ombilicales de fournir as-  
sez de sang aux mammelons du placenta pour  
les conserver dans la grosseur nécessaire pour  
être proportionnez aux trous de la partie in-  
terieure de la matrice, où ils ne tiennent  
qu'au



qu'au moyen de cette proportion reciproque.

2. Parce que le cordon par son entortillement ayant perdu la moitié de sa longueur, le Fœtus ne pouvoit se remuer dans la matrice sans tirailler le placenta & par conséquent sans le faire séparer de la matrice.

3. Parce que la liqueur qui pendant la grossesse, passe sans cesse de la matrice des meres dans le placenta des Fœtus, ne pouvant faire ce trajet dans celui-ci à cause de l'entortillement de son cordon, devoit redoubler ses efforts pour s'ouvrir un chemin; ce qu'elle ne pouvoit faire sans repousser & chasser les mamelons du placenta hors des trous de la partie interieure de la matrice, & par conséquent sans en faire détacher le placenta.

Enfin l'entortillement du cordon ombilical a donné lieu à la mort du Fœtus; parce qu'en détruisant peu à peu la cavité des vaisseaux du cordon, le Fœtus ne pouvoit par cette voye recevoir de sa mere ni air, ni suc nourricier, lesquels cependant étoient absolument nécessaires pour sa conservation.

On m'objectera peut-être qu'un Fœtus peut se nourrir par la bouche de la liqueur, où il nage dans la matrice, & que cette liqueur peut passer de la matrice dans la cavité de l'amnios à travers les pores des membranes du placenta. Les observations que j'ai faites sur 3 Fœtus humains serviront de réponse à cette objection.

Les deux premiers Fœtus qui étoient mâles, l'un âgé de 7 mois & l'autre de 8, étoient tous deux gros & gras. Celui de sept mois n'avoit ni tête ni cou & la partie supérieure du tronc étoit couverte de la peau de même que

que le reste du corps. La tête manquoit seulement au Fœtus de 8 mois, & la partie supérieure de son cou étoit tout-à-fait couverte de la peau.

Le troisième Fœtus qui étoit femelle, à terme & très-bien nourri, avoit les trous des narines & de la bouche entierement fermez; & ces trois endroits ne différoient des parties voisines ni en couleur, ni en consistance. C'est pourquoi on ne peut pas douter que ce vice ne fut un défaut de la première conformation.

De ces trois dernières observations, on peut conclure que la liqueur contenue dans la cavité de l'amnios ne sert pas à la nourriture du Fœtus, ou que si elle y sert, elle n'y est pas absolument nécessaire; puisque dans ces trois derniers Fœtus, quoique fort gras & très-bien nourris, il n'a pû entrer dans leur corps aucune goutte de la liqueur de l'amnios.

*Troisième Observation sur le Fœtus monstrueux.*  
Il n'y avoit dans son crâne que la base. Cette base étoit couverte d'une membrane qui étoit double d'un tissu fort serré, épaisse d'un tiers de ligne, & qui ne contenoit dans sa duplicature aucun vestige de moëlle, mais seulement les nerfs & les vaisseaux sanguins, qu'on trouve ordinairement à la base du crâne. Les nerfs avoient sensiblement leur commencement à la superficie inférieure de la partie supérieure de la membrane qui les renfermoit, & ils faisoient trois lignes de chemin dans la duplicature, avant que de sortir de la base du crâne pour s'aller distribuer aux autres parties du corps.

Qua-

*Quatrième & dernière Observation.* Le canal de l'épine du Fœtus monstrueux étoit ouvert par derrière dans toute sa longueur, de la largeur de 9 lignes; il étoit tapissé de la même membrane que la base du crâne. Cette membrane ne renfermoit dans sa duplication aucune moëlle, elle contenoit seulement les nerfs & les vaisseaux sanguins particuliers à l'épine, & ses deux parties étoient tellement collées ensemble ou avec les vaisseaux qui étoient dans sa duplication, qu'il ne restoit entre elles aucune apparence de canal. Les nerfs tiroient leur origine de la surface intérieure de la partie postérieure de la membrane contenue dans ce canal osseux.

Toutes les autres parties de ce Fœtus étoient parfaitement bien formées & très-bien nourries. Ce Fœtus a vécu 8 mois dans le ventre de sa mere, & elle l'y a senti remuer environ jusqu'à ce temps-là.

Cette observation & quelques autres pareilles que j'ai faites avant celle-ci, semblent rendre fort suspect l'usage qu'on donne au cerveau, ou du moins faire douter, si les esprits qu'il sépare du sang par ses glandes, sont aussi nécessaires qu'on l'assure, pour le sentiment, pour le mouvement, pour la nourriture & les autres fonctions du corps.

On pourroit peut-être lever ce doute en disant, que dans ce Fœtus & autres semblables, il y avoit à la membrane qui tapissoit la base du crâne & le canal de l'épine, des glandes de pareille configuration aux glandes de la moëlle du cerveau & de la moëlle épiniere, lesquelles au défaut de ces deux substances médullaires, sépareroient du sang arteriel les es-

prits animaux, & que les nerfs continus à cette membrane de la base du crâne & du canal de l'épine, les distribuoient à toutes les parties de son corps pour faire toutes ses fonctions.

De pareilles observations ne prouvent donc pas suffisamment, que les esprits animaux n'existent pas & qu'ils soient inutiles.

Je ne suppose pas sans raison ces glandes; puisque j'en ai remarqué de fort sensibles dans les membranes du cerveau & de la moëlle de l'épine de plusieurs cadavres, où elles avoient considérablement grossi à cause d'une grande inflammation, qui y étoit survenue par maladie.

C'est vraisemblablement par le moyen de ces glandes disposées dans le Fœtus monstrueux autrement que dans les Fœtus bien formez, qu'il a vécu environ 8 mois dans le ventre de sa mere sans aucune moëlle dans le crâne ni dans le canal de l'épine, & qu'il auroit encore pû vivre, après en être sorti; puisqu'apparemment il n'y est mort qu'à cause de l'entortillement du cordon ombilical, comme je l'ai expliqué. Sa vie auroit été vraisemblablement courte & languissante, parce que les glandes de la membrane qui tapissoit la base du crâne & le canal de l'épine étant dans un nombre infiniment plus petit, que celles de la substance du cerveau & de la moëlle épiniere, n'auroient jamais pû filtrer assez d'esprits pour faire toutes les fonctions corporelles & repa-  
rer les dissipations, que l'air & les autres choses exterieures (dont il étoit à couvert dans la matrice) auroient sans cesse causées dans son corps.

Quant

Quant aux fonctions de l'ame, il n'y a guere d'apparence que ce Fœtus privé entièrement de cerveau, eut exercé les fonctions de l'imagination, du jugement, du raisonnement, &c. ou du moins il en auroit exercé peu & très-imparfaitement. Car outre toutes les raisons qu'on a jusqu'ici apportées pour prouver que l'ame a son siege dans le cerveau & qu'elle y fait toutes ses operations: Voici quelques observations qui confirment la même chose.

Le cerveau dans l'homme est plus grand que dans tous les animaux, quoiqu'il y en ait d'incomparablement plus grands que lui; vraisemblablement pour contenir un nombre infini de diverses traces, qui fournissent à l'ame une infinité de différentes idées, dont les animaux sont incapables.

Plus les animaux ont de cervelle, plus ils ont aussi de sagacité, & mieux ils imitent & copient les actions de l'homme.

Plus le cerveau de l'homme est grand, plus les fonctions de son ame sont parfaites, & plus il est capable d'en faire. Ce qui se remarque fort sensiblement dans le rachitis, qui est une maladie particuliere aux enfans. Ceux qui sont atteints de cette maladie, ont la tête extrêmement grosse & le cerveau à proportion; les fonctions de leur ame sont si prématurées, qu'à l'âge de 8 à 9 ans ils ont l'imagination plus vive, plus nette, & plus étendue, le jugement plus formé & le raisonnement plus juste & plus solide que des personnes de 30 ans.

Enfin on pourroit peut-être ajoûter, que des glandes & des nerfs simples, tels qu'ils

étoient dans la membrane du crâne de ce Fœtus monstrueux, ne suffisoient pas à son ame pour faire ses fonctions; qu'elle avoit encore besoin d'une substance medullaire, & d'un espace ample & libre; d'une substance médullaire pour recevoir & conserver toutes les impressions qu'il faut que les esprits animaux fassent dans le cerveau; d'un espace ample & libre, afin que ces esprits eussent la liberté de se mouvoir en tous sens & de toute maniere pour exciter dans l'ame un nombre infini de différentes idées. Or ces deux choses manquoient absolument dans le corps de ce Fœtus & par conséquent son ame n'y pouvoit pas exercer ses fonctions, ou du moins fort imparfaitement.

~~~~~

## OBSERVATIONS SUR QUELQUES EFFETS DES FERMENTATIONS.

Par M. HOMBERG.

\* **D**EPUIS que le Système des Acides & des Alcalis a été publié, l'on s'en est servi pour expliquer généralement tous les changemens lents ou subits que nous voyons arriver aux mélanges des matières simples, particulièrement les effets des Fermentations, des Effervescences & des Ebullitions, cependant quand on examine de près ces trois diffé-

rentes

\*\*\* 6. Avril 1701.

rentes actions que l'on confond ordinairement sous le nom de Fermentations, nous trouvons qu'il n'y a presque aucune fermentation qui soit produite par le mélange d'un acide & d'un alcali, que ce ne sont que de simples ébullitions ou des effervescences qui sont l'effet du mélange de ces deux matières, & que très-souvent il y a des ébullitions & des effervescences qui sont produites par d'autres causes que par le mélange des acides & des alcalis.

Pour donner une idée distincte de ces trois différens effets, j'appelle Fermentation lors que dans un mixte il se fait naturellement une séparation de la matiere sulphureuse d'avec la saline, ou lors que par la jonction de ces deux matières, il se compose naturellement un mixte.

J'appelle Effervescence, lors que deux matieres qui se pénètrent produisent de la chaleur, comme il arrive dans presque tous les mélanges des acides & des alcalis, & dans la plupart des dissolutions minérales.

J'appelle Ebullition lors que deux matieres en se pénétrant font paroître des bulles d'air, comme il arrive dans les dissolutions de certains sels par les acides.

La raison pourquoi on a confondu ces trois actions sous le seul nom de Fermentation, est que les Fermentations s'échauffent ordinairement, en quoi elles ressemblent aux effervescences, & qu'elles sont presque toujours accompagnées de quelque gonflement, en quoi elles ressemblent aux ébullitions; mais quand on considerera qu'il y a des violentes effervescences produites par des matieres d'une même nature, savoir par deux sels différens seule-

ment en degrez de volatilité & de fixité, comme sont un sel acide & un sel lixiviel; sans qu'il s'y manifeste aucune matiere sulphureuse; nous concevrons aisément qu'une simple effervescence n'est pas une fermentation.

Puis considerant encore qu'il y a des ébullitions même violentes sans aucune chaleur, dont quelques-unes, bien loin de s'échauffer se refroidissent considérablement pendant l'ébullition, comme il arrive dans le mélange de l'huile de Vitriol, & du sel Ammoniac, & enfin qu'il se trouve des effervescences très-violentes sans aucune ébullition, comme dans le mélange de l'huile de Vitriol, & de l'eau commune, nous tomberons facilement d'accord que les simples ébullitions ne pourront pas être des effervescences ni des fermentations, puis que le caractère du premier consiste dans la production d'une chaleur, & que le caractère de la fermentation consiste dans une séparation naturelle de la matiere sulphureuse d'avec la saline, ou dans une jonction naturelle de ces deux matieres, laquelle est souvent accompagnée d'une très-forte effervescence, ce qui s'observe particulièrement lors que la matiere sulphureuse aussi-bien que la saline, sont dans un haut degré de rarefaction.

*Olaus Borrichius* me paroît avoir observé le premier, que le mélange de ces deux matieres s'enflâme quelquefois de lui-même, il donne pour exemple la confusion de l'huile de Vitriol, & de l'huile de Therebentine, mais presque tous ceux qui en ont voulu faire l'expérience ont bien trouvé une grande effervescence avec une forte ébullition, mais sans aucune flâme.

J'ai



J'ai examiné cette experience avec soin, & j'ai observé que pour y réussir, il faut que l'huile de Vitriol soit déflegmée autant qu'il est possible, & que l'huile de Therebentine soit la dernière qui passe dans la distillation, c'est-à-dire, celle qui est épaisse comme du sirop & de couleur rousse, car celle qui est blanche, & qui vient dans le commencement de la distillation ne s'enflâme jamais. La raison de cette difference consiste vraisemblablement, en ce que l'huile blanche de Therebentine venant la première dans la distillation, est toujours mêlée de l'acide de sa résine, & que cette huile rousse & épaisse, qui vient à la fin de la distillation, ne contient aucun acide, & comme cette grande chaleur ne provient que d'un frottement violent que ces deux liqueurs font réciproquement l'une sur l'autre en se pénétrant, il doit y avoir un frottement bien plus violent dans l'huile de Therebentine destituée de toute acidité que dans celle qui est encore mêlée avec l'acide de sa sève, parce que l'acide du Vitriol trouvant les interstices de l'une de ces huiles déjà fort abreuvées d'un suc acide, il ne s'y peut pas introduire avec autant de rapidité que dans l'autre huile qui ne contient aucun acide. Je crois que c'est par la même raison pourquoi toutes les autres huiles essentielles des Plantes de l'*Europe* autant que j'en ai pu voir, ne s'enflament pas avec l'huile de Vitriol, ni avec aucun autre esprit acide, parce qu'elles sont toutes abreuvées de quelque portion d'acide de leurs Plantes Aromatiques des *Indes*, comme de la Cannelle, des Cloux de girofles, des Cardamomes, du Macis, du Sassafras, &c. s'enflament

ment toutes avec la plûpart des acides, particulièrement avec l'esprit de Nitre, pourvû qu'ils soient extrêmement déflegmez, & que l'huile aromatique ne soit pas mêlée de quelque huile de nos Pais froids, apparemment la chaleur de ces Pais-là dégage naturellement, les matieres huileuses de l'acidité de leurs Plantes, ce que le froid de ces Pais-ci ne permet pas.

La fermentation prompte & violente de ces deux matieres, composée des resines semblables en consistance à celles qui découlent naturellement de certains arbres, ces nouvelles resines ne retiennent pas tout-à-fait l'odeur des huiles essentielles qui sont entrées dans leur composition, celle de l'huile de giroffes sent un peu la Rose, celle de l'huile de Cannelle sent parfaitement les noyaux de Péches pilez, celle de l'huile de Macis a l'odeur du Santal citrin, &c.

J'ai observé que ces huiles étant falsifiées, ou mêlées de quelque huile de ces Pais-ci, ou n'étant faites que par la simple expression, elles ne s'enflâment pas, en sorte que cette operation pourroit servir de preuve de leur bonté.

Nous pouvons vraisemblablement juger par ces resines factices, que les naturelles sont de même un mélange d'une huile essentielle & d'un acide: j'en ai été en partie convaincu par l'experience suivante. J'ai dissous dans de l'huile de Cannelle autant de Camphre, qu'elle est capable de dissoudre, lequel est de toutes les resines que nous connoissons la plus inflammable, j'ai versé dans cette dissolution de l'esprit de Nitre, qui mettoit toujours le feu à l'huile de Cannelle, mais ce mélange ne s'est point

point enflammé; il y a bien de l'apparence que c'est par la même raison que j'ai alleguée ci-dessus, c'est-à-dire, que l'acide naturel du Camphre qui s'est répandu dans l'huile de Cannelle, a empêché l'esprit de Nitre d'agir de toute sa force, comme il auroit fait sans le mélange du Camphre.

Il paroîtra étonnant à quelques-uns que cette effervescence qui ne met pas le feu au Camphre, ne laisse pas de mettre le feu à la poudre à Canon; mais quand on considère que la poudre à Canon ne s'est pas dissoute dans l'huile de Cannelle, on voit qu'elle n'a pas changé le tissu de cette huile, comme avoit fait le Camphre, en sorte que l'esprit de Nitre y a agi en toute liberté, & la flâme que ces deux liqueurs ont produite, a enflammé ensuite la poudre à Canon.

L'on pourroit demander ici pourquoi les violentes effervescences des acides sur les alcalis, ne sont pas aussi-bien accompagnées d'une flâme que celles des acides sur les liqueurs sulphureuses; il paroît y avoir deux raisons principales de cette différence. La première, est que dans l'effervescence produite par un acide & par un alcali, il n'y a que l'acide seul qui agisse, l'autre y étant purement passif, au lieu que dans l'effervescence produite par un acide & par une liqueur sulphureuse, toutes les deux matières sont des principes actifs qui agissent réciproquement l'une sur l'autre, dont l'action réciproque doit produire une chaleur plus violente que ne fera la précédente action simple. La seconde raison, est que les matières sulphureuses sont naturellement toutes inflammables, au lieu que les alcalis ne le sont pas.



## M E T H O D E S

*Générales pour trouver la difference en déclinaison & en Ascension droite de deux astres qui sont peu éloignez l'un de l'autre, en se servant du Micromètre ordinaire.*

Par M. DE LA HIRE.

## P R E M I E R E M E T H O D E.

\* C E T T E Methode est très-commode dans les observations Astronomiques qu'on est obligé de faire ordinairement pour trouver la difference de Déclinaison & d'Ascension droite de deux astres. Lorsqu'on a un cercle bien placé dans le meridien, & qu'on peut observer le passage de ces astres dans ce cercle, on peut facilement par leurs differentes hauteurs meridiennes, trouver leur difference de Déclinaison, & par le moyen du temps qui s'écoule entre le passage de chacun de ces astres par le meridien, on peut trouver leur difference ascensionnelle. Mais cette maniere est fort souvent inutile: car si ces astres sont fort proche l'un de l'autre, on ne peut pas faire toutes les observations des hauteurs & des passages tout ensemble; & il arrive très-souvent, sur tout dans la conjonction des Planetes entr'elles, ou des Planetes avec les étoiles, que


\* 10. Avril 1701.

ces astres ne sont pas visibles dans le meridiem.

La Methode que je propose ici a cet avantage par dessus les autres, que je ne me fers que du seul Micrometre dont la construction est connue & expliquée dans le Recueil des Ouvrages de l'Academie que j'ai fait imprimer; c'est pourquoi je n'en dirai rien autre chose, sinon, que c'est un Chassis quarré-long divisé en parties égales par des filets de Ver à soye qui sont paralleles aux petits côtez du Chassis, & par dessus ce Chassis qui doit être arrêté au foyer d'une Lunette d'approche, il y en a un autre qui coule, & qui porte aussi un ou deux filets, lesquels sont toujours paralleles à ceux du Chassis immobile dans le mouvement. Il y a de plus dans le Chassis de dessous un autre filet vers le milieu qui coupe tous les autres à angles droits; la figure fait assez voir cette construction.

Lorsqu'on voudra faire l'observation, on choisira un lieu commode, & ce qui sera nécessaire pour arrêter bien ferme la Lunette avec son Micrometre, dans quelque position inclinée au mouvement des Astres, sans qu'il y ait aucune sujettion à cette position, si ce n'est que les Astres qu'on veut observer, puissent passer & paroître dans l'ouverture du Micrometre.

Et je fais en sorte que l'Astre *A* qui passe le premier dans le Micrometre, rencontre en *A* un point du Micrometre, où le filet transversal *AS*, coupe un des filets paralleles *Ad*; on peut se passer de cette condition, en se servant du filet mobile, comme je l'expliquerai ensuite; & je marque exactement le temps de la Pendule où l'Astre *A* a passé en *A*.



J'observe aussi exactement le temps où le même Astre *A* rencontre quelqu'un des autres filets parallèles, comme *BD* en *B*; ainsi je connois le nombre des secondes que l'Astre *A* aura employé à parcourir l'espace *AB*.

De la même manière j'observe le temps de la rencontre de l'autre Astre *S* avec le filet transversal en *S*, & enfin le temps où il rencontre le même filet parallèle *BD* en *D*. Je connois donc en secondes le temps que l'Astre *S* a employé à parcourir l'espace *SD*, & le temps qui s'est écoulé entre les observations des rencontres de l'Astre *A* avec les mêmes filets. On remarquera qu'il n'importe pas que le second Astre *S* rencontre d'abord le filet transversal ou le parallèle, ce qu'on a représenté des deux manières dans la figure.

Soit fait présentement comme le nombre des secondes de temps du mouvement de l'Astre *A* par *AB*, au nombre des secondes de temps du mouvement de l'Astre *S* par *SD*, ainsi la distance *AC* qui est connue en minutes & secondes de degré sur le Micrometre, à la distance *CS* en minutes & secondes de la même nature.

Mais ayant converti les secondes horaires du mouvement par *AB* en minutes & secondes

des

des de degré d'un grand cercle, comme sont celles de la distance  $CA$  du Micrometre, ce qui se doit faire par deux regles ordinaires, dont la premiere est de convertir en minutes & secondes de cercle les secondes de temps du mouvement qui se fait par un arc  $AB$  que nous considerons comme une ligne droite ou comme un arc d'un grand cercle, en prenant pour chaque minute de temps 15 minutes de degré & de même pour les secondes: & la seconde regle en faisant comme le rayon est au Sinus de complement de la déclinaison de l'Astre, qu'il n'est pas nécessaire de connoître dans la dernière exactitude, ainsi le nombre des secondes de  $AB$ , qu'on vient de trouver, au nombre des secondes de la même espece qui seront en  $CA$ , c'est-à-dire des secondes d'un grand cercle.

De plus dans le triangle rectangle & rectiligne  $CAB$ , les côtes  $CA$  &  $AB$  sont donnez avec l'angle droit au point  $C$ , c'est pourquoi par la Trigonometrie rectiligne on trouvera l'angle  $CAB$ . Mais si l'on imagine la perpendiculaire  $CPR$  du point  $C$  sur  $AB$ , on aura  $AB$  à  $CA$ , comme  $CA$  à  $AP$ .

Mais dans le triangle rectangle  $CAP$  outre l'angle droit, on a encore l'angle en  $A$  avec le côté  $CA$ : c'est pourquoi on aura comme le rayon est à  $CA$ , ainsi le Sinus de l'angle  $CAP$  est à  $CP$ .

De plus comme le nombre des secondes horaires du mouvement par  $AB$  est au nombre des secondes horaires du mouvement par  $SD$ , ainsi  $CP$  en parties d'un grand cercle est à  $CR$ . Si l'on ôte donc  $CR$  de  $CP$ , ou si on le lui ajoute, ce qu'il faut faire lorsque  $SD$

est hors du triangle  $CAB$ , on aura  $PR$  en parties d'un grand cercle, ce qui sera la différence de Déclinaison des deux Astres qu'on a observez.

Lorsque dans ces calculs nous comparons le mouvement par  $AB$  au mouvement par  $SD$ , nous n'ayons pas d'égard à la différence de ces mouvemens qui vient de leur différente Déclinaison, parce qu'elle ne peut pas être de grande conséquence entre deux Astres qu'on peut observer avec le Micrometre.

Enfin pour les différences d'Ascension droite, on a comme  $AB$  est à  $AP$ , ainsi le nombre des secondes horaires du mouvement de l'Astre  $A$  par  $AB$ , au nombre des secondes du mouvement du même Astre par  $AP$ . On connoîtra donc le temps dans lequel l'Astre  $A$  est venu en  $P$ , puisqu'on a observé le temps quand il étoit en  $A$ .

Mais comme le nombre des secondes horaires du mouvement par  $AB$  est au nombre des secondes horaires du mouvement par  $SD$ , ainsi le nombre des secondes horaires par  $AP$  au nombre des secondes horaires par  $SR$ . On connoît de plus le temps auquel l'Astre  $S$  étoit en  $S$ ; & si on lui ajoute le temps du mouvement par  $SR$  si les rencontres  $A$  &  $S$  sont du même côté du point  $C$ , autrement il faudra ôter le temps du mouvement par  $SR$  du temps de l'observation en  $S$ , on aura le temps où l'Astre  $S$  est venu en  $R$ .

Mais enfin la différence du temps des passages des Astres en  $P$  & en  $R$  qui est sur le même cercle meridien perpendiculaire au mouvement des Astres  $AB$ ,  $SD$ , sera la différence d'Ascension droite de ces Astres en parties  
de




de temps, laquelle on convertira en degrez & minutes par les regles ordinaires. On doit remarquer que dans cette regle on n'a aucun égard au mouvement propre des Astres pour la difference du temps entre leurs rencontres sur le Meridien *CP*. Cependant si ces Astres ou un seul seulement avoient un mouvement propre qui fut fort grand, il faudroit en tenir compte dans ce calcul, & marquer le temps où la difference Ascensionnelle doit être comptée.

On peut connoître aisément par ce qui vient d'être expliqué, comment on peut se servir du filet parallele *Ad* qui passe par *A* ou de quel autre on voudra, ou même du filet mobile, au lieu du filet *BCD*; car toute cette opération ne consiste que dans les triangles semblables qui sont formez par les lignes du mouvement des Astres entre le filet transversal & les paralleles. Si au lieu de prendre le premier point de l'observation en *A* sur la rencontre d'un des filets paralleles avec le transversal, ce qui est une sujétion, on fait mouvoir le filet mobile jusqu'à la rencontre du filet transversal avec l'Astre, ce qui sera très-facile à faire, on en déduira toujours les mêmes choses, puisqu'on connoitra sur le Micrometre la distance entre cette rencontre & le sommet *C* commun des triangles semblables.

## SECONDE METHODE.

On peut encore avec le Micrometre, & d'une maniere differente de la précédente trouver les mêmes choses. Il faut d'abord placer le Micrometre avec sa Lunette, en sorte que

que l'un des Astres qu'on veut observer, marche sur l'un des filets paralleles, ce qui ne peut se faire qu'en le laissant passer quelque temps sur ce filet, & s'il s'en écarte après l'avoir placé sur ce filet, il faut un peu tourner la Lunette avec le Micrometre & placer de nouveau l'Astre sur le filet, & si l'on trouve qu'il marche sur ce filet, il faut aussi-tôt faire l'observation comme je vais l'expliquer. Si l'Astre le plus Occidental des deux qu'on veut observer, marche sur l'un des filets paralleles, il faut marquer le temps dans lequel cet Astre



rencontre le filet transversal comme en *A* dans cette figure. Ensuite aussi-tôt que le second Astre *S* commencera à paroître dans l'ouverture du Micrometre, il faut faire mouvoir le filet parallele mobile, en sorte qu'il passe par l'Astre

l'Astre  $S$  : mais il faut bien prendre garde de ne pas changer le Micrometre ni sa Lunette de place, car l'observation seroit defectueuse, & ensuite on marquera exactement le temps où cet Astre  $S$  rencontrera le filet transversal en  $D$ . Comme on fait sur le Micrometre la distance qu'il y a entre le filet parallele  $A$  & le filet parallele  $SD$ , il n'y a rien à faire de plus pour la difference de déclinaison de ces Astres, car la distance  $AD$  en parties d'un grand cercle, telles que sont celles qui sont marquées par le Micrometre sera la difference de déclinaison cherchée.

Maintenant pour la difference d'Ascension droite de ces Astres, il faut réduire la difference du temps qui s'est écoulé entre l'observation en  $S$  & l'observation en  $D$  en convertissant les parties du temps en parties de cercle, en donnant  $15'$  de degré pour une minute d'heure, &  $15''$  de degré pour une seconde d'heure, & sans autre réduction, on aura la difference ascensionnelle cherchée.

Il faut remarquer que l'on n'a point d'égard au mouvement propre de ces Astres ce qui demanderoit une correction, si ces Astres ou un seul en avoit un sensible pour l'espace du temps, qui s'est passé entre les observations en  $S$  & en  $D$  : C'est pourquoi on ne se sert ordinairement de cette maniere d'observer les differences d'Ascension droite & de déclinaison des Astres que lorsqu'ils sont proche les uns des autres.

Cette seconde Méthode est beaucoup plus simple que la premiere, car elle ne demande aucun calcul ; mais aussi il y a beaucoup plus de difficulté dans l'exécution de l'observation.

Car

Car il n'est pas aisé de disposer le Micrometre de telle sorte que l'Astre coule au long d'un des filets paralleles, & quand même on l'auroit bien placé pour cet effet, l'Astre change aussi-tôt de direction apparente à cause que le filet parallele ne represente qu'une tangente du cercle parallele à l'Equateur qu'on suppose que l'Astre parcourt dans le temps de l'observation; mais aussi on peut réiterer cette observation plusieurs fois de suite pour s'assurer de la verité de ce qu'on aura trouvé, & s'il se trouve quelque difference entre les observations, on pourra prendre un milieu.

Je ne donne point d'exemples de ces méthodes, car il me semble qu'elles sont si simples & si faciles qu'il n'est pas possible qu'on s'y puisse tromper. Je suppose aussi qu'on connoît parfaitement les grandeurs des intervalles des filets paralleles pour la longueur de la Lunette, à laquelle le Micrometre est appliqué, ce que j'ai enseigné à déterminer par différentes manieres, & que j'expliquerai plus au long que je n'avois fait, à l'occasion de quelques nouvelles manieres pour les observations des Eclipses de Soleil & de Lune que je donne ensuite le 16. Juillet.

On se sert ordinairement de differens appuis pour la Lunette & le Micrometre, mais il y en a quelques-uns qui donneront beaucoup de facilité à faire ces observations, & c'est ce que je laisse à l'industrie de l'Observateur & à la commodité du lieu où il se rencontrera.



# OBSERVATIONS ANALYTIQUES DU JALAP.

Par M. BOULDU.

\* **L**E Jalap dont je rapporte les observations & les différentes Analyses que j'en ai faites, est une racine qui ne nous est connue que depuis quelques années, elle nous est apportée des *Indes Occidentales*, quelques-uns ont prétendu qu'elle tiroit son nom de celle qu'on appelle, *India Gelapa* ou *Celapa*.

Les Modernes en ont décrit la Plante sous plusieurs noms, & entre autres sous celui de *Convolvulus Americannus Jalapinum dictus*.

Ils estiment avec raison cette racine un des meilleurs purgatifs que nous ayons, l'expérience me l'a confirmé, je suis seulement surpris qu'elle soit si peu en usage, & que l'on l'ait jusqu'à présent tant négligée, car les effets m'en ont toujours paru si doux & si moderez que je n'ai point remarqué qu'elle eût besoin de correctif pour réprimer sa trop grande action, non plus que de véhicule pour l'accélérer, comme la plupart de nos purgatifs ordinaires; cependant on n'a pas laissé de s'étudier à lui donner nombre de préparations assez inutiles, pour le corriger, lesquelles, à mon sens, détruisent plus ce remède qu'elles ne l'améliorent. Je

\* 30. Avril 1701.

Je fai par moi-même que sa meilleure préparation consiste uniquement dans son choix qui est d'être bien resineux: ceux qui ne l'ont pas bien connu, ont dit pour le détruire, qu'il laissoit, après son action, le ventre sec, en sorte qu'il restoit quelques jours sans faire son devoir, mais ils n'ont pas pris garde en même temps que cet effet est commun à tous les purgatifs, sur tout aux Hydragogues.

J'ai fait ainsi que des autres purgatifs, l'Analyse du Jalap, & par la distillation & par l'extraction. Je ne dirai rien ici de celle que j'ai faite par la distillation, n'y ayant rien remarqué qui ne soit assez semblable à la précédente; pour m'attacher uniquement à celle que j'ai faite par l'extraction, soit par l'esprit de vin qui est la plus ordinaire, soit avec l'eau.

Et comme cette racine n'est pas également qualifiée, c'est-à-dire qu'elle se trouve plus ou moins resineuse, j'ai crû à propos, pour mes-experiences, & pour mieux juger des proportions de ses principes, d'en faire un corps égal, c'est-à-dire après l'avoir bien choisi, de le réduire en poudre pour faire l'une & l'autre de ces extractions.

J'ai ainsi disposé vingt-quatre onces de Jalap que j'ai partagé en deux parties égales de 12 onces chacune; de l'une j'en ai tiré les teintures, selon l'art avec autant d'esprit de vin qu'il en a fallu pour dépouiller le Jalap de toute sa partie resineuse; ces 12 onces m'ont produit 2 onces de resine bien seiche.

Du marc bien desséché, & qui ne pesoit plus que 9 onces six dragmes, je n'ai pas laissé de tenter d'en faire l'extraction avec l'eau

fin-

simple, j'en ai encore retiré de cette maniere quatre onces d'extrait assez solide & très-pur, parce que j'avois eu soin de séparer les parties crasses & terrestres des différentes décoctions que j'avois faites de ce marc; ces parties crasses & terrestres bien desseichées en forme d'extrait se sont encore trouvées peser sept dragmes; ainsi l'on peut compter que ces 12 onces de Jalap ont produit près de 7 onces de differens extraits, le marc ainsi dépouillé n'a plus pesé que quatre onces deux dragmes entierement inutile.

J'ai fait l'extraction des 12 autres onces de Jalap avec l'eau simple par plusieurs infusions & décoctions à la maniere ordinaire, c'est-à-dire que par une digestion de plusieurs jours à chaleur lente, ces décoctions étant devenues claires & séparées des parties crasses & mucilagineuses qui y étoient confuses, j'en ai fait par évaporation un extrait assez solide & bien conditionné qui s'est trouvé peser six onces & demie; les parties crasses & mucilagineuses que j'avois séparées de ces décoctions par la filtration, ayant été bien desseichées en extrait, ont encore pesé une once & demie, le marc ou residu ne pesoit plus que quatre onces & demie.

Il est à remarquer que quoique je ne me sois servi pour cette extraction que d'un dissolvant aqueux, ce dissolvant n'a pas laissé de détacher & détendre quelques portions de la resine du Jalap, que ses sels n'avoient pû s'approprier, parce que dans ce mixte les parties resinenses surpassent de beaucoup les salines, cette resine se trouvoit à chaque décoction coagulée en forme de glu aux parois & au fond  
du

du vaisseau, séparée toutefois de la partie mucilagineuse, j'ai retiré trois dragmes de cette resine qui ne diffère point de la resine ordinaire.

J'ai dit que le marc des 12 onces de Jalap dont j'ai tiré l'extrait avec l'eau, ne pesoit plus que quatre onces & demie; j'ai essayé d'en tirer avec l'esprit de vin, ce qui pouvoit y être resté de resine, & que l'eau n'avoit pû étendre, j'en ai encore retiré cinq dragmes, qui avec les trois qui se sont trouvé nager sur les décoctions, ont fait une once: d'où l'on peut conclure que les six onces & demie d'extrait fait avec l'eau, renferment une once de resine, puisque douze onces de Jalap de même qualité m'ont produit deux onces de resine par le moyen de l'esprit de vin.

De toutes ces préparations, j'ai remarqué & observé que l'extrait de Jalap que j'ai d'abord fait avec l'eau, & qui assurément contenoit une once de resine, pris au poids de 24 à 36 grains purgeoit doucement & lentement, mais poussoit beaucoup plus par les urines, comme je l'ai vû en nombre d'hydropiques.

Que le marc de cet extrait qui contenoit encore quelque peu de resine pris en même dose, purgeoit raisonnablement, mais avec tranchées.

Que le marc ou residu dénué de tous principes ne produisoit aucun effet.

Que toutes ces resines ne différoient point en effets les unes des autres.

J'ajouterais que l'extrait que j'ai préparé du residu ou marc de Jalap dont j'avois tiré la resine par l'esprit de vin, & qui ne contenoit vrai-semblablement que les parties salines ac-

com-



compagnées des terrestres, ne purge que peu ou point, mais pousse beaucoup par les urines.

D'où je puis hardiment inferer & conclurre que les extraits pour purger utilement & sans irritation, doivent contenir les principes salins & les principes résineux; ceux-ci produisent toujours beaucoup de desordre, & ceux-là ne font qu'émouvoir & pousser par les urines, au lieu que joints ensemble, les effets en sont louables, parce que les parties salines étendent les parties résineuses, les dissolvent, en accélèrent la distribution, & empêchent par là, que les parties résineuses n'adhèrent & n'enflament les parties.



## OBSERVATIONS

*Sur les ovaires & les trompes d'une femme  
& sur un Fœtus trouvé dans l'un de ses  
ovaires.*

Par M. LITRE.

\* J'AI remarqué premièrement, que l'ovaire droit de cette femme étoit gros comme un œuf de cane; qu'il avoit à sa surface, un trou rond de 3 lignes de diamètre; & qu'il étoit séparé intérieurement par une cloison membraneuse en 2 cellules, dont la plus éloignée de la matrice étoit 2 fois plus grande que l'autre. Ces 2 cellules étoient remplies d'une liqueur blanchâtre, trouble & épais-

† 28. Mai 1701.

épaisse, en laquelle la substance propre de l'ovaire, qui étoit toute consumée, avoit été vraisemblablement changée.

On voyoit fort distinctement dans cet ovaire 2 membranes, qui avoient chacune près de demi ligne d'épaisseur, & entre ces 2 membranes une substance musculeuse, qui étoit de la même étendue, & à peu près de l'épaisseur d'une de ces membranes. La substance musculeuse peut être d'un grand secours pour faciliter le mouvement des humeurs dans les ovaires & favoriser la sortie de leurs vésicules, après qu'elles ont été rendues fécondes par l'esprit séminal du mâle.

En second lieu j'ai observé, que la trompe droite étoit plus grosse qu'à l'ordinaire; que son pavillon étoit fort charnu & collé à l'ovaire du même côté; que dans la cavité de cette trompe tout auprès de la matrice, il y avoit une vésicule de 3 lignes de diamètre, qui y étoit tombée de cet ovaire par le trou, dont j'ai parlé, mais qui n'avoit pu passer dans la matrice, parce qu'étant scirrheuse dans cette femme, elle avoit fait affaïsser les parois de ce conduit dans l'endroit où il la traverse pour se rendre dans sa cavité.

Troisièmement j'ai observé, que la trompe gauche étoit plus menue que de coutume; que sa couleur étoit d'un rouge fort brun; qu'elle avoit son pavillon renversé du côté de la région iliaque gauche, & adhérent au ligament large gauche de la matrice à deux travers de doigt de l'ovaire du même côté.

En quatrième lieu, j'ai observé, que l'ovaire gauche étoit plus gros de la moitié que dans l'état naturel; & qu'il avoit à sa surface  
une

une petite cicatrice ouverte dans son milieu dont l'ouverture étoit large de 2 lignes, & aboutissoit dans une petite poche. Cette poche étoit ronde, large de 4 lignes, attachée par son fond aux parties voisines de l'ovaire par plusieurs vaisseaux & par quelques filets membraneux, & elle étoit composée de deux sortes de substance. La substance, qui étoit située à la partie extérieure de cette poche, avoit un tiers de ligne d'épaisseur, & elle étoit rouge & musculieuse. Celle qui étoit placée à la partie extérieure, avoit une demi ligne d'épaisseur & elle étoit glanduleuse & de couleur jaunâtre.

Il y a beaucoup d'apparence, que quelque temps auparavant il étoit sorti par l'ouverture de cette poche une vesicule qui devoit être tombée dans la capacité du ventre; parce que le pavillon de cette trompe étoit collé, comme j'ai dit, au ligament large de la matrice du même côté. Par conséquent ce pavillon ne pouvoit pas se porter sur l'ovaire pour en recevoir cette vesicule, & ensuite la transporter dans la matrice par le reste de son conduit.

J'ai aussi apperçu dans ce dernier ovaire à travers ses membranes 2 vesicules, grosses chacune de 4 lignes, & parsemées de vaisseaux sanguins comme les jaunes des ovaires des volatils. Ces membranes contenoient une liqueur claire & mucilagineuse; elles n'étoient nullement attachées aux membranes communes de l'ovaire; & elles avoient par tout plus d'une demi-ligne d'épaisseur, hormis aux endroits qu'elles touchoient les 2 vesicules, lesquels étoient minces comme une peau d'oi-

gnon, & on n'y remarquoit aucun trou. D'où on peut inferer que les vesicules des ovaires des femmes en croissant se portent à leur superficie, si elles ne s'y trouvent pas placées naturellement; qu'elles en étendent insensiblement les membranes sur tout aux endroits qu'elles les touchent immédiatement; qu'enfin elles les déchirent à force de les étendre. Ainsi les vesicules des ovaires des femmes, de même que celles des Quadrupedes & de certains poissons, par exemple, des Rayes, des Chiens de mer, &c. ne sortent jamais des ovaires, que par la rupture de leurs membranes communes.

Je sai bien que quelques-uns prétendent, que cette sortie se fait par des ouvertures particulieres, qui se rencontrent naturellement, à ce qu'ils disent, dans les membranes communes des ovaires pour la favoriser. Cependant quelque soin que je me sois donné pour découvrir ces ouvertures dans les femelles, dont je viens de parler, je n'y en ai jamais pu remarquer aucune qu'après la sortie des vesicules. D'ailleurs ces ouvertures laissent toujours en se fermant une cicatrice sensible, ce qui ne devoit pas arriver, si elles étoient naturelles. Enfin dans les ovaires des volatils, où ces ouvertures se trouvent naturellement, on les y observe aussi-bien devant, qu'après la sortie des œufs.

J'ai encore remarqué dans le même ovaire une troisième vesicule, qui différoit des 2 autres. 1. En ce qu'elle étoit un peu plus petite. 2. Parce qu'elle ne paroissoit pas à travers les membranes de l'ovaire. 3. A cause qu'elle étoit enfermée dans une poche semblable à celle

celle dont j'ai déjà parlé dans la quatrième observation.

Cette troisième vésicule, outre une liqueur claire, & mucilagineuse, contenoit un Fœtus, qui avoit une ligne & demie de grosseur sur trois de longueur, & qui étoit attaché à la partie intérieure des membranes de la vésicule par un cordon gros d'un tiers de ligne, & long d'une ligne & demie. Je distinguois fort sensiblement dans ce Fœtus la tête, & dans la tête une petite ouverture à l'endroit de la bouche; une petite éminence à la place du nés; & une petite ligne à chaque côté de la racine du nés. Ces 2 lignes étoient apparemment les ouvertures des paupières.

J'appêrçus encore à chaque côté du bas du tronc, une éminence qui étoit ronde & grosse comme la tête d'une moyenne épingle. J'observai enfin aux deux côtez du haut du même tronc une éminence ronde aussi, mais plus petite que les autres. Vraisemblablement ces petites éminences étoient les extrémités supérieures & inférieures de ce Fœtus. Voilà tout ce que j'y ai pu distinguer avec les yeux seuls, ou par le moyen d'une loupe.

~~~~~

# OBSERVATIONS SUR LES ANALYSES DES PLANTES.

Par M. HOMBERG.

\* **T**OUTES les Analyses des Plantes chimiques que nous avons fait jusques à présent pour connoître les corps des vegetaux ont été faites à peu près de la même maniere, savoir en séparant par le moyen du feu les principes qui composent ces mixtes. La principale différence qui s'observe dans cette séparation, est que les uns font fermenter le mixte avant que de le mettre au feu, & que les autres commencent l'analyse, sans que le mixte ait fermenté. Les principes qui proviennent de l'une & de l'autre de ces deux manieres consistent toujours en quelques portions des fels, d'huiles, d'eau & de terre.

L'on a douté par plusieurs raisons, si ce que nous appellons ici principes sont les veritables principes qui composoient le mixte avant son analyse, c'est-à-dire, si ces quatre matieres dans lesquelles un mixte est réduit par le feu, se trouvent veritablement dans le mixte lors qu'il est dans son état naturel.

La première raison d'en douter est que deux Plantes parfaitement differentes en goût, en odeur,

\* 18. Juin 1701.

odeur, en figure & en vertu, comme sont par exemple le *Solanum furiosum*, & le *Brassica capitata*, sont réduites par l'analyse en des principes si semblables en nombre & en qualité qu'on les prendroit pour une seule Plante analysée deux fois, cependant l'une est un poison, & l'autre est une Plante potagere.

La seconde raison pourquoi l'on s'est défié de ces principes, est que l'on ne sauroit composer le même mixte en rejoignant ensemble les principes en lesquels il a été réduit par l'analyse, quelque fermentation & quelque degré de feu qu'on leur donne.

Je passe les autres difficultez comme de peu de conséquence, mais celles-ci meritent quelque attention. Pour ce qui regarde la premiere raison, je dirai que nous ne saurions nier absolument que ces quatre matieres, savoir du sel, de l'eau, de l'huile & de la terre, n'entrent dans la composition d'un vegetal, puis qu'on les y trouve toujours de quelque maniere qu'on en fasse l'analyse; mais que le doute consiste seulement à savoir si elles sont de la même maniere dans les Plantes, comme le grand feu nous les donne dans leurs analyses, ou si le feu altere ces principes, & qu'il nous les fasse voir autrement qu'ils ne sont dans le mixte.

J'ai fait plusieurs essais pour m'éclaircir de ce doute, je n'en donnerai ici qu'un exemple pour marquer seulement de quelle maniere je m'y suis pris, puis nous en tirerons nos conséquences.

Le suc de raisins bien mûrs fraîchement exprimé mis dans un vaisseau & distillé, donnera d'abord une grande quantité de liqueur aqueuse

dont les premieres portions sont insipides, & les dernieres sont acides avec quelques marques de sel volatil urineux, puis en augmentant le feu il en viendra un peu d'huile fort puante; ce qui reste dans le vaisseau étant brûlé en cendres & lessivé, donne un sel lixiviel & laisse un peu de terre insipide.

Ce même suc de raisins fraîchement exprimé ayant été évaporé sur un très-petit feu jusques au tiers environ, & exposé dans un lieu frais, il s'y est cristallisé du sel essentiel un peu acide, & il a nagé sur la liqueur une matiere huileuse fort douce & agréable au goût. La liqueur qui restoit étoit un peu aigrelette à cause d'une portion de sel essentiel qu'elle contenoit.

Ce même suc de raisins ayant fermenté & étant devenu vin a donné dans la distillation un esprit ardent en assez grande quantité, ensuite beaucoup de liqueur purement aqueuse, puis la matiere restante dans l'alembic étant évaporée en consistance de miel épais, je l'ai retirée de dessus le feu, j'ai versé sur cette matiere le premier esprit de vin bien deslégué, lequel s'est chargé d'une huile rouge & d'odeur aromatique, il s'est précipité un peu de matiere terreuse, & il s'est cristallisé au fond un sel acide ressemblant au tartre.

Ces trois différentes analyses du même mixte nous donnent bien les mêmes principes, mais fort alterez par le grand feu dans la premiere analyse; & par la fermentation dans la troisiéme analyse, ceux de la seconde analyse, n'ayant souffert ni le grand feu, ni la fermentation, sont le moins changez de l'état naturel qu'ils avoient dans la Plante, nous y trou-



trouvons la douceur de ce fruit dans la matiere huileuse qui surpasse la cristallisation, son goût piquant dans le sel un peu aigrelet qui s'y est cristallisé, & sa fluidité dans la quantité de flegme aqueux qui en a été évaporé, la matiere terreuse est restée mêlée dans l'huile & dans le sel, qui ne sauroit en être séparée que par le grand feu, comme il est arrivé dans la premiere analyse, où nous observons les mêmes choses sur le sel de cette Plante, que ce que nous observons dans les fortes distillations des sels fossiles, comme sont le salpêtre, le vitriol, &c. lesquels nous connoissons parfaitement être sels volatils acides mêlez d'une quantité proportionnée de sel fixe & de terre insipide qui leur servent de matrice. Mais comme les sels des Plantes sont plus composés que ne sont les sels fossiles nous trouvons le sel de notre Plante divisé en trois parties dont la premiere est le sel acide qui a passé par le bec de la cornue avec les dernieres portions du flegme, la seconde est le sel volatil urinaire qui passe en partie avec les dernieres gouttes de l'acide en partie seul, & en partie avec les huiles foetides; & la troisieme partie est le sel fixe qui se sépare de sa terre par la lixiviation; ces trois sortes de sels étant joints naturellement ensemble dans la Plante, composent le sel essentiel de la Plante que nous avons vu cristalliser dans la seconde & dans la troisieme analyse.

L'huile de notre fruit qui est douce & d'une odeur aromatique dans la seconde & dans la troisieme analyse, se trouve considérablement changée dans la premiere analyse en une huile fort âcre & puante apparemment à cause

d'une portion du sel urineux & du sel acide de la même Plante, que la violence du feu a enlevé en même temps & mêlé avec cette huile, laquelle ayant passé par le bec de la Cornue, est devenuë volatile, au lieu que celles des autres deux analyses ne le sont pas; & comme la fermentation dégage naturellement les matieres volatiles d'avec les fixes, nous trouvons dans la troisiéme analyse beaucoup d'esprit ardent qui est la partie la plus volatile de l'huile de notre fruit, qui s'en est séparé par la moindre chaleur.

Nous voyons par la comparaison que nous avons fait des principes qu'un même mixte a donné en trois différentes analyses, qu'ils s'y sont toujours trouvez en même nombre, mais differens seulement en degrez de volatilité & de fixité, selon la fermentation & selon les degrez de feu que ces mixtes ont souffert dans leurs analyses, à quoi si on ajoute les combinaisons infinies du plus ou du moins de ces principes dont la difference nous peut paroître insensible dans les analyses, nous ne serons pas étonnez de voir deux Plantes si différentes en goût, en odeur & en vertus, & si semblables dans leurs principes.

Par ces mêmes raisons il nous sera facile aussi de comprendre pourquoi l'on ne sauroit recomposer un mixte en rejoignant ensemble les principes dans lesquels il a été réduit par l'analyse, parce que le feu ayant changé leur arrangement naturel & leurs degrez de volatilité & de fixité, & même en ayant dissipé sans qu'il soit possible d'empêcher cette perte, ces principes étant rejoints ensemble ne se trouvent plus ni dans la même quantité, ni dans  
la

la même qualité, ni dans le même arrangement qu'ils étoient dans le mixte avant l'analyse.

Pour m'assurer davantage de cette vérité, j'ai mêlé des principes fort simples pour en composer certains corps dont j'ai fait ensuite les analyses qui m'ont rendu les principes tout-à-fait changez. Par exemple, le sel fixe lixiviel des Plantes & l'huile exprimée aussi des Plantes mêlez au feu composent du savon, lequel parmi les autres principes dans son analyse, rend une liqueur acide, de la terre insipide & du sel urineux qui ne paroissent pas dans les ingrediens dont il est composé.

Le mélange d'un acide mineral & d'une huile essentielle de quelque Plante aromatique composé une resine parfaitement semblable à celles qui découlent de certains Arbres; dans cette composition il n'entre que deux matières fort volatiles toutes deux, cependant quand on en fait l'analyse, on y trouve tous les quatre principes, il est vrai que dans le mélange de ces deux matières il se fait une fermentation si prompte & si violente que très-souvent elles s'enflament, & comme nous savons que dans les fermentations il se fait toujours naturellement une séparation des parties volatiles d'avec les fixes on n'a pas eu beaucoup de peine à les mettre en évidence dans l'analyse, quoiqu'elles ne parussent pas telles avant la fermentation.

Toutes ces considérations & remarques semblent nous montrer que les analyses où l'on emploie seulement le grand feu ne sont pas si propres pour découvrir les vrais principes & les vertus d'une Plante que lorsque par

154 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
une petite chaleur, & par la fermentation on  
aide la séparation naturelle des principes qui  
composent ces simples.

~~~~~

## CONSTRUCTION

*Et usage d'un nouveau Réticule pour les ob-  
servations des Eclipses du Soleil & de la  
Lune, & pour servir de Micrometre.*

Par M. DE LA HIRE.

\* **L**n'y a point de maniere plus simple ni  
plus commode pour observer la quantité  
& les doits des Eclipses de Soleil & de Lu-  
ne, que d'appliquer un réticule au foyer d'u-  
ne Lunette d'approche & d'observer directe-  
ment l'image du Soleil ou de la Lune sur ce  
réticule qui montre exactement en doits & en  
minutes de doits la grandeur de l'Eclipse au  
temps de l'observation.

On fait ordinairement ce réticule de 13 fi-  
lets de ver à foye: très-déliés qu'on attache  
avec un peu de cire mole sur une platine de  
cuivre, laquelle doit être placée dans la Lu-  
nette, au foyer du verre objectif.

Ces filets doivent être paralleles entr'eux &  
également éloignez les uns des autres. Il faut  
que la distance entre les filets extrêmes soit  
telle qu'elle puisse contenir exactement le dia-  
mètre du Soleil ou de la Lune, qu'on veut  
observer, afin que les 12 divisions entre les  
filets,

\* 26. Juillet 1704.

filets, vaillent chacune un doigt pour la mesure de l'Eclipse.

On peut aussi mettre 13 autres filets semblables & à même distance les uns des autres que les premiers & qui les coupent à angles droits pour faire le reticule parfait, & pour pouvoir observer plus commodément la grandeur des Phases de l'Eclipse: mais un seul filet qui passera au milieu des autres, suffira pour faire connoître si l'on ne place pas les filets obliquement à la partie lumineuse de l'astre, & si l'on en prend bien la mesure dans la partie la plus grande du disque illuminé.

On fait aussi quelquefois un réticule circulaire, qui est formé par 6 cercles concentriques dont l'exterieur doit contenir exactement l'image du Soleil au foyer du verre objectif d'une Lunette de 40 ou 60 pieds ou plus. Ces six cercles qui sont à distances égales les uns des autres avec le centre, divisent le diamètre du Soleil en 12 doigts égaux. On trace ces cercles sur un papier très-fin qu'on peut encore huiler pour rendre l'image du Soleil plus sensible, lorsque le papier est placé au foyer de la Lunette. On applique ce réticule à une grande Lunette pour pouvoir distinguer plus nettement la partie du Soleil qui reste éclairée; on ne se sert point alors de verre oculaire, & il n'est pas nécessaire que le lieu où est la Lunette soit fermé pour empêcher la lumière d'y entrer. Cette maniere de réticule ne peut être commode tout au plus que pour les Eclipses de Soleil, car pour celles de Lune, sa lumière n'est pas assez forte pour faire une image bien sensible au foyer du verre objectif.

Ces manières différentes de réticules & le Micrometre même dont on peut se servir pour la grandeur des Eclipses, ont de grandes incommoditez. Car sans parler des filets de ver à soie qui sont sujets à se relâcher par l'humidité & à se rompre, on ne peut rencontrer que très-rarement que le réticule qu'on a tout fait, puisse convenir au diametre du Soleil ou de la Lune qu'on veut observer; c'est pourquoi on est obligé d'en faire un nouveau pour toutes les Eclipses différentes, & encore ce réticule ne peut servir exactement dans les Eclipses de Lune, dont le diametre apparent augmente à mesure que la Lune s'élève sur l'horison.

Pour remedier à toutes ces difficultez, j'ai imaginé une autre sorte de réticule qui est à peu près semblable au dernier que je viens de décrire, mais qui est d'un usage bien plus avantageux que tous les autres pour toutes les Eclipses, tant parce qu'il peut servir également pour le Soleil & pour la Lune, & qu'il n'est pas necessaire de l'appliquer à une grande Lunette, que parce qu'il s'accommode à tous les differens diametres du Soleil & de la Lune, même en différentes hauteurs, & de plus parce qu'il ne peut être gâté ni alteré par aucun accident de l'air & qu'il peut durer toujours & être transporté facilement par tout où l'on voudra.

Je choisis premièrement pour cet effet un morceau de glace de miroir assez mince, bien polie & plane ou à très-peu près, ce qui n'importe pas, & sur l'une des surfaces de cette glace je décrivis legerement avec la pointe très-fine d'un diamant six cercles concentriques, qui

qui avec leur centre, divisent le diametre du cercle extérieur en 12 parties égales, qui sont les 12 doigts du Soleil ou de la Lune, pour l'usage des Eclipses. La grandeur du cercle extérieur de ce nouveau réticule sera déterminée, par ce que je vais expliquer ensuite. On remarquera seulement qu'il ne faut qu'effleurer légèrement la superficie polie de la glace avec la pointe du diamant.

Secondement je prens deux verres objectifs de Lunette d'approche de même foyer ou à peu près, ce qui n'importe pas, lesquels étant joints ensemble auront leur foyer commun de la longueur à peu près de la Lunette qui doit servir au réticule. Ensuite je mesure exactement le foyer de ces deux verres ensemble lorsqu'ils sont appliquez l'un sur l'autre, ce qui est facile à faire, car si on les applique ainsi au bout d'un tuyau & regardant quelque objet fort éloigné avec un verre oculaire convexe, placé à l'autre bout du tuyau, lorsqu'on verra cet objet distinctement, si l'on ôte la longueur du foyer du verre oculaire convexe de toute la distance entre le milieu de l'épaisseur de ce verre oculaire & entre les deux verres objectifs qui se touchent, le reste sera la longueur du foyer absolu de ces deux objectifs ensemble. Il faut remarquer que cette expérience pour déterminer le foyer des deux objectifs ensemble, n'est bonne qu'à ceux qui ont la vûe que j'appelle parfaite & qui est telle qu'ils puissent voir distinctement les objets éloignez, & à une mediocre distance: car ceux qui sont ou Myopes ou par trop Presbytes, en sorte qu'ils ne sauroient pas voir distinctement les objets éloignez, ils doivent

mettre au devant de l'œil un verre concave ou convexe pour rendre leur vûe parfaite, avant que de regarder dans la Lunette, l'objet qui doit déterminer la longueur du foyer des deux objectifs ensemble.

Ensuite on fera cette regle comme le rayon est à la Tangente de  $17.15''$ . Ainsi la longueur du foyer des deux objectifs ensemble à un quatrième terme, qui sera le demi-diametre du cercle extérieur du réticule, ce qu'il falloit premierement trouver.


Ce cercle du réticule est un peu plus grand qu'il ne faut pour le diametre de la Lune dans son Perigée, & lors qu'elle est au Zenith, qui est le lieu où ce diametre peut paroître le plus grand: mais comme on doit faire servir ce réticule pour tous les diametres de la Lune, lequel servira aussi pour ceux du Soleil qui sont entre les extrêmes de la Lune, il suffira d'expliquer l'operation pour ceux de la Lune.

Maintenant on écartera un peu les deux objectifs l'un de l'autre comme de 3 pouces, si ces deux objectifs sont à peu près de 16 pieds de foyer chacun, & l'on cherchera leur foyer commun de la même manière que nous avons fait quand ces deux objectifs étoient joints ensemble; ce foyer sera toujours la place où l'on doit poser le réticule. On fera de suite la même operation en éloignant toujours les deux objectifs de 3 pouces de plus que dans la précédente, ce qu'il faudra faire jusqu'à la distance que je déterminerai ensuite.

Je dis maintenant que la peinture ou l'image du même objet éloigné dans les differens éloignemens des deux verres objectifs, augmentera de grandeur au foyer des deux verres



à proportion que les deux verres seront plus éloignés l'un de l'autre, & cela jusqu'à un certain terme, mais ce qui n'est pas nécessaire pour nôtre dessein. Voici la démonstration de cette proposition.



Premièrement soit la lentille  $P$  dont le foyer est à la distance  $PF$ , & soit le rayon principal  $AP$  venant d'un point  $A$  qui soit fort éloigné, lequel passant par le centre du verre  $P$  continue sensiblement son chemin selon la même ligne droite par laquelle il a rencontré le verre jusqu'au point  $f$  où se fait l'image de l'objet  $A$ , car tous les rayons venant du point  $A$  après s'être rompus dans le verre s'assemblent au point  $f$ .


Maintenant soit une autre lentille  $V$  placée à la distance  $PV$  de la première  $P$ , & laquelle ait son foyer absolu à la distance  $VC$ .

Il est évident par la Dioptrique qu'entre tous les rayons qui étant venus du point  $A$ , ont passé au travers de la lentille  $P$  pour concourir au point  $f$ , le rayon  $fV$  qui passe par le centre du verre  $V$ , devient le principal de cette ordonnance de Rayons, & par conséquent la peinture ou l'image de l'objet  $A$  se fera dans la ligne  $Vf$ , après que ces Rayons auront passé au travers des deux verres  $P$  &  $V$ .

Mais aussi par les regles de la Dioptrique, on peut déterminer le foyer  $\Phi$  de ces rayons, en faisant comme la somme des foyers absolus  $FP$ ,  $CV$  des deux lentilles moins la distance  $PV$  entre les centres des lentilles, ce qui soit  $FK$ , est à la longueur  $FV$  qui est celle du foyer  $F$  du verre  $P$ , moins  $PV$  distance entre les lentilles, ainsi ce même terme  $FV$  à un troisième continuellement proportionel  $F\Phi$ , ce qui détermine la distance du foyer  $\Phi$  que l'on cherche.

Mais si les deux verres  $P$  &  $V$  étoient joints, l'un contre l'autre, on trouveroit la place de leur foyer commun  $X$  par la même règle; car supposant que les deux verres ne fassent que comme un seul verre  $P$ , on fera comme  $fR$  qui est la somme des foyers des deux verres, est à  $FP$ ; ainsi  $FP$  à  $FX$ ; & alors la peinture de l'objet  $A$  sera sur le rayon principal  $APf$  au point  $B$  à très-peu près à la distance  $PB$  égale à  $PX$ .

Puisque l'on a posé  $VK$  égale à  $VC$  &  $PR$  aussi égale à  $VC$ , il s'ensuit que  $KR$  est égale à  $VP$ . Si l'on prend donc sur  $Ff$  dans cette figure qui doit être jointe à la précédente, la grandeur  $Fp$ , égale à  $FP$  &  $Fv$  égale à  $FV$ , & qu'on mène  $Rp$  &  $Kv$ , il est évident que ces



ces deux lignes doivent concourir vers  $RK$  dans tous les cas de différentes longueurs des foyers des deux verres  $P$  &  $V$ , puisque  $FR$  &  $Fk$  seront toujours plus grandes que  $FP$  &  $FV$  ou leurs égales  $Fp$  &  $Fv$  de la longueur  $VC$  du foyer du verre  $V$ , & les grandeurs  $pv$  &  $RK$  étant posées égales. C'est pourquoi si l'on mène  $px$  perpendiculaire à  $Rp$  &  $vt$  perpen-

pendiculaire à  $Kv$  & enfin  $vd$  parallele à  $px$ , il s'ensuit que  $Ft$  sera plus petite que  $Fd$ .

Mais par cette construction on a  $Fx$  égale à  $FX$  &  $Ft$  égale à  $F\phi$  ou  $IE$ , & enfin  $Fd$  égale à  $ID$ ; car  $FP$  est à  $FV$  comme  $IB$  est à  $ID$  ou comme  $Fx$  est à  $Fd$ : C'est pourquoi  $IE$  sera toujours plus petite que  $ID$ , & par conséquent  $\phi E$  rencontrera toujours  $Vf$  au dessous du point  $D$ , &  $\phi G$  sera plus grande que  $XB$ : donc l'image du même objet paroîtra plus grande quand les verres seront éloignez l'un de l'autre, que quand ils seront joints; & plus les verres seront éloignez l'un de l'autre jusqu'au terme où le verre  $V$  sera placé en  $F$ , l'image sera d'autant plus grande, puis-que les lignes comme  $vK$ ,  $vK$  concourront toujours vers  $K$ , ce qui fera aussi les  $Ft$  d'autant plus petites que les  $Fd$ .

C'est pourquoi lorsque le diamètre de l'Astre sera plus petit que  $34' 30''$ , comme nous l'avons supposé d'abord, si l'on éloigne les deux objectifs l'un de l'autre, & qu'on place le réticule à leur foyer commun, on trouvera le point où le réticule comprendra exactement le diamètre de l'Astre.

Si l'on veut éviter la peine de tâtonner en cherchant la distance des deux lentilles objectives pour faire que le réticule comprenne exactement le diamètre de l'Astre à leur foyer commun; on pourra marquer sur le tuyau de la Lunette, la place de chaque objectif & du réticule pour l'angle que doit contenir ce réticule au foyer: ainsi en sachant le diamètre de l'Astre, on trouvera d'abord la place des verres & du réticule. On pourra faire ces divisions plus commodément par la Regle suivante que par l'expérience. On

On a déjà la place du foyer des deux verres ensemble pour le demi diamètre du plus grand cercle du réticule de  $17' 15''$ ; si l'on éloigne donc les deux verres objectifs de 3 pouces l'un de l'autre, on trouvera de la même manière qu'on a fait ci-devant.

## R E G L E.

Comme la somme des foyers absolus des deux verres moins leur distance, ce qui est  $FK$

est à la longueur du foyer du verre extérieur moins la même distance des deux verres, ce qui est  $FV$ ,

ainsi ce même terme  $FV$

à un quatrième  $F\phi$ , lequel étant ôté de la longueur du foyer absolu du verre extérieur, il restera la distance de ce verre extérieur au foyer commun que l'on cherche. Toutes les mesures que l'on prend sont toujours par rapport au milieu de l'épaisseur des verres.

Mais maintenant si l'on fait

## R E G L E.

Comme la longueur du foyer trouvé depuis le verre intérieur est

au demi-diamètre du cercle extérieur du Réticule;

ainsi le Rayon ou Sinus total sera

à la Tangente de l'angle que comprendra le demi-diamètre du Réticule au foyer, qui sera plus petit que  $17' 15''$  suivant ce que j'ai démontré ci-devant.

On

On écrira ensuite sur le tuyau à l'endroit de chacun des verres objectifs & de leur foyer commun, ou de la place où doit être posé le Réticule, le nombre des minutes & secondes qu'on aura trouvé que doit contenir le cercle extérieur du réticule. On continuera de suite pour les différentes distances des deux verres objectifs, jusqu'à ce qu'on trouve un angle compris par le demi-diamètre du grand cercle du réticule, moindre que  $29^{\circ} 30''$ , qui est le moindre de ceux dont on a besoin pour le Soleil & pour la Lune.

Toutes ces divisions étant marquées sur le tuyau de la Lunette, on pourra les partager ensuite par parties proportionnelles en minutes & secondes, afin que lorsqu'on voudra observer une Eclipsé, le diamètre de l'Astre étant connu, on puisse d'abord tirer les tuyaux & placer les verres & le réticule dans la distance qui leur convient pour faire que l'Astre soit compris exactement dans le plus grand cercle du réticule.

Il est facile à voir par ce que je viens de dire, que le tuyau de la Lunette dont on doit se servir, doit être construit de telle manière que chaque verre objectif soit arrêté dans un tuyau particulier, en sorte que celui qui porte le verre le plus éloigné puisse entrer dans l'autre, & celui-ci dans le corps de la Lunette. Ainsi on pourra faire des marques sur ces tuyaux qui porteront le nombre des minutes & secondes que contient le réticule pour les différentes places des verres lorsque les tuyaux seront enfoncés jusqu'à ces marques. Il faudra aussi que le tuyau qui portera le réticule puisse entrer dans le corps de la Lunette à l'au-

l'autre extrémité pour y faire des marques correspondantes à celles des tuyaux des objectifs avec les mêmes nombres des minutes & secondes pour les mettre tous trois ensemble dans leur point. Je ne dis rien du verre oculaire que l'on place dans un petit tuyau particulier à la distance du réticule, laquelle convient à la force ou à la foiblesse de la vûe de l'Observateur.

On pourroit encore par la Regle suivante trouver d'abord la place des objectifs & du réticule de 20 en 20 secondes de diminution depuis l'endroit où les objectifs étant joints ensemble, ont déterminé dans leur foyer commun, la grandeur du réticule, pour y contenir 17' 20", au lieu de 17' 15" comme ci-devant.

## R E G L E.

Comme la Tangente de l'angle proposé moindre que 17' 20" est  
au Rayon ou Sinus total.

Ainsi le demi-diametre du cercle extérieur du réticule est

à la distance  $V\Phi$  dans la figure précédente, qui est celle qu'on cherche depuis la lentille ou l'objectif intérieur  $V$ , jusqu'au foyer  $\Phi$  commun des deux objectifs.

Mais pour déterminer la distance de ces objectifs, le foyer de chacun  $PF$  &  $VC$  étant donné, on fera

## R E G L E.

Comme  $C\Phi$ , qui est la longueur du foyer de l'objectif intérieur, moins  $V\Phi$  qu'on a trou-

trouvé par la Regle précédente, est à la longueur  $VC$  du foyer de l'objectif interieur.


Ainsi  $V\Phi$  trouvée ci-devant, sera à  $FV$  quatrième terme, lequel étant ôté de la longueur  $PF$  du foyer de l'objectif extérieur, il restera la distance  $PV$  entre les deux objectifs. Ainsi on aura les trois lieux  $P$ ,  $V$ ,  $\Phi$  pour la place des deux objectifs & du réticule, par ce qui est donné & proposé.

La démonstration de ces Regles sera facile à trouver par les deux Regles qui ont été données d'abord; car la premiere Regle de cette méthode est l'inverse de la seconde de la premiere méthode, & pour la seconde de cette méthode, on viendra à trouver par les termes qui y sont posez, les termes de la premiere Regle de la premiere méthode, qui sont  $FK$  à  $FV$ , comme  $FV$  à  $F\Phi$ , en faisant une division & une composition de raisons, ce qui ne mérite pas d'être rapporté plus au long.

Ce réticule peut avoir de grands usages dans l'Astronomie, outre celui que nous avons proposé d'abord qui est l'observation des Eclipses de Soleil & de Lune, puisqu'on peut s'en servir au lieu de Micromètre pour déterminer les diametres du Soleil, de la Lune & de toutes les Planetes & les petites distances entre les Astres; & enfin la place des Taches du Soleil, & de Venus & de Mercure sur son disque. Car pour les diametres du Soleil & de la Lune, il ne faut que chercher les places des deux objectifs & du réticule, lesquels portent un même nombre de minutes & de secondes, tant que le cercle extérieur du réticule comprenne exactement le diametre de l'Astre,



l'Astre, ce qui sera facile à faire en les changeant peut-être deux ou trois fois tout au plus. Mais pour des distances beaucoup plus petites que les diametres des luminaires, on pourra placer les objectifs & le réticule aux places qui marquent 30' exactement, afin que la distance des cercles du réticule contienne 2' 30", & comme il est assez facile à la vûe d'estimer la cinquième partie, le quart ou le tiers d'une petite distance, on pourra mesurer des espaces avec beaucoup de justesse.



Si l'on trouvoit trop de difficulté à tracer avec la pointe du diamant des cercles sur le verre, on pourra y faire seulement treize lignes paralleles entr'elles, ce qui sera même plus commode que le réticule circulaire pour observer le diametre des Planetes, en faisant marcher les Astres sur l'une des paralleles, ce qui se peut faire facilement en inclinant & tournant la Lunette tant que les lignes du réticule se trouvent paralleles à la touchante du cer-

cercle que décrit l'Astre dans l'endroit où il est. Il sera à propos de tracer aussi une ou plusieurs lignes perpendiculaires à ces parallèles & dans des distances proportionnées à celles des parallèles pour servir à se conduire dans l'estime, & pour trouver aussi d'autres distances que celles des parallèles, comme si ces secondes distances contenoient la moitié des autres, ou les quatre cinquièmes pour avoir deux minutes exactement, lorsque les verres & le réticule seront posez sur la marque de 30'.

Après avoir composé ce Memoire, j'ai trouvé dans l'Histoire de l'Academie que M. *Roemer* y avoit autrefois proposé une maniere de mesurer le diametre des Astres par le moyen d'un réticule fait de filets de ver à soie, lequel étoit placé à l'extrémité d'une Lunette qui avoit deux objectifs qui pouvoient changer de place.

Mais je ne sais point que personne ait encore rien proposé de la maniere de construire le réticule sur le verre, dont les lignes peuvent être plus déliées que les filets de ver à soie, lesquelles n'ont aucune des incommoditez de ces filets qui donnent beaucoup d'exercice à ceux qui s'en servent ordinairement, comme le relâchement par l'humidité de l'air, la trop grande tension par la chaleur & le frissement qui survient ensuite, & enfin les petits Insectes & les Araignées qui y tendent leurs fils, & les détournent de leur premiere & véritable position. Et si le verre est arrêté ferme au foyer de la Lunette, on est assuré que ce réticule ne sera pas sujet à plus de changemens que tout l'assemblage du quart de cercle, ce qui

qui est d'une très-grande commodité pour les Observateurs.

Voici comment on peut tracer commodément les lignes sur le verre. On attache à l'extrémité d'une des jambes d'un compas, une petite virole dans laquelle on a ferti une pointe de diamant propre pour tracer ces lignes. Ce compas doit être ouvert & fermé par le moyen d'une vis garnie de son écrou à oreille, & lorsque le compas sera ouvert de la quantité du demi-diametre qu'on aura déterminé, on le refermera en comptant exactement le nombre des révolutions de l'écrou. Ce nombre étant divisé par celui des intervalles dont on veut se servir pour le réticule, on aura le nombre des revolutions de l'écrou qui conviennent à chaque intervalle: c'est pourquoy en fermant le compas par le moyen de cet écrou, on aura tous les demi-diametres des cercles du réticule.

On doit observer qu'il faut arrêter la pointe du compas qui est au centre, dans un petit trou d'une platine de fer très-mince, laquelle on attache sur le verre avec un mastic solide, en sorte qu'elle reste immobile dans l'opération.

Pour ce qui est des lignes paralleles, on les tracera avec une regle double propre à faire des paralleles, dont l'une doit être arrêtée ferme, & l'autre doit être avancée par le moyen d'une vis qu'on fera mouvoir un nombre égal de revolutions pour chaque intervalle.

Dans les quarts de cercle ordinaires à la place des filets qui tiennent lieu de pinnule oculaire, on y pourra mettre un verre avec

deux lignes qui se couperont à angles droits, dont on retirera autant d'avantage que des filets de ver à soie, sans en avoir aucune des incommoditez, & qui pourront durer dans le même état autant que tout l'instrument.

On peut aussi se servir de ce verre avec un seul trait pour appliquer à l'extrémité de la Regle d'un quart de cercle dont on observe les angles, en appliquant contre le limbe du quart de cercle, la surface du verre où la ligne est tracée, ce qui ne sera pas sujet aux accidens qui peuvent arriver à la lame de corne que je proposai à l'Academie il y a quelque temps, au lieu du cheveu qu'on y met ordinairement.

Voici encore une autre sorte de filets dont on pourroit se servir fort commodément & fort utilement au lieu des filets de ver à soie qu'on met au foyer des verres de la Lunette & qui servent de pinnule oculaire dans les instrumens pour observer des angles ou des hauteurs. Ces filets sont de verre & sont tirez aux Verreries du creuset qui est dans le fourneau, on s'en sert ordinairement pour faire des aigrettes. La manière dont on les tire est assez curieuse pour la rapporter ici.

On prend dans le creuset qui est dans le four avec le bout de la verge de fer dont on se sert ordinairement un peu de verre, qu'on attache promptement à un grand devidoir, tel que celui dont on se sert pour diviser le fil ou la soie. Et comme en tirant ce verre du creuset, il suit un filet très-délié qui tient par un bout au verre qui est attaché sur le devidoir, & par l'autre au verre fondu qui est dans le creuset, on tourne aussi-tôt le devidoir

avec

avec une très-grande vitesse, & ce filet tire après lui du creuset autant de matiere qu'il est necessaire pour lui fournir continuellement, en sorte qu'on pourroit tirer tout le verre du creuset en un filet beaucoup plus délié que des cheveux. Il se refroidit à mesure qu'il se devide, & il ne s'attache point à celui qui est déjà devidé. Il y a quelques endroits qui sont un peu plus déliez que d'autres, ce qui vient de la differente vitesse avec laquelle on tourne le devidoir : car si l'on tourne très-vite, la matiere n'a pas le temps de se refroidir avant que de s'allonger ou de s'étendre autant qu'elle en est capable.

Quand on en a devidé la quantité qu'on en veut avoir, on coupe l'écheveau sur le devidoir, & il reste un gros paquet de filets qui sont fort droits, & qui ont un très-grand ressort par rapport à leur grosseur, comme c'est la nature du verre. Ils sont droits & non pas courbez à cause qu'ils se sont refroidis à l'air avant que de se tourner sur le devidoir.

On peut choisir les plus déliez de ces filets pour les appliquer au foyer des verres des Lunettes d'approche au lieu des filets de ver à soie, qu'on y met ordinairement. Ils ont un grand avantage par dessus les filets de ver à soie, en ce qu'ils sont droits & fermes de leur nature, & que les filets de ver à soie sont toujours frisez, & qu'il les faut tendre en les attachant avec un peu de cire mole. Ils ne sont point aussi sujets à s'alterer aux changemens d'air comme à la chaleur, au sec & à l'humidité comme les filets de ver à soie, qui en se raccourcissant à l'air sec & chaud, coulent dans la cire qui les tient attachez,

mais l'air devenant ensuite un peu humide, ils se frisent & sont entièrement inutiles pour les opérations auxquelles on s'en sert, de sorte qu'on est obligé d'y en remettre d'autres, ce qui est fort incommode, sur tout si l'on fait des observations à la campagne, où ces accidens arrivent assez souvent.

Si le verre dont on fait ces filets étoit d'une couleur brune quelle qu'elle soit; ils seroient plus commodes que lorsqu'ils sont faits d'une matière blanche. Cependant quoiqu'ils soient blancs ou transparens de leur nature ils ne laissent pas de paroître fort bien au foyer des Lunettes.

On pourroit aussi appliquer ces filets de verre à la Règle des quarts de cercles, au lieu des cheveux qu'on y met ordinairement, & ils ne seroient pas sujets à tous les accidens des cheveux qui sont d'une nature de corne, qui s'allongent à l'humidité & se retirent au sec en se tourmentant & se tortillant.

~~~~~

## R E M A R Q U E S .

*Sur la nature de la Gomme gutte & ses différentes Analyses.*

Par M. B O U L D U C .

\* C E U X qui ont écrit de cette gomme lui ont donné différens noms; ils l'ont appelée Gomme; eu égard à sa substance, & Gutte

\* 30. Juillet 1701.

Gutte à cause de sa prétendue vertu spécifique pour la goutte, *Gummi ad podagram* (dit *Morhardus*) à cause de sa couleur jaune, *Chrysopum*; du lieu d'où on nous l'apporte, *gummi de Goa*, *gummi de Peru purgans*, & en général & par excellence, *Succus Indicus purgans*, & enfin *Scammonium Orientale*.

L'on convient assez d'où nous vient cette gomme, mais non pas aisément de quelle Plante elle découle, si c'est d'un Arbre, arbrisseau, ou si c'est le suc laiteux épaissi d'une herbe; *M. Richer* dans son Voyage en l'Isle de *Cayenne*, ainsi que je l'ai vû dans les Memoires de l'Academie de l'année 1677. dit avoir trouvé en l'*Amerique* des cantons de Forêts entieres, où il n'y a d'autres arbres que de ceux qui produisent cette gomme, qu'ils sont aussi grands que nos chênes, dont les feuilles sont grandes & pointues à peu près comme celles du Laurier, mais plus grandes, & autres particularitez où l'on peut avoir recours.

Quelques-uns ont prétendu que c'étoit une larme qui découloit de l'Arbre qui produit le Pignon d'Inde, d'où ils l'ont nommé, *Lachryma Ricini Indici*; d'autres que c'étoit un suc épaissi, composé d'une espece de Thitimal & de Scammonée, & veritablement *Bontius de Medicina Indorum*, dit que cette larme découle d'une espece de Thitimal qui croît dans une Province de la *Chine* appelée *Candoia*.

L'on peut mettre cette gomme au rang des sucs résineux puisqu'elle s'enflamme, qu'elle se fond par elle-même à la chaleur, qu'elle se dissout dans l'esprit de vin, & qu'au contraire dans les dissolvans aqueux, elle ne fait que

s'étendre comme la Scammonée en liqueur laiteuse, qui par la suite & après un certain temps fait résidence, & alors c'est plutôt ce que nous appellons : *Molecularium segregatio* que *dissolutio*.

Les Peintres ont connu ce suc résineux bien du temps avant nous, il semble d'abord insipide sur la langue, mais bien-tôt après il se fait sentir au gozier par son acrimonie & par sa seicheresse insupportables.

Il est un très-puissant purgatif hydragogue & émetique dont on ne doit se servir qu'avec grande précaution & qu'après en avoir bien corrigé la malignité & reprimé la violence.

Je l'ai distillée par la Cornue de deux manières, seule & avec la Chaux éteinte à l'air par portions égales.

De la première, c'est-à-dire seule, j'en ai d'abord tiré un esprit acide, ensuite un esprit urineux, ce qui m'a paru tel par les épreuves que j'en ai faites sur les essais ordinaires, beaucoup d'une huile fétide, & seulement 36. grains de sel fixe de la matière noire qui étoit restée dans la Cornue après la distillation de seize onces de gomme que j'y avois mis.

Il ne m'a point paru dans le balon de sel volatil concret.

Et de la seconde, c'est-à-dire avec parties égales de gomme & de chaux, les premiers & derniers esprits n'ont été que peu ou point acides, & au contraire tout urineux.

Je comptois bien que la chaux comme un puissant Alkali, dégageroit de ce mixte les principes acides d'avec les volatils en retenant les acides, mais j'espérois par-là d'en tirer un sel volatil concret, peut-être que c'est pour  
n'en



n'en avoir pas distillé une assez grande quantité que je n'y ai pas réussi, je tenterai encore une fois cette operation.

J'avois crû encore de pouvoir tirer de ce suc resineux, des fleurs ainsi que du Benjoin, je l'ai tenté, mais inutilement.

Je l'ai dissout avec trois differens dissolvans, l'esprit de vin, la lessive des sels Alkali, & l'eau; il m'a paru qu'avec l'esprit de vin, cette gomme ne se dissout pas totalement, pour pure qu'elle soit, & qu'il en reste près d'une sixième partie sur laquelle il ne peut mordre; cette partie restante, qu'on peut penser être les principes salins de ce mixte, s'est parfaitement dissoute avec la resolution de sel de tartre, aussi ce mélange ne purge que peu ou point, mais pousse considerablement par les urines, au lieu que la resine que j'ai faite de ce qu'avoit dissout l'esprit de vin, purge encore plus violemment & avec plus d'irritation que la gomme gutte, quoique très-violente d'elle-même.

Cette gomme se dissout entierement avec partie égale de sel de tartre & suffisante quantité d'eau bouillante à quelques terrestres près, qui n'ont rien de la gomme, après quelques heures de digestion à chaleur lente, ce mélange devient comme une colle unie, semblable à une resine de Scammonée nouvellement précipitée, qu'on réduit aisément en une liqueur très-claire & très-rouge en y ajoutant beaucoup d'eau & par un feu de digestion.

Cette liqueur filtrée & évaporée jusqu'à siccité à feu très-lent, donne une maniere de sel gris, qui s'humecte aisément, si l'on n'a soin

de le conserver dans une fiole bien sèche & bien bouchée.

Cet extrait salin purge avec moins d'irritation & en moindre dose que la gomme gutte, il cause au gozier un grand feu & une grande acrimonie, c'est pourquoi on doit toujours l'envelopper quand on en veut faire usage.

J'ai déjà dit que l'eau ne dissolvoit point la gomme gutte, qu'elle n'en faisoit qu'étendre les parties & les suspendre pour quelque temps, aussi de quelque maniere que j'y aie procédé, je n'en ai tiré qu'une liqueur jaune laiteuse qui a déposé à l'ordinaire & l'eau en est devenu claire au bout de quelque temps.

Cette residence desséchée ne differe de la gomme gutte ordinaire qu'en ce qu'elle est plus pure, d'autant que par cette petite préparation on en a séparé les parties terrestres.

J'ai jetté sur cette liqueur laiteuse du vin-aigre distillé, de l'esprit de vitriol, & de l'esprit de vin séparément.

Le vin-aigre distillé a rendu la liqueur plus claire & plus fluide, l'esprit de vitriol au contraire l'a rendue plus épaisse, & l'esprit de vin s'en est approprié la couleur dorée.

Tous ceux qui ont connu la nature de la gomme gutte, sa violence & sa malignité ont prétendu nous donner plusieurs & differens moyens de la corriger & d'en reprimer la violence, soit par sa dissolution avec les esprits ardens ou avec les esprits acides des minéraux, soit par le mélange des huiles essentielles des Aromates, & enfin par les sels Alkalis: De toutes ces préparations, j'ai remarqué que celles qui se font avec les esprits acides des minéraux, & avec les sels Alkalis, étoient les meilleures.

En

En voici une différente de toutes celles-là que j'ai toujours pratiqué, & dont je me suis très-bien trouvé.

Il faut renfermer dans un nouet de toile elaire, la gomme gutte & le nouet dans un pain chaud sortant du four, qu'il faut pour cet effet ouvrir de plat & bien rejoindre avec des cordes, mettre le pain pendant 24 heures en lieu qu'il ne se refroidisse pas sitôt, au bout desquelles on remettra en poudre la gomme gutte, on en fera un nouveau nouet, on le renfermera dans un nouveau pain, & l'on continuera cette préparation jusqu'à 4 ou 5 fois, observant de mettre à chaque fois la gomme en poudre, de prendre un nouveau nouet, & que le pain soit toujours bien cuit & sortant du four, après quoi on gardera cette gomme en poudre pour les usages auxquels elle convient.

Par cette préparation, j'ai trouvé ce remède bien dépouillé de sa grande violence, tant purgative, qu'émetique. La mie des premiers pains dont on s'est servi pour cette préparation, étoit purgative & émetique.

J'aurai par la suite encore quelques observations à donner sur ce mixte.

~~~~~

## L E T T R E

De M. BERNOULLI Professeur à Groningue, touchant son nouveau Phosphore.

Groningue ce 5. Juillet 1701.

M O N S I E U R ,

\* AYANT été occupé depuis quelque-temps à faire de nouvelles experiences, je n'ai pû répondre plutôt à vôtre dernière du 26. Mai. J'ai lû l'écrit que vous m'avez envoyé; mais je ne sai si je dois être fâché du mauvais succès des experiences qu'il contient sur la lumiere du mercure, il me semble que j'ai sujet de me feliciter plutôt moi-même de ce que personne n'a pû encore effectuer ce que j'effectue fort aisément, soit par mon adresse (si j'en ai), soit par la bonté de ma Machine pneumatique. Car en effet n'est-il pas surprenant que ces experiences de l'Académie, n'ayent jamais réussi, & que moi je n'aye jamais manqué? L'écrit porte que *c'est quelque accident particulier arrivé à quelque mercure, qui le peut rendre capable de luire en un lieu vuide d'air*. Mais je vous prie de considérer que j'ai fait mon Phosphore avec 5. ou 6. sortes de mercurcs que je sai être apportez ici de divers endroits & en divers temps, lesquels cependant m'ont tous fort bien réussi,

hor-

\* 27. Juillet 1701.

hormis un seul qui n'a pas donné de lumière au commencement, mais que j'ai rendu luisant en le lavant comme je dirai ci-après.

Je ne trouve pas nécessaire de répondre par ordre aux expériences de cet Ecrit, ni aux réflexions & conséquences qu'on en tire. Pour finir la dispute, je prie l'Académie de me vouloir envoyer du même vis-argent dont on s'est servi sans succès, je prétends en faire un Phosphore aussi bon que ceux que j'ai déjà faits jusqu'à présent. Et afin que l'Académie puisse être assurée que c'est le même mercure qu'on m'aura envoyé, dont j'aurai fait le Phosphore; je le ferai en présence de témoins authentiques, & je le renverrai à l'Académie. Ce qui me rend si hardi, c'est que je vois des circonstances dont l'Ecrit fait mention, lesquelles me font croire que ces expériences n'ont pas été faites avec assez d'exactitude; & que par conséquent la mauvaise réussite en doit être imputée uniquement ou à la Machine de l'Académie, qui n'est pas peut-être des plus justes, ou à quelque méprise. L'une de ces circonstances, est que le mercure dans une fiole vidée d'air, étant fortement secoué, donnoit à la vérité un peu de lumière fort faible, qu'elle étoit forte au commencement, qu'elle diminuoit peu à peu, sans néanmoins qu'il soit rentré d'air dans le vaisseau; & qu'après avoir laissé rentrer l'air, & puis vidé sur le champ une seconde fois la machine, ce mercure n'avoit plus donné aucune lumière, quoique secoué fortement. Je vois par-là que le mercure n'a pas été purifié comme il faut de la matière hétérogène; de laquelle aura été formée cette pellicule dont j'ai parlé dans

mes précédentes, par le concours de l'air qui sera resté dans la fiole qu'on croyoit avoir assez vidée : c'est pour cela que la lumière étoit si foible & s'évanouissoit peu à peu, au lieu qu'elle auroit été très-vive & durable, si la fiole avoit été bien vidée, & le mercure bien purgé; car j'ai éprouvé plus d'une fois que le mercure enfermé dans un vaisseau vuide d'air, où il luisoit beaucoup pendant longtemps avec une égale force, a cessé de luire en perdant sa lumière peu à peu, dès que j'y ai laissé rentrer un peu d'air. Quoiqu'il en soit, on peut conclurre des expériences qu'on m'objecte, que le mercure qui n'y étoit pas luisant dans les Barometres (car comme l'Ecrit ne porte pas qu'on s'y soit servi de différens mercures, je crois qu'on n'y a employé que du même) l'étoit au moins dans une fiole vuide d'air: si l'on avoit donc fait l'expérience avec le Barometre seulement, & qu'on eût prononcé que ce mercure n'étoit pas lumineux, ne se seroit-on pas trompé? puisqu'il l'étoit effectivement. Il en est de même de la seconde expérience, par laquelle on n'a plus vu de lumière dans la même fiole après l'avoir vidée une seconde fois; parce que (suivant l'Ecrit) peut-être en faisant rentrer l'air dans le vaisseau, il s'est attaché un peu de l'humidité de cet air aux parois de ce vaisseau, ce qu'on reconnoît avec moi être nuisible à la lumière du mercure. Voyons donc ce qui seroit arrivé si dès la première fois il se fût glissé insensiblement quelque humidité dans la fiole; il n'y a point de doute que la lumière ne paroissant point dès cette première fois, on n'eût dit que ce mercure n'est point lu-

lumineux du tout, quoique c'eût été la faute de celui qui auroit fait l'expérience, & non pas celle du mercure. Je dis cela pour faire remarquer que les expériences qui ne réussissent pas, ne prouvent rien pour soutenir une proposition negative; parce qu'on peut toujours douter qu'en faisant ces expériences, on n'ait commis quelque méprise.

Je ne dirai rien touchant les expériences sur le Barometre, tant parce que j'ai déjà répondu dans ma seconde Lettre à ces mêmes objections, que parce que je néglige entierement de faire d'autres observations sur la lumiere du Barometre, depuis que j'ai trouvé le moyen de rendre le mercure lumineux dans une fiole; ce qui est à mon avis infiniment plus curieux, d'autant que cela fournit une espece de Phosphore perpetuel & commode à transporter, outre que la lumiere en est beaucoup plus vive que celle du Barometre: je dirai seulement quelque chose sur le second Barometre fait dans la Machine pneumatique de l'Academie. On a raison de dire *que le mercure n'est pas monté dans ce dernier Barometre à la même hauteur qu'il monte ordinairement dans un Barometre bien fait, n'étant pas possible de vuider par cette maniere tout l'air du dedans du tuyau*; parce que le poids du mercure pressant sur le bout ouvert du tuyau empêche enfin la sortie de l'air. Je vois par-là qu'on a laissé tremper le bout ouvert du tuyau trop profondément dans le mercure, au lieu que lorsque je fis cette expérience, je donnai telle situation au tuyau, que son bout étoit presque à fleur du mercure, & fort peu enfoncé: je pris pour cet effet un vaisseau un peu plat & large,

afin qu'en laissant rentrer l'air, qui par sa pression a fait monter le mercure dans le tuyau, ce mercure ne vînt pas à manquer; De cette maniere j'ai élevé le mercure jusqu'à la hauteur de 26. pouces, en sorte que peu s'en falloit qu'il ne montât à la hauteur ordinaire. Quoiqu'il soit donc vrai, qu'il n'est pas absolument nécessaire que le mercure soit dans un lieu parfaitement vuide d'air pour devenir lumineux comme on le remarque fort bien dans l'Écrit en question; il faut pourtant savoir qu'il ne restoit pas tant d'air dans le tuyau comme on a peut-être pensé; & qu'outre cela la lumière, quoique très-vive la premiere nuit, s'est affoiblie notablement les nuits suivantes, sans doute à cause de ce peu d'air qui est resté dans le tuyau, ce que je n'ai remarqué qu'après ma dernière Lettre. D'où il s'ensuit que plus le vuide sera parfait, plus la lumière sera exquise & durable, en sorte que le mercure dans une fiole parfaitement vuide d'air (ou du moins qui le soit jusqu'à la dix-millième partie ou davantage, car il est impossible de tirer l'air totalement de quelque vaisseau que ce soit) luira le plus vivement qu'il est possible; & bien loin que la lumière s'affoiblisse, elle augmentera jusqu'à certains degrez, & puis elle subsistera & se fera voir avec une égale force toutes les fois qu'on remuera la fiole, pourvû que d'ailleurs le vif-argent soit bien purifié de ses ordures. J'avoue que c'est une conjecture qui me paroît véritable, quand on soupçonne que mon premier mercure, qui dans le moment qu'il est exposé à l'air commence à se couvrir d'une pellicule qui devient comme de la poussie-

re,



re, s'il est remué, n'est pas aussi pur qu'il le pourroit être: je veux bien demeurer d'accord que cette pellicule se forme de la matiere étrangere, soit metallique, soit autre, laquelle vient du dedans du mercure plutôt que de l'air; cependant cela n'infirmo point l'explication générale que je donne de la production de la lumiere du mercure, & ne détruit même pas mon idée de la génération de ladite pellicule; car il est toujours constant, comme j'ai remarqué dans mes précédentes, que l'air, s'il n'en est pas toujours la cause materielle, il en est du moins la cause efficiente, vû que ce même mercure tandis qu'il est enfermé dans le vuide, demeure toujours clair & poli, quoique remué fortement, & aussi-tôt qu'on y admet l'air, il se trouble à son ordinaire: mais j'ai trouvé le secret de le purifier de toutes ses ordures, si bien qu'il ne se trouble plus quand même il est exposé à l'air & agité fortement; je mets 4. ou 6. onces de mercure dans une fiole, & je verse dessus de l'eau commune jusqu'à ce qu'elle couvre le mercure à l'épaisseur de deux doigts ou environ; puis je secoue fortement & longtemps la fiole comme pour la rincer, j'ôte l'eau qui en devient toute sale & noire de dessus le mercure, & j'y en remets de fraîche & recommence de secouer la fiole, jusqu'à ce que l'eau devienne derechef sale; cela étant, je change d'eau la seconde fois & fais la même chose; ce qui étant réitéré jusqu'à ce que l'eau ne se noircisse plus ou fort peu, je seche le mercure en le faisant passer plusieurs fois par un linge net: si on prend de l'esprit de vin à la place de l'eau, on aura plutôt achevé de

de netoyer le mercure. De cette maniere je lui ai ôté toute saleté, en sorte qu'étant remué tant qu'on veut à l'air libre, il ne laisse plus aucune trace de pellicule ni de poussiere, si ce n'est qu'il se ternit un peu au bout de quelques jours, comme si c'étoit par l'haloine, ce qui vient apparemment par l'attouchement de l'air qui est toujours un peu infecté d'humidité. Le Phosphore que j'ai fait de ce mercure ainsi netoyé, a été beaucoup plus beau que les autres faits auparavant; c'est ce qui confirme mon explication de la production de cette lumiere, que j'ai dit être empêchée par la matiere heterogene qui occupe le dessus du mercure.

J'ai dit ci-dessus que j'ai éprouvé 5. ou 6. sortes de mercures, qui tous m'ont réussi; dont quelques uns se sont aussi infectez de poussiere par le remuement, comme mon premier, & les autres sont demeurez clairs & polis comme celui de l'Academie. Entre ceux-ci il s'en est trouvé un qui au commencement n'a point donné de lumiere: mais je m'en étois douté avant même que d'en avoir fait l'essai; car il me paroissoit plus épais ou moins fluide que les autres, en ce qu'étant agité, il ne faisoit point de bouillons sur sa superficie; comme j'ai remarqué dans les autres, ce que j'ai attribué à sa lenteur qui empêche la separation des parties. C'est ce qui m'a fait naître le soupçon qu'il y avoit peut-être dans ce mercure-là quelque matiere huileuse ou sulfureuse, qui à cause de sa viscosité ne se manifeste pas sur la surface, comme sont les autres ordures qui se separent plus aisément des petites parties du mercure pour être jettées.

do-

dehors: ainsi cette matiere huileuse demourant toujours mêlée dans l'interieur du incure, on prendra ce mercure pour très-pur quoiqu'il ne le soit nullement, & moins encore que celui qui se couvre d'abord d'une pellicule visible: en effet l'ayant bien lavé de la maniere susdite avec de l'esprit de vin plutôt qu'avec de l'eau, parce que je pensois qu'il seroit plus propre que l'eau pour ôter la viscosité; le mercure qui n'étoit point lumineux, devint aussi luisant que tout autre: mais ce qui est encore plus admirable, le premier vis-argent qui se troubloit au moindre mouvement, est devenu si pur par ce lavement (quoique d'eau seulement), que je lui ai vû faire de la lumiere même dans une fiole pleine d'air naturel, sans en avoir rien tiré. Il est vrai que la lumiere n'en étoit pas à beaucoup près si vive que celle qui se fait dans le vuide, & elle ne paroissoit qu'en forme d'étrincelles séparées qui naissoient successivement & perissoient presque au même moment; au lieu que la lumiere dans le vuide est comme une flamme continuelle qui dure sans cesse pendant que le mercure est en agitation. J'ai conclu de cette experience que le mercure s'il est parfaitement purifié, peut laisser sortir de ses pores la matiere subtile (que j'ai appelée avec *M. Descartes* du nom de premier élément) en tant d'abondance à la fois, que malgré la resistance de l'air, elle a encore assez de mouvement pour produire quelque lumiere. Qu'on prenne donc la peine de bien laver le mercure qu'on dit n'être pas lumineux, & après l'avoir bien séché (car la moindre humidité causeroit un mauvais succès)

cès) qu'on le verse dans une fiole nette par dedans & bien sèche, dont on tire ensuite l'air soigneusement: je suis assuré qu'on réussira: quoiqu'on pense que ce mercure est parfaitement pur, parce qu'il demeure clair après l'agitation; j'ai pourtant remarqué qu'il peut être infecté d'une matiere gluante cachée, qui fermant entierement ses pores ou du moins les rendant roides, empêchera ou retardera la sortie des particules qui doivent causer la lumiere: je dis que la roideur des pores peut empêcher ou retarder la sortie de ces particules; car il est bien visible que quoique le mercure soit en grande agitation, si pourtant les pores de ses parties ne sont pas assez flexibles pour changer de figure, la matiere du premier élément n'en pourra pas être chassée, car il faut que les pores se rétreussent souvent pour que cette matiere puisse sortir. Cela étant, il y a beaucoup d'apparence que le mercure qu'on dit être devenu lumineux par la distillation au travers de la Chaux vive, est du nombre de ceux qui ont les pores ainsi roides à cause de quelque matiere sulfureuse ou gluante. Et partant bien loin d'être du sentiment de ceux qui croient que ce sont des *parcelles ignées*, que la chaux vive a données au mercure en passant, qui produisent la lumiere; je suis fort persuadé au contraire que la veritable raison en est la seule purification, de sorte que la chaux n'y a rien contribué, que ses pores par lesquels le mercure passant a laissé en arriere toute la matiere étrangere & gluante, & s'en est ainsi délivré: on n'a donc rien fait autre chose par la distillation que ce que j'ai fait par un simple lavement.

En

En effet ces corpuscules ignées me semblent fort paradoxes par plusieurs raisons, dont je ne dirai que quelques-unes.

1. Il faudroit que ce nouveau Phosphore perdît enfin sa vertu parce que ces parcelles ignées deviendroient enfin inutiles par le fréquent usage, comme on voit arriver aux autres Phosphores qui sont lumineux par le moyen de telles particules ignées.

2. Si ces parcelles ignées sont si subtiles qu'elles puissent loger dans les petits interstices du mercure, & passer par iceux, comme on le prétend, sans doute elles pourront passer beaucoup plus aisément par les pores du verre qui sont plus amples que ceux du mercure; d'où vient donc qu'en secouant la fiole, elles ne se dissipent pas d'abord en s'envolant par les pores du verre en quelque grande quantité qu'elles soient dans le mercure?

3. On ne pourra pas expliquer non plus pourquoi dans le Barometre, la lumiere ne paroît que dans la descente du mercure: car si elle est causée par ces corpuscules ignées qui nagent sur la superficie, pourquoi ne font-ils pas leur effet quand le mercure monte aussi bien que quand il descend; s'il ne faut que du mouvement pour les faire *successivement sur la superficie du mercure?*

Or on évite toutes ces difficultez par ma maniere d'expliquer cette lumiere; car en disant qu'elle est produite par une matiere très-subtile, qui étant universelle & se trouvant par tout, ne vient jamais à manquer, on fera voir que ce Phosphore doit durer perpétuellement, le mercure ne faisant autre chose que prêter ses pores forts étroits, & servir  
de

de cribler à la matiere du premier élément pour la séparer de celle du second & du troisième (je me sers de ces termes parce qu'ils sont commodes pour m'expliquer) de laquelle étant délivrée, & après poussée hors du mercure par l'agitation qu'on lui donne, elle prend d'abord son mouvement rapide qui lui est ordinaire quand elle est seule & dégagée de toute autre matiere, & produit ainsi dans nos yeux l'effet qui cause en nous la sensation de lumiere. Donc cette matiere *luminifique*, quoiqu'elle soit dissipée en un moment, elle ne laisse pas d'être incontinent suivie d'une autre qui fait le même effet, & ainsi de suite, ce qui durera toujours. Cette explication se verifie assez par un de ces Phosphores dont j'ai fait l'experience presque toutes les nuits depuis environ un an, & je puis dire de bonne foi que je n'y ai jamais remarqué aucune variété sensible, mais bien au contraire que la lumiere en étoit toujours également splendide, comme elle l'est encore; & bien loin qu'elle ait souffert quelque diminution, il semble qu'elle est présentement un peu plus vive qu'elle n'étoit au commencement, peut-être parce que le mercure est devenu plus fluide par les fréquentes agitations, & que le reste des ordures s'en est séparé peu à peu, & s'est attaché aux parois du verre: comme le verre qui est un peu trouble au dedans, le donne assez à connoître; en sorte que le mercure étant totalement purifié, donnera à l'avenir toujours de la lumiere au plus haut degré de vivacité. Mon explication me paroît d'ailleurs si plausible que je suis pleinement persuadé, qu'une autre liqueur pure & aussi

pe-

pesante que le mercure, si on en avoit, feroit sans doute le même effet; en sorte que je crois que l'Or seroit le plus propre pour faire de semblables Phosphores, si on savoit le moyen de le rendre fluide sans perdre de sa pesanteur spécifique: car comme je fais dépendre cet effet de la petitesse & flexibilité des pores, il est certain que l'Or ayant les pores les plus petits entre les corps, il ne lui manque que la flexibilité des pores qu'on ne pourroit lui procurer que par une parfaite fluidité de sa masse. Peut-être que du plomb fondu mis dans le vuide, donneroit aussi de la lumière, à moins que les ordures dont il est toujours infecté, ne l'en empêchassent.

Pour ce qui est du mercure qu'on dit avoir été rendu lumineux par le Phosphore liquide artificiel, je crois que ce n'étoit pas le mercure qui a été lumineux, mais les parcelles mêmes du Phosphore artificiel. Or cela seroit arrivé sans doute à beaucoup d'autres corps qu'on voit luire par le seul frottement du Phosphore solide; & comme la lumière en est fort peu durable, je m'imagine bien que le mercure dont on parle ici, n'a pas gardé non plus toujours cette lumière empruntée du Phosphore liquide artificiel; en sorte que cette lumière-là n'est plus de notre sujet.

Par tous ces raisonnemens joints aux observations que j'ai alleguées, il paroît que les trois conséquences qu'on a tirées, ne peuvent pas subsister. Car 1. On voit que le mercure est non seulement capable de devenir lumineux dans un lieu vuide d'air; mais qu'il est déjà lumineux en effet, pourvu que  
sa

la lumiere ne soit empêchée par quelque cause étrangere, soit interne, soit externe.

2. On voit que tous les mercures sont également lumineux, pourvû que derechef leurs lumières ne soient pas empêchées dans les uns plus que dans les autres, par quelques causes que ce soient. J'ai fait sur ce sujet une observation remarquable: j'ai pris deux fioles toutes semblables & égales, dans lesquelles j'ai mis une égale quantité de mercure prise d'une même masse; j'ai tiré l'air également, & en une même heure de chaque fiole. Ne diroit-on pas que la lumiere devoit aussi paroître également forte dans l'une & dans l'autre fiole; puisque tout étoit parfaitement, selon qu'il sembloit, égal & semblable? Cependant l'effet a fait voir tout le contraire; car l'une de ces fioles faisoit de la lumiere très-vive au moindre branlement, mais l'autre n'en donnoit qu'après plusieurs fortes secousses, & puis ayant commencé de luire une fois, il ne falloit aussi que de petits mouvemens pour faire revenir la lumiere; Et après avoir laissé reposer cette fiole pendant deux ou trois heures, il falloit derechef la secouer fortement avant que la lumiere commençât de reparoître; au lieu que la premiere fiole a toujours donné de la lumiere sans peine. Que dire donc à cela? sinon que dans une de ces fioles il étoit entré peut-être quelque peu d'humidité, quoiqu'imperceptible à mes yeux, soit de l'haleine, ou de la sueur des mains en la maniant; ce qui étoit déjà suffisant pour causer une si grande difference dans l'apparition de la lumiere. Il ne s'ensuit donc pas, si un mercure donne plus de lumiere qu'un

au-



autre mercure, qu'il soit pour cela plus capable d'en donner que l'autre ; car ici où les mercures étoient pris d'une même masse, & par conséquent également capables de luire, ne laissoient pas de luire différemment.

3. Enfin, on voit qu'un même mercure, s'il est bien préparé, doit toujours être également lumineux, & que s'il l'est tantôt beaucoup, tantôt peu, tantôt point, c'est une marque qu'il lui est arrivé quelque changement qui augmente, ou qui diminue, ou qui empêche l'apparition de la lumière, laquelle sans cela seroit toujours la même: témoin le Phosphore dont j'ai fait mention ci-dessus, lequel donne de la lumière depuis un an, sans aucun changement sensible. Je puis confirmer ce que je viens de dire par une autre observation que j'ai faite il y a peu de temps: j'avois une fiole préparée en Phosphore, qui luisoit également depuis six semaines environ; mais sans l'ouvrir ni laisser rentrer l'air dans la fiole, j'ai brûlé avec les rayons du Soleil par le moyen d'un verre convexe, une petite miette de liege qui s'étoit séparée du bouchon, & qui nageoit sur le mercure, ce qui a produit un peu de fumée dans la fiole, qui pour le reste demouroit dans son premier état sans avoir rien changé: on ne sauroit croire combien ce peu de fumée a diminué la vivacité de la lumière, outre qu'il falloit des secousses beaucoup plus fortes qu'auparavant pour la faire paroître. Ce qui fait voir que le changement de la lumière qu'on a remarqué à l'Académie, ne doit pas être pris pour une qualité essentielle, mais pour un effet d'une cause arrivée par accident.

Au reste je conviens que tout mercure commun se ressemble parfaitement, comme tout l'or & tout l'argent se ressemble, de quelqu'endroit du monde qu'il vienne, pourvu qu'ils soient purs: car c'est-là le fondement de mon explication de cette lumiere, pour soutenir qu'elle est générale, & qu'elle vient uniquement du mercure qui donne passage à la matiere du premier élément, à l'exclusion d'une autre matiere plus grossiere. Je demeure aussi d'accord qu'il suit de mon explication, que tout mercure doit être lumineux & en tout temps; aussi est-il l'un & l'autre, comme j'ai prouvé jusqu'à présent, pourvu que la lumiere ne soit empêchée par quelque cause étrangere, de même que le Soleil est toujours lumineux, quoique sa lumiere nous puisse être ôtée par une éclipse ou autre cause. Pour finir donc, je conclus que ce n'est pas un accident particulier, comme l'on croit, arrivé à quelque mercure qui peut le rendre capable de luire en un lieu vuide d'air: mais bien au contraire, qu'il est naturel & essentiel à tout mercure comme à toute autre liqueur aussi pesante, si on en avoit, d'être lumineux; & ce seroit plutôt un accident particulier arrivé au mercure que ce qui empêcheroit l'apparition de sa lumiere. Que si après tout cela on trouve encore des difficultez, sans pouvoir réussir à faire mon nouveau Phosphore aussi parfaitement que je le fais; je ne souhaiterois plus que d'avoir le même mercure qui s'éclipse si opiniâtement, j'espère que j'en dissiperois l'éclipse, & que j'aurois le bonheur de maintenir à ce mercure le titre Grec de *Phosphorus* avec autant de justice, que la Planete de Venus

Venus porte le titre Latin de *Lucifer*. Ce seroit-là le moyen de décider nôtre dispute. Si vous voulez, Monsieur, communiquer cette Lettre à l'Academie, vous me ferez un vrai plaisir. Je suis de tout mon cœur, &c.

~~~~~

## OBSERVATIONS.

*D'Anatomie & de Chirurgie sur plusieurs especes d'Hydropisie.*

Par M. DU VERNEY le Jeune.

\* **U**N E fille âgée de 25 à 30 ans, mourut il y a trois ans d'une hydropisie ascite, précédée & accompagnée d'une jaunisse universelle. Tout le corps étoit fort décharné & de couleur en partie jaune, en partie rouge, & en partie violette, le ventre étoit tendu, & l'ayant ouvert on trouva environ trois pintes de serositez comme de la biere limoneuse, & quelques traînées de limphe épaissie. Les intestins étoient de couleur brune, & fort enflés, l'épiploon presque fondu, le peu qui en restoit paroissoit ratatiné, pour ainsi dire, sur la portion du colon qui passe sous le fond de l'estomach; le foye étoit d'une grosseur & d'une pesanteur extraordinaire. Après avoir débarrassé l'arc du colon de ses attaches, on apperçut une grande & grosse poche qui se

MEM. 1701.

I

pré-

\* 6. Août 1701.

présentoit comme un abcès, elle naissoit de la partie cave du foie. On remarqua que ce gros volume qu'on avoit pris pour le foie, n'en étoit presque que la moitié & que l'autre partie étoit si desséchée, qu'il n'y restoit que des membranes, & des vaisseaux très-dilatez. De maniere que cette moitié qui étoit celle qui joignoit l'estomach, n'avoit pas un pouce d'épaisseur sur quatre à cinq de longueur & deux de largeur; la couleur de ce viscere étoit d'un jaune obscur, les vaisseaux biliaires extraordinairement dilatez, on y trouvoit des matieres grenées & noires qui teignoient les doits d'un jaune rougeâtre, on ouvrit ce grand sac, & il en sortit quantité de peaux ou membranes blanches, vertes, noires & jaunes, qui avoient presque toutes une figure ronde, les unes vuides, les autres à demi vuides, & quelques-unes remplies; il y en avoit d'aussi grosses que des œufs, & elles ressembloient assez bien à des œufs sans coquille, excepté que leurs membranes étoient plus moëlleuses, plus transparentes, & grenées, telles que sont celles du cordon des enfans nouveaux nez. Quelques-unes de ses vesicules, ou hydatides, renfermoient un champignon dont la surface ressembloit à un ovaire, ou à une pepiniere d'hydatides, ou enfin comme à une mûre dont les grains seroient transparens. On trouva quelques-unes de ces membranes larges comme la main, l'ayant portée dans cette grande poche, on en tira environ trois livres d'hydatides de toutes couleurs mêlées avec une matiere en partie glaireuse, en partie lymphatique, & en partie bilieuse; glaireuse, apparemment par l'épanchement & le séjour des

des hydatides qui s'y étoient ouvertes, & biliarye par le peu de matiere de même nature qui s'y étoit séparée: car les petits grumeaux noirs qu'on trouvoit pêle-mêle, n'étoient proprement qu'une bile desséchée, parce qu'étant écrasés & delayez entre les doigts, ils les coloroient de la même maniere que ceux qui étoient dans les canaux biliaires; à l'endroit où ces vaisseaux biliaires s'ouvroient, il y avoit quantité de ces grumeaux. Cette grande poche n'étoit autre chose que la vesicule du fiel épaisie, & dilatée au point de contenir au moins deux pintes de matiere. Cette vesicule étoit blanchâtre & se déchiroit presque comme du carton à demi usé, on observa plusieurs embouchures des vaisseaux biliaires dans la vesicule, chaque ouverture formoit un rebord comme une valvule, & dans ce rebord il y avoit plusieurs ouvertures, les unes plus, les autres moins considerables. Ces vaisseaux avant que de percer la vesicule du fiel, se traînoient entre ces membranes à peu près comme les ureteres dans la vessie, les moindres de ces vaisseaux recevoient aisément une grosse plume à écrire, & les plus petits un gros filet, on passoit aisément le doigt dans le canal qui s'ouvre dans le premier intestin.

Ayant trouvé ce conduit si dilaté, il semble qu'une partie des matieres renfermées dans la vesicule du fiel, devoit couler dans les intestins, mais si on fait reflexion que des glaires dans la vessie ou quelque corps étranger, ou enfin ses fibres trop dilatées causent des suppressions d'urine, on ne sera pas surpris que la vesicule du fiel soit demeurée aussi remplie qu'elle l'étoit.

Une Femme de chambre qui avoit accompagné la deffunte à *Bourbon*, nous dit qu'elle avoit vû dans les felles de la malade, des peaux & des matieres noirâtres, & grumelées, pareilles à celles qu'elle voyoit actuellement sortir de la vesicule du fiel.

Cette observation est confirmée par ce qui arrive en certains temps dans les animaux.

On trouve dans la vesicule du fiel de la plupart des animaux, des peaux de différentes couleurs qui sont apparemment des restes d'hydatides pareilles à celles qu'on vient de décrire, lesquelles sont plus ou moins considérables, suivant le plus, ou le moins d'altération de la liqueur biliaire.

Il y a plus de vingt ans que j'ai observé des dilatations extraordinaires de vaisseaux biliaires, & trouvé des peaux dans la vesicule du fiel des Bœufs & des Moutons.

A l'occasion de ces maladies, j'ai appris des Fermiers, & des Bouchers que pour connoître les animaux qui ont le foie altéré, il faut pousser & presser l'œil du Mouton au petit angle, & si le bouton qui est au grand angle paroît blanc, c'est un signe certain que l'animal est pourri, suivant leur maniere de s'exprimer, en effet on trouve le foie tumescé, & les vaisseaux biliaires remplis de peaux, ou membranes, dont nous avons parlé; les Bouchers disent un foie douvé, ou garni de doutes, ils trouvent dans ces animaux la graisse molle, & remplie d'eau, l'épiploon maigre, par pelotons, & garni d'hydatides de différentes grosseurs.

Cela se remarque aussi dans les Moutons qui empirent, & diminuent, ce sont ceux qui  
ont

ont été jusqu'à leur graisse, c'est-à-dire, au plus haut embonpoint, ou meilleur état qu'ils puissent être.

Leur ratte est ordinairement plus grosse. Les Bouchers appellent cette disposition le sang, qui est presque toujours une suite de la pourriture & de l'alteration survenue au foie, & à la liqueur biliaire.

On trouve très-souvent à ces animaux de l'eau dans le ventre, & dans la poitrine.

Les Moutons sont encore sujets à une maladie très-frequente, & contagieuse, nommée le Claveau. On compare cette maladie à la petite verole, elle se fait connoître dans son commencement par de petites éleveures, ou taches rouges qui se voient aux endroits où la laine garnit moins la peau, ces taches ou éleveures forment des boutons, l'Animal touffe; porte la tête basse; & le nez devient morveux & galeux; quand on a levé la peau, on la trouve garnie de boutons, & ordinairement les poulmons, & les reins sont plus gros, & plus pesans.

Pour revenir à notre hydropique, il ne se trouva rien de particulier à l'estomach, à la ratte, ni aux parties qui filtrent; & qui distribuent l'urine.

Les ovaires étoient schirreux, & n'avoient pas une vesicule apparente.

La matrice très-petite, & la trompe du côté droit tournée, & attachée par sa frange sur le rectum.

On trouva dans le côté gauche de la poitrine environ une chopine de serositez rougeâtres.

A l'égard du cœur & des poulmons, ils n'avoient rien de particulier.

\* Une femme âgée de 35 à 40 ans devint ascitique, ensuite d'une fièvre quarte & d'un flux de ventre qui étoit aussi accompagné de fièvre. On avoit essayé tous les remèdes convenables en pareille occasion, & on desespéroit de la guérison de la malade.

Je proposai la ponction, on s'y opposa d'abord parce qu'on n'en avoit guère vu réussir de la manière dont on l'avoit toujours faite; mais enfin on y consentit, il fut vidé 3 à 4 pintes d'une liqueur citronnée un peu verdâtre, d'une odeur urineuse; en ayant goûté elle me parut salée, elle mouffoit, & écumoit dans le bassin où elle tomboit, & ressembloit à de la lexive.

Un Enfant de 14 à 15 ans après avoir beaucoup souffert, étant dans une grande nécessité & attaqué d'une fièvre lente qui le jeta dans une ascite, demeura cinq à six mois dans cet état toujours languissant, & presque moribond.

Je traitai ces deux malades en même temps, ils furent rétablis & guéris par la ponction, aidée de la méthode suivante, qui me fut communiquée en 1679. à *Turin* par feu M. *Thouvenot* premier Chirurgien de leurs Alteſſes Royales de *Savoie*.

Le régime qu'observerent ces deux hydropiques fut très-exact, & très-propre à adoucir l'âcreté & la salure des sucſ nourriciers, & à réparer les pertes faites par la maladie, l'épanchement, & les remèdes qu'on avoit été obligé de faire avant la ponction.

On leur fit du bouillon avec de la tranche de bœuf, de l'éclanche de mouton dégraissée, du

\* 20. Août 1701.



du veau, & un vieux coq, une vieille perdrix ou un chapon pilé avec les os dans un mortier de marbre, assaisonné avec quelques cloux de girofles, un peu de canelle, & toujours un nouët de rapure d'yvoire & de corne de cerf, & on leur donnoit de ce bouillon peu & souvent.

On leur faisoit prendre aussi une tisanne legere faite avec la racine de fraiser, la scorsonnaire, & la rapure de corne de cerf de temps à autre, on leur donnoit quelques cuillerées de vin pur & quelques jaunes d'œufs.

Tous les soirs on leur faisoit user d'un mélange de conserve d'aunée, ou enula, de gratte-cul, & de confection d'Alkermes. Ces deux malades observerent ce regime de la premiere à la seconde ponction, où il n'y eut que quatre jours de distance; à cette seconde operation il se vuïda à peu près autant de serofitez qu'à la premiere.

Le premier jour de la seconde ponction, ces malades garderent le même regime; le deuxième ils furent purgez, & on commença de leur donner à mâcher de la viande rôtie pour en tirer le jus sans avaller la viande, ensuite on leur fit manger un peu de potage, & un peu de viande rôtie.

De deux jours l'un on leur faisoit prendre du jus de veau fait avec le cerfeuil, la rubarbe, la petite absinte, & la fleur de camomille.

On réitera encore une fois la ponction, on purgea suivant l'occasion, & on observa la même methode jusques à la fin.

On donnoit ordinairement à ces malades avant le repas, une prise de la poudre de *Rondelet* contre la cachecie, & l'hydropisie, où

j'ajoutois l'estomach glanduleux des poules.

Ces deux malades furent entierement gueris en trois semaines ou un mois.

J'ai vû la femme en bonne fanté plus de six ans après.

Pour découvrir la nature des eaux vuidées, je fis à chaque ponction les mélanges suivans.

1. On en mit dans une cuilliere sur le feu, la moitié s'évapora, l'autre moitié s'épaissit, & parut comme un blanc d'œuf frais.

2. L'esprit de nître jetté sur de la même liqueur la troubla, la blanchit, & produisit un coagulum blanc au fond du verre.

L'eau forte fit la même chose, la teinture de noix de gales mêlée avec cette liqueur y fit aussi un coagulum blanc, & le reste parut noirâtre.

Ni l'esprit devitriol, ni l'esprit de sel, ni le vinaigre distillé ne firent aucun changement sur cette liqueur.

L'huile de tartre par défaillance y faisoit paroître un petit nuage.

Le Tournesol, & la teinture de *Bresil* mêlez avec cette liqueur n'y produisirent aucun changement.

En 1684, j'examinai encore les eaux d'un hydropique, mêmes experiences furent faites, & le produit fut pareil.

Le 16 Août 1701, autres experiences furent faites sur de l'eau vuidée du ventre d'un hydropique cinq jours après la ponction.

(a) Ayant mis de cette matiere dans un verre, & versé dessus de l'esprit de nître, la liqueur

(a) 1. Experience.

queur est devenue épaisse, blanche, & a fait un *coagulum* ou caillé blanc au fond du verre, ce mélange ayant été gardé quelques jours, la matiere contenue dans le verre s'épaissit & prit une consistance de gelée de couleur verdâtre.

(a) L'esprit de vitriol fit un petit nuage, changea un peu la couleur, ce mélange s'épaissit aussi & devint d'un verd clair sans qu'il tombât rien au fond du verre.

(b) L'huile de tartre par défaillance mêlée avec cette liqueur produisit une petite blancheur au fond du verre qui se dissipa peu de temps après, & la couleur de la liqueur ne changea point ni dans le temps du mélange, ni étant gardée; au contraire elle parut plus belle, & plus transparente.

(c) Ayant mis un peu de Couperose dans un verre, & jetté dessus de cette liqueur, elle parut noire, trouble, & demeura dans cet état deux fois 24 heures, puis elle devint moins épaisse, moins noire, & de couleur entre verte & jaune, laissant une espede d'ochre au bord du verre.

(d) L'esprit de vitriol ne causa aucune alteration à cette liqueur, mais le vitriol en substance y en fit une considerable.

(e) L'esprit volatil de sel Ammoniac n'y fit aucun changement, non plus que le sel alcali de M. *Seignette*; cela fait bien voir que cette liqueur est alcaline.

(f) Après avoir mis un peu d'Alun en pou-

I 5

dre

(a) 2. Experience. (b) 3. Experience. (c) 4. Experience. (d) 5. Experience. (e) 6. Experience. (f) 7. Experience.

dre dans un verre, & jetté dessus de la liqueur elle devint trouble, parut jaunâtre, & comme mêlée avec du caillé, & le dessus de la liqueur comme chargé d'huile ou de graisse fondue.

Ce mélange gardé il se fit un *coagulum* au fond & le reste demeura transparent avec une pellicule qui paroissoit huileuse, de couleur moins jaune, & un œil verd.

(a) L'eau forte jettée sur cette liqueur produisit dans tous les temps tous les changemens qu'avoit fait l'esprit de nitre.

(b) La poudre de noix de gales mêlée avec la même liqueur, la rendit, épaisse, blanche, & fit un *coagulum* considerable, le dessus de la liqueur demeurant clair & moins jaune qu'elle n'étoit avant le mélange.

(c) Le Tournesol mêlé aussi avec cette liqueur, la rendit violette, & étant gardée elle parut un peu rouge.

(d) La dissolution du sublimé mêlée avec la liqueur des hydropiques, changea la couleur, troubla la liqueur, & fit un gros nuage ou limon blanc presque en *coagulum*.

Le 20 Août 1701, je fis porter à l'Académie de l'eau d'un hydropique avec laquelle je fis les mêmes expériences trente heures après la ponction.

La dissolution du vitriol ni le vitriol en substance ne changerent presque point la liqueur, mais ayant réitéré ces mélanges chez moi, & les ayant gardé deux à trois fois vingt quatre heures, j'observai que la liqueur avoit changé,

&

(a) 8. Experience. (b) 9. Experience. (c) 10. Experience. (d) 11. Experience.

& avoit paru un peu plus épaisse ; il s'y fit peu à peu une petite pellicule qui s'épaissit , & devint de même que la liqueur de couleur de *rouille* , ou comme ces limons rouillez qu'on voit aux environs des eaux minerales.

L'huile de tartre par défaillance ne fit point de petit nuage blanc au fond du verre.

La poudre de noix de gales ni sa teinture ne donnerent aucune noirceur à cette liqueur.

Le Tournesol mêlé avec la même liqueur la fit paroître rouge & verte , rouge au haut du verre , & verte au fond.

Ce mélange gardé deux fois 24 heures toute la liqueur devint verte.

La teinture de noix de gales brouilla d'abord la liqueur & produisit un *coagulum* , dont une partie demeura suspendue & peu à peu la surface devint fort noire.

La poudre de noix de gales produisit un *coagulum* presque aussi fort que celui qu'avoit fait l'esprit de nitre , ce mélange jetta d'abord une écume dont les bulles paroissoient noirâtres , cette écume étant gardée devint très-noire dans la suite.

En faisant ces experiences je mis par occasion une pincée du sel alcali de M. *Seignette* dans ma main , ensuite je jettai dessus peu à peu de l'esprit de vitriol , ce qui causa un grand bouillonnement qui se fit sentir fort froid.

Outre ces observations , j'en ai encore plusieurs autres que j'espere donner incessamment , tant sur l'hydropisie ascite , que sur la plupart des autres especes de cette maladie.

## P R E M I E R E F I G U R E

*qui représente un foye de Momon.*

*aaaaaa* La circonference du foye.

*bb* La portion ou le fond de la vesicule du fiel enflée & qui n'est pas attachée au foye.

*ccc* Marque les courbures ou anfractuosités de cette vesicule.

*dd* L'endroit du col qui s'unit au canal hepaticque, désigné suivant la grosseur & la figure que nous lui avons trouvée.

*eee* Le canal hepaticque très-dilaté.

*ff* Continuation de la jonction des deux canaux cystique & hepaticque, qui est ce qu'on appelle colidoque.

*gg* L'endroit où le canal pancreatique s'ouvre dans le colidoque qui s'est enflé en soufflant dans le colidoque.

*hhhhhh* Canal pancreatique.

*iiii* Une portion du Pancreas.

*ll* Deux glandes conglobées situées aux côtés de la jonction des canaux cystique & hepaticque, qui lui font faire de chaque côté un enfoncement ou courbure.

*La seconde Figure représente aussi un foye de Momon dans sa grandeur naturelle, où les vaisseaux qui reçoivent & distribuent la bile sont fort dilatez.*

*aaaaaa* La circonference du foye extrêmement grenelée & dont un endroit ressemble  
af-

assez bien à une portion de lobe du poulmon soufflée.

*bbbbbbbbb* La vesicule du fiel ouverte, ce qui laisse voir quatre grosses embouchures des canaux hepaticques, dont deux sont opposées aux deux autres, ces embouchures ne sont que dans le col, je n'en ai pû trouver dans les autres parties de la vesicule.

*cccc* Les mêmes embouchures dans lesquelles aboutissent plusieurs autres tuyaux.

*eeee* Une poche ou dilatation du canal hepaticque dans laquelle se voient quatre embouchures opposées les unes aux autres.

*ffff* Les embouchures & ouvertures des canaux hepaticques, ou biliaires.

*ggggg* Plusieurs lignes ponctuées qui marquent les differens endroits du foye où aboutissent des canaux hepaticques de differens endroits de la substance de ce viscere.

*bb* Continuation des canaux réunis nommé colidoque, dans lequel s'ouvre le canal pancreatique marqué *ii*.

*llll* Le canal pancreatique.

*nnnnnnnn* Cinq troncs de canaux hepaticques ouverts & très-dilatez, dont deux ont à leurs extrémités des tubercules ou dilatations élevez sur la surface du lobe, semblables à de grosses varices ou hemorroïdes marquées *oooo*.

Cet endroit du lobe du foye ressembloit dans la partie comme à une portion du lobe des poulmons soufflée.

Tous ces canaux dilatez & variqueux étoient remplis d'une matiere bilieuse, visqueuse, tenace & garnie de quantité de certaines peaux, ou pellicules verdâtres.

*pp* Les glandes conglobées marquées dans la premiere figure.

*La troisieme figure représente la vesicule du fiel d'un Bœuf, son col, le canal hepaticque, & une portion du Pancreas.*

*aaa* La vesicule ouverte.

*bb* Son col ouvert.

*ccc* Le canal hepaticque aussi ouvert.

*dd* Une portion du Pancreas.

*ee* Une ligne ponctuée qui marque l'endroit où s'ouvre le canal Pancreatique dans le canal hepaticque.

*ff* Deux grosses embouchures dans le canal hepaticque.

*iiii* Plusieurs embouchures de vaisseaux hepaticques au col de la vesicule du fiel où on passoit un filet, le col de la vesicule m'a paru criblé. Je n'ai fait dessiner que les ouvertures les plus apparentes.

*kkkkkk* Six ouvertures de canaux hepaticques qui s'ouvrent dans la vesicule du fiel. Je ne doute point qu'il n'y en ait plusieurs autres.

Les vaisseaux biliaires qui pénètrent dans la vesicule du fiel, coulent obliquement entre ses membranes.



Figure.







Figure 2<sup>e</sup>.







Figure 3<sup>e</sup>





~~~~~

# M E T H O D E

*Pour la Rectification des lignes Courbes  
par les Tangentes.*

Par M. CARRE.

## P R O B L E M E.

\* **S**OIT une ligne Courbe quelconque  $AMB$  qui ait pour axe la ligne  $AD$ ; soit menée d'un point  $M$  pris à volonté l'ordonnée  $MP$  & la tangente  $MT$ , † soit encore tirée une autre ordonnée  $mp$  infiniment proche de  $MP$ , &  $MR$  parallèle à  $AD$ : Ayant nommé  $AP$ ,  $x$ ; donc  $Pp = dx$ ;  $PM$ ,  $y$ ; donc  $Rm = dy$ ; &  $TM$ ,  $t$ ; on cherchera la valeur de  $Mm$  qui est la différentielle de la Courbe en cette sorte. Les triangles  $MPT$ ,  $MRm$  sont semblables, car ils sont rectangles en  $P$  & en  $R$ , & de plus l'angle  $PMT$  est égal à l'angle  $RmM$ : on aura donc  $PM(y) \cdot TM(t) :: Rm(dy) \cdot Mm = \frac{t dy}{y}$ , qui est l'expression générale d'une portion infiniment petite & indéterminée de la Courbe; & mettant dans cette formule les valeurs de  $t$  & de  $y$  trouvées suivant la nature de la Courbe, & prenant l'intégrale de la différentielle qui en resultera, elle donnera la longueur cherchée de la

\* 13. Août 1701. † FIG. 1.

208 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
la Courbe. On en va donner quelques exem-  
ples dans les Problemes suivans.

# E X E M P L E I.

Trouver la longueur de la Parabole ordinaire. \* Son équation est  $yy = ax$ ; l'on a par la Methode des tangentes  $PT = 2x$ ; donc  $TM$   
(t)  $= \sqrt{4xx - yy} = y\sqrt{\frac{4yy + aa}{aa}}$  en mettant

pour  $xx$  sa valeur  $\frac{y^4}{aa}$ . Donc  $Mm \left( \frac{t dy}{y} \right) =$

$dy\sqrt{\frac{4yy + aa}{aa}}$ , dont l'integrale seroit la lon-

gueur de la parabole. Mais il est facile de voir  
que cette rectification suppose la quadrature de

l'hyperbole. † Car si l'on prend  $\sqrt{4yy + aa} = z$ ,

donc  $y = \sqrt{\frac{zz - aa}{4}}$ , & prenant la difference,

$dy = \frac{z dz}{2\sqrt{zz - aa}}$ ; donc  $dy\sqrt{\frac{4yy + aa}{aa}} =$

$\frac{zz dz}{2a\sqrt{zz - aa}}$ , & cette differentielle est la mê-

me que celle de l'espace extérieur borné par  
une hyperbole équilatere, mais divisée par une

grandeur donnée. Car soit l'hyperbole équila-

tere  $AMB$ , qui ait pour axe conjugué la ligne  
 $CD$ ; ayant nommé  $CA$ ,  $a$ ;  $Cp$ ,  $y$ ; donc

$Pp = dy$ ; &  $PM$ ,  $z$ ; on aura par la nature  
de cette ligne  $yy = zz - aa$ , & prenant la

difference,  $dy = \frac{z dz}{\sqrt{zz - aa}}$ , & multipliant par

$z (PM)$ , il viendra  $\frac{zz dz}{\sqrt{zz - aa}}$  qui sera la dif-

\* FIG. 1. † FIG. 2.

fe-



ferentielle de l'espace hyperbolique ; Donc , &c.

\* Si la Courbe  $AMB$  est la seconde parabole cubique , dont l'équation est  $axx = y^3$  ; alors  $PT = \frac{3}{2}x$  ; donc  $TM(t) = \sqrt{\frac{9}{4}xx + yy} = y \sqrt{\frac{9y + 4a}{4a}}$  : Ainsi  $Mm(\frac{t dy}{y}) = dy \sqrt{\frac{9y + 4a}{4a}}$ , dont l'intégrale  $= \frac{2}{3}y + \frac{8}{27}a \sqrt{\frac{9y + 4a}{4a}} - \frac{8}{27}a$  fera la longueur de la Courbe. Pour avoir facilement cette intégrale, on supposera  $\sqrt{9y + 4a} = z$ , & prenant la différence,  $dy = \frac{2z dz}{9}$ . On aura donc  $dy \sqrt{\frac{9y + 4a}{4a}} = \frac{2z dz}{9\sqrt{4a}}$ , dont l'intégrale  $= \frac{2z^3}{27\sqrt{4a}}$ , & remettant à la place de  $z$  sa valeur, il viendra enfin  $\frac{18y + 8a}{27\sqrt{4a}} \sqrt{9y + 4a} = \frac{2}{3}y + \frac{8}{27}a \sqrt{\frac{9y + 4a}{4a}}$ . Mais si l'on fait  $y = 0$ , il restera encore  $\frac{8}{27}a$  ; ce qui fait connoître qu'il faut retrancher de cette valeur  $\frac{8}{27}a$ .

## EXEMPLE II.

Trouver la longueur de la Logarithmique.

† Les mêmes choses étant posées que dans le Problème, & nommant la soustangente de cet-

\* FIG. 1. † FIG. 3.

cette courbe  $a$ , parce qu'elle est toujours constante, on aura  $TM = \sqrt{yy + aa}$ . Donc  $Mm \left( \frac{y dy}{y} \right) = dy \sqrt{yy + aa}$ , dont l'intégrale seroit la longueur cherchée de la Courbe. Mais il est facile de voir que la rectification de cette Courbe dépend encore de la quadrature de l'hyperbole, en supposant  $\sqrt{yy + aa} = z$ .

## E X E M P L E III.

Trouver la longueur de la Spirale ordinaire.

La propriété de cette Courbe \* est telle, qu'ayant nommé le rayon de son cercle générateur,  $a$ ; la circonference,  $c$ ; une de ses portions,  $x$ ; & une ligne quelconque  $AM$ ,  $y$ ; on a toujours  $c : x :: a : y$ . Et menant une autre ligne  $Am$  infiniment proche de  $AM$ , & décrivant du centre  $A$  le petit arc  $MR$ ; on trouvera la sous-tangente  $AT = \frac{yy dx}{a dy} = \frac{cyy}{aa}$  en mettant pour  $dx$  sa valeur  $\frac{cdy}{a}$ . On aura donc  $TM = \frac{y}{aa} \sqrt{ccyy + aa}$ ; donc  $Mm \left( \frac{y dy}{y} \right) = \frac{dy}{aa} \sqrt{ccyy + aa}$ . Or cette différentielle ne diffère pas de celle d'une parabole dont le parametre seroit  $\frac{2aa}{c}$ , c'est-à-dire une 4. proportionnelle à la circonference, au diamètre, & au rayon du cercle générateur; Donc la longueur de la spirale est égale à celle d'une telle parabole. Ce que l'on connoît d'ailleurs être véritable.

\* FIG. 4.

EXEM-

## E X E M P L E IV.

\* Trouver la longueur d'une Spirale logarithmique.

Les mêmes choses étant posées, on aura par la propriété de cette Courbe  $dy, dx :: m.n$ , parce que l'angle  $AMT$  est toujours constant. Mais à cause des triangles semblables  $MAT, MRm, Rm(dy). RM(dx) :: AM(y)$   
 $AT = \frac{y dx}{dy} = \frac{ny}{m}$  en mettant pour  $dx$  sa valeur

$\frac{n dy}{m}$ . On aura donc  $TM = y \sqrt{\frac{mm+nn}{mm}}$ , &  $Mm$

$\left(\frac{y dy}{y}\right) = dy \sqrt{\frac{mm+nn}{mm}}$ , dont l'intégrale  $= \frac{y}{m}$

$\sqrt{mm+nn}$  est égale à la portion  $AM$  de la Courbe, qui est aussi la valeur de la tangente  $TM$ . D'où l'on voit que cette Courbe est d'une grandeur finie, quoiqu'elle fasse une infinité de retours à l'entour du point  $A$ , ce qui est digne de remarque.

## E X E M P L E V.

Trouver la longueur de la Cycloïde.

Soit la demi-cycloïde \*  $AMB$  qui a pour demi-cercle générateur  $AND$ . Ayant mené d'un point quelconque  $P$  l'ordonnée  $PM$ , & une autre infiniment proche  $pm$ ; soit tirée la corde  $AN$ , du point  $M$  la tangente  $MS$  qui lui sera égale & parallèle par la propriété de la Cycloïde, & la ligne  $MR$  parallèle à  $AP$ . Ensuite on nommera  $AD, 2r$ ;  $AP, x$ ;  
 donc

† FIG. 5. † FIG. 6.

donc  $Pp = dx$ , on aura à cause du cercle,  $AN = SM = \sqrt{2rx}$ . Mais à cause des triangles semblables  $APN$ ,  $MRm$ ; on dira  $AP(x)$ .  $AN(\sqrt{2rx}) :: MR(dx)$ .  $Mm = \frac{dx\sqrt{2rx}}{x} = dx\sqrt{\frac{2r}{x}}$ ; dont l'intégrale  $= 2\sqrt{2rx}$  est la valeur de la portion  $AM$  de la Courbe, qui est double de la corde  $AN$ . Mais  $P$  étant en  $D$ ,  $x = 2r$ ; on aura donc  $4r$  pour la Courbe entière  $AMB$ ; c'est-à-dire qu'elle est double du diamètre de son cercle générateur.

Il y a encore plusieurs manieres de rectifier la Cycloïde par les integrales, on les donnera dans un autre Memoire.

Si l'on vouloit regarder dans ces Courbes la petite partie  $Mm$  comme l'hypothénuse d'un triangle rectangle  $MRm$ , & substituer à la place de  $dx$  sa valeur en  $y$  trouvée suivant la nature de la Courbe, on arriveroit précisément aux mêmes grandeurs que l'on vient de déterminer.

~~~~~

## RECTIFICATION DE LA CYCLOÏDE.

Par M. CARRE'.

\* **L'**ON peut employer le calcul des différences pour rectifier les lignes Courbes en.

\* 31. Août 1701.

en plusieurs manieres. 1. En se servant d'une portion infiniment petite de la Courbe que l'on regardera comme l'hypothénuse d'un triangle rectangle, qui en est la différentielle ou l'élément, & dont la somme infinie sera la longueur de la Courbe. 2. En employant la Methode des tangentes. 3. En se servant de la Methode des Développées, ce qui se peut faire en deux manieres. L'on en va donner un exemple dans la rectification de la Cycloïde, qui est une Courbe aussi ancienne que le mouvement dans la nature, mais à laquelle les Géometres n'ont pensé que dans le siècle précédent, & dont les propriétés merveilleses surpassent de beaucoup celles de toutes les autres que l'on a connues jusqu'ici.

## PREMIERE MANIERE.

\* Soit la demi-cycloïde  $AMB$ , qui a pour demi-cercle générateur  $AND$ , l'on demande la longueur de cette Courbe.

Pour cela soit d'un point quelconque  $P$  pris sur le diamètre  $AD$  tirée une perpendiculaire  $PM$  coupant le demi-cercle en  $N$ , & une autre infiniment proche  $pm$ , & soit du point  $M$  menée  $MR$ , & du point  $N$ ,  $NO$  parallèles à  $AB$ : Ayant nommé  $AD$ ,  $2r$ ;  $AP$ ,  $x$ ; donc  $Pp$  ou  $NO$  ou  $MR = dx$ ; &  $PN$ ,  $y$ ; donc  $On = dy$ ; l'on cherchera la valeur de  $Rm$  qui est égale à  $Nn + On$ ; ce qui se prouve ainsi.

Ayant mené  $MQ$  parallèle au petit arc  $Nn$  que l'on regarde comme une ligne droite à cau-

cause de son infinie petitesse, l'on aura les deux triangles  $MRQ$ ,  $NO_n$  qui seront semblables & égaux; donc  $On = RQ$ : Il reste à prouver que  $Qm = Nn$ ; ce qui est évident: car  $Qm = nm - NM$ ; mais  $NM$  est égale à l'arc  $AN$ , &  $nm = An$ ; donc  $Qm = An - AN = Nn$ . L'on aura donc en termes analytiques  $Rm = dy + \frac{r dx}{\sqrt{2rx - xx}}$ : Car à cause des triangles semblables  $CPN$ ,  $NO_n$ ,  $PN$  ( $y = \sqrt{2rx - xx}$ ).  $CN$  ( $r$ ) ::  $NO$  ( $dx$ ).  $Nn = \frac{r dx}{\sqrt{2rx - xx}}$ . Mais prenant la différence de l'équation au cercle, il viendra  $dy = \frac{r dx - x dx}{\sqrt{2rx - xx}}$ ; donc  $Rm = On + Nn = \frac{2r dx - x dx}{\sqrt{2rx - xx}}$ . Ainsi l'on aura  $Mm^2 = dx^2 + \frac{4rr dx^2 - 4rx dx^2 + xx dx^2}{2rx - xx} = \frac{2r dx^2}{x}$  en donnant un commun dénominateur, & divisant par  $2r - x$ ; donc  $Mm = dx \sqrt{\frac{2r}{x}}$  qui est la différentielle de la Cycloïde, dont l'intégrale  $= 2\sqrt{2rx}$  est la valeur de la portion indéterminée  $AM$  de la Courbe; mais le point  $M$  étant en  $B$ , alors  $x = 2r$ ; donc  $2\sqrt{2rx} = 4r$  fera la longueur de la demi-Cycloïde; Donc la Cycloïde entière est quadruple du diamètre de son cercle générateur; ce que l'on connoît d'ailleurs être véritable.

## SECONDE MANIERE.

Les mêmes choses étant posées, soit menée  
du

du point  $M$  la tangente  $MS$ , qui est toujours égale & parallèle à la corde  $AN$ ; ainsi à cause des triangles semblables  $APN$ ,  $MRm$ , l'on aura  $AP(x).AN(\sqrt{2rx}) :: RM(dx)$ .  
 $Mm = \frac{dx\sqrt{2rx}}{x} = dx\sqrt{\frac{2r}{x}}$ , qui est la même valeur que celle que l'on vient de trouver; donc &c.

## TROISIÈME MANIÈRE.

Les mêmes choses étant encore posées, soit imaginé que la demi-cycloïde soit enveloppée d'un fil, & que ce fil se développe en commençant par son extrémité  $A$ , l'autre  $B$  demeurant fixe & immobile; il est clair qu'il décrira la Courbe  $ATF$ , & que chaque partie de ce fil  $TM$ ,  $tm$  qui touche la Cycloïde dans les points  $M$ ,  $m$ ; & qui est perpendiculaire à la Courbe  $ATF$ , est toujours égale à la portion développée  $AM$ ,  $Am$ . Ainsi pour rectifier cette Courbe, il n'y a qu'à trouver la longueur du fil  $MT$ , ce qui se fait en cette sorte.

Soit décrit du point  $m$  comme centre le petit arc  $SV$  que l'on regarde comme une ligne droite à cause de son infinie petitesse, les deux triangles  $APN$ ,  $SVs$  seront semblables, car ils sont rectangles en  $P$  & en  $V$ , & l'angle  $ANP$  est égal à  $VsS$ . L'on aura donc  $AN(\sqrt{2rx})$ .  $NP(\sqrt{2rx-xx}) :: Ss=Nn$  par la génération de la Cycloïde  
 $\left(\frac{r dx}{\sqrt{2rx-xx}}\right)$ .  $Vs = \frac{r dx}{\sqrt{2rx}}$  qui est la différentielle de  $TS$ , dont l'intégrale,  $= \sqrt{2rx}$   
 $= T$

$= TS = AN = SM$ ; donc  $TS + SM$  c'est-à-dire  $TM$  ou la portion  $AM$  de la Courbe  $= 2\sqrt{2rx}$ ; mais le point  $M$  étant en  $B$ ; alors  $x = 2r$ ; donc  $2\sqrt{2rx} = 4r$ ; donc &c.

Il seroit facile par-là de trouver la valeur de l'espace Cycloïdal, car il n'y a qu'à chercher la valeur de  $SV$  en disant  $AN (\sqrt{2rx})$ .

$AP(x) :: Ss \left( \frac{rdx}{\sqrt{2rx-xx}} \right) SV = \frac{rxdx}{\sqrt{2rx} \sqrt{2rx-xx}}$ , que l'on auroit pû trouver encore en conside-

rant le triangle rectangle  $SVs$ ; car  $\overline{SV}^2 = \overline{Ss}^2 - \overline{Sv}^2 = \frac{r r d x^2}{2rx-xx} - \frac{r r d x^2}{2rx} = \frac{r r x x d x^2}{2rx \times 2rx-xx}$ ;

donc  $SV = \frac{rxdx}{\sqrt{2rx} \times \sqrt{2rx-xx}}$ . Et multi-

pliant cette grandeur par  $\frac{1}{2} MS = \frac{\sqrt{2rx}}{2}$ ,

l'on aura  $\frac{rxdx}{2\sqrt{2rx-xx}}$  pour la valeur du petit triangle  $Sms$  qui est la différentielle de l'espace extérieur  $AMSA$ . Mais cette différentielle est la même que celle du segment  $AN$ . Ce que je démontre ainsi.

\* Soit le demi-cercle  $AND$ ; ayant mené du point  $A$  la corde  $AN$ , & une autre infiniment proche  $An$ ; soit décrit du rayon  $AN$  le petit arc  $NO$ , & menée l'ordonnée  $NP$ , il est clair que les deux triangles  $APN$ ,  $NO$  seront semblables; donc  $PN (\sqrt{2rx-xx})$ .

$PA(x) :: On \left( \frac{rdx}{\sqrt{2rx}} \right) NO = \frac{rxdx}{\sqrt{2rx} \times \sqrt{2rx-xx}}$ ,

& multipliant cette grandeur par  $\frac{1}{2} AN = \frac{\sqrt{2rx}}{2}$

\* FIG. 7.



$\frac{\sqrt{2rx}}{2}$ , il viendra comme auparavant

$\frac{rx dx}{2\sqrt{2rx-xx}}$ ; donc &c. D'où l'on voit que

l'espace extérieur  $AMBEA$  est égal au demi-cercle générateur; Donc l'espace Cycloïdal est triple de son cercle générateur.

L'on auroit encore plus facilement cet espace extérieur  $ABF$ , en considérant les deux triangles semblables  $APN$ ,  $MRm$ ; & faisant  $Rm$ ,  $\left(\frac{2r dx - x dx}{\sqrt{2rx-xx}}\right) MR. (dx) :: PN$

$(\sqrt{2rx-xx}). PA(x)$ ; donc  $\frac{2r dx - x dx}{\sqrt{2rx-xx}}$

$= dx \sqrt{2rx-xx}$ , car le premier membre de cette égalité est la différentielle de l'espace extérieur, & l'autre est celle du segment  $APN$ ; donc &c.

Pour marquer la fécondité de ce calcul, voici encore deux autres manières de mesurer l'espace Cycloïdal. 1. L'on multipliera  $2r-x$  ( $PD$ ) par  $\frac{2r dx - x dx}{\sqrt{2rx-xx}}$  ( $Rm = On +$

$Nn$ ) & l'on aura  $\frac{2r dx - x dx}{x} \sqrt{2rx-xx}$

$= \frac{2r dx \sqrt{2rx-xx}}{x} - dx \sqrt{2rx-xx}$ : Mais

si l'on multiplie le numérateur & le dénominateur du premier membre par  $2r-x$ , il

viendra  $\frac{4r dx - 2r x dx}{\sqrt{2rx-xx}}$ ; L'on aura donc

pour la différentielle de l'espace  $\frac{4r dx}{\sqrt{2rx-xx}}$

$\frac{2x dx}{\sqrt{2rx-xx}} - dx \sqrt{2rx-xx}$ . Or la première

re partie est octuple de la différentielle du demi-cercle générateur. \* Car soit décrit le demi-cercle  $AMB$ , soient menez du centre  $C$  deux rayons infiniment proches  $CM$ ,  $Cm$ , & des points  $M$ ,  $m$ , deux ordonnées  $MP$ ,  $mp$ , &  $MR$  parallèle à  $AB$ : L'on dira à cause des triangles semblables  $CPM$ ,  $MRm$ ;  $PM$  ( $\sqrt{2rx-xx}$ )  $CM$  ( $r$ ) ::  $RM$  ( $dx$ ).  $Mm = \frac{r dx}{\sqrt{2rx-xx}}$ , & multipliant par  $\frac{1}{2} r$ , l'on aura  $\frac{r r dx}{2 \sqrt{2rx-xx}}$  pour le petit secteur

$MCm$ ; donc &c. La seconde partie est quadruple de la différentielle du même demi-cercle, & la troisième est encore égale à la différentielle de ce même demi-cercle; donc la différentielle de l'espace Cycloïdal est triple de celle du cercle générateur; donc &c.

2. L'on multipliera  $PM = \sqrt{2rx-xx} + z$  (en nommant l'arc  $AN$ ,  $z$ ) par  $Pp = dx$ , & il viendra  $dx \sqrt{2rx-xx} + z dx$  pour la différentielle de l'espace, dont l'intégrale est encore triple du demi-cercle générateur. Ce que je prouve ainsi.

L'on voit d'abord que le premier membre est la différentielle du demi-cercle générateur. Mais pour avoir l'intégrale du second  $z dx$ , j'y ajoute  $x dz - x dz$ , ce qui donne  $z dx + x dz - x dz$ : or la somme des  $z dx + x dz$  est égale à  $zx$ ; il ne reste donc plus qu'à connoître  $x dz$  qui est double de la différentielle du demi-cercle générateur; Car  $dz = \frac{r dx}{\sqrt{2rx-xx}}$

$\frac{r dx}{\sqrt{2rx - xx}}$ , donc  $x dz = \frac{r x dx}{\sqrt{2rx - xx}}$  ;  
donc &c.

Si l'on prend  $AP = \frac{1}{2} CA = \frac{1}{2} r$  ; je dis que l'espace  $AMP$  sera quarrable indépendamment du cercle. Car le parallélogramme  $APMI = \frac{1}{2} ry + \frac{1}{2} rz$ , duquel ôtant l'espace  $AMI$  qui vaut le segment  $APN = \frac{1}{2} rz - \frac{1}{4} ry$  il viendra pour la valeur de l'espace cherché  $APM$ ,  $\frac{1}{4} ry = \frac{1}{4} rr \sqrt{\frac{1}{4}}$  parce qu'alors  $y = r \sqrt{\frac{1}{4}}$ , donc cet espace est au triangle  $CAN$  comme 3 est à 2 ; Ce que *M. Huygens* a découvert le premier.

Si le point  $P$  tombe au centre  $C$ , alors le parallélogramme  $AM$  sera égal à  $rr + rz$ , parce qu'en ce cas  $y = r$  ; donc l'espace  $AMN$  borné par le cercle, par la roulette & par la ligne  $MN$  est égal au quarré du rayon.

Si l'on veut maintenant trouver la longueur de la Courbe  $FTA$  formée par l'enveloppement du fil ou de la droite  $BEF$  autour de la Courbe  $BMA$ , l'on considèrera que les deux secteurs  $VmS$ ,  $tmT$  sont semblables ; ainsi

$$mV (\sqrt{2rx}) . VS \left( \frac{r x dx}{\sqrt{2rx} \times \sqrt{2rx - xx}} \right) :: m t$$

$$(2 \sqrt{2rx}) . tT = \frac{2 r x dx}{\sqrt{2rx} \times \sqrt{2rx - xx}} \text{ qui}$$

est la différentielle de la Courbe : mais cette différentielle est double de celle de la corde menée du point  $N$  au point  $D$  ; donc la portion  $FT$  est double de cette corde, & par conséquent la Courbe entière  $FTA$  est double du diamètre  $AD$ .

Pour avoir l'espace  $FTAEF$ , l'on multipliera  $Tt$  ( $\frac{2rx dx}{\sqrt{2rx} \times \sqrt{2rx - xx}}$ ) par  $\frac{1}{2} m t$

( $\sqrt{2rx}$ ); & il viendra  $\frac{2rx dx}{\sqrt{2rx - xx}}$  pour le petit secteur  $t m T$ , de laquelle valeur ôtant celle du secteur  $m V S = \frac{rx dx}{2 \sqrt{2rx - xx}}$  il restera

$\frac{3rx dx}{2 \sqrt{2rx - xx}}$  pour le petit trapeze  $t V S T$  qui est la différentielle de l'espace; mais il est visible que cette différentielle est triple de celle du demi cercle  $AND$ ; donc &c.

Si l'on vouloit avoir immédiatement la valeur du petit trapeze  $t V S T$ , on multiplieroit  $t T + V S$  par  $\frac{1}{2} ST$ , & l'on trouveroit encore

$\frac{3rx dx}{2 \sqrt{2rx - xx}}$ ; donc &c.

L'on pourroit conclurre de ce que l'on vient de dire, que la Courbe  $ATF$  est une Cycloïde semblable formée par le développement de la premiere, & mise dans une position renversée.

#### QUATRIÈME MANIERE.

L'on trouvera encore la longueur de la Cycloïde en se servant de la formule

$\frac{dx^2 + dy^2 \sqrt{dx^2 + dy^2}}{-dy}$  qui est l'expression générale du rayon de la développée trouvée dans

la 4. Section du Livre de l'Analyse des infiniment petits, car substituant à la place de  $dy^2$  &  $ddy$  leurs valeurs, l'on aura pour celui de la Cycloïde qui est la tangente  $TM$ ,  $2\sqrt{4rr - 2rx}$ ; car nommant  $DP$ ,  $x$ ; alors  $AN = \sqrt{4rr - 2rx}$ ; &

& faisant  $x=0$ , ce rayon devient  $=4r$ ; donc  
&c.

L'on pourroit employer ces différentes Methodes pour rectifier toutes les Courbes dont on connoît la nature, si l'on avoit des regles générales pour prendre l'intégrale d'une différentielle quelconque, comme chacun le pourra voir facilement, s'il le veut experimenter.

~~~~~

## R E M A R Q U E S

*Sur la Mesure & sur la Pesanteur de  
l'Eau.*

Par M. DE LA HIRE.

\* 1°. **E**Xtrait des Memoires de M. Picard:  
171 p°.  $\frac{1}{2}$  d'eau d'Arceuil, pesent  
6l. 14°. 48r. 28ra.

Je trouve delà que le pied cubique d'eau  
d'Arceuil pese 1113°. 38ro. 208ra. ou 69l. 9°. 38r. 208ra.

Monsieur Picard ajoute que la Pinte de Paris sur la mesure de l'Hôtel de Ville, contient  
47po.  $\frac{3}{4}$ .

Mais que la Chopine de l'Hôtel de Ville  
contient à très-peu près 24po.

Et si l'on pose que la Pinte contienne 47po.  $\frac{3}{4}$   
elle pesera de la même eau 30°. 38r.  $\frac{1}{2}$  ou 1l.  
14°. 38r.  $\frac{1}{2}$ .

K 3

Mais

\* 3. Septemb. 1701.

Mais si l'on suppose qu'elle contienne 48 pouces par rapport à la Chopine on trouvera qu'elle pèsera  $30^{\circ} . 78^{\text{r}} . \frac{1}{2}$  ou  $1^{\text{l}} . 14^{\circ} . 78^{\text{r}} . \frac{1}{2}$ .

2°. Le 5. Août 1701. chez M. *Boulduc*, nous avons pesé une Pinte d'eau de Riviere dans une Pinte toute neuve qui servoit d'étalon au Potier d'étain.

L'eau étant tiede pesoit  $31^{\circ} . 48^{\text{r}} .$

L'eau étant fraîche pesoit  $31^{\circ} . 6$

Le 20. Août 1701. à l'Hôtel de Ville avec M. *Boulduc*, nous avons mesuré dans l'Etalon de bronze une Pinte d'eau de riviere; & l'ayant pesée exactement avec une bonne balance, en différentes manieres, elle pesoit  $1^{\text{l}} . 14^{\circ} . 38^{\text{r}} . 28^{\text{ra}}$ . l'eau n'étoit ni froide ni chaude.

Cette mesure s'accorde exactement avec celle que j'avois concluë des observations de M. *Picard*, d'autant que la difference de peu de grains qui s'y trouve, peut venir de ce que l'eau d'*Arcueil* dont M. *Picard* s'étoit servi, pèse un peu plus que l'eau de la riviere, & elle étoit peut-être un peu plus froide que celle de riviere dont nous nous sommes servis en dernier lieu.

# DE LA MÉRIDIENNE

*De l'Observatoire Royal prolongée jus-  
ques aux Pyrénées.*

Par M. CASSINI.

\* **L**E Voyage que nous avons fait cette an-  
née par Ordre du Roi dans les Provin-  
ces meridionales de son Royaume, a été pour  
y prolonger la ligne meridienne de l'Observa-  
toire Royal, la mesurer jusqu'aux extrémités  
de la France par des operations Géometriques ;  
la diviser en degrez de la circonference de la  
terre par les observations des Astres ; exami-  
ner si ces degrez sont égaux entr'eux, comme  
on l'a supposé jusqu'à ce siecle, ou s'ils sont  
sensiblement inégaux, comme plusieurs Mathe-  
maticiens Modernes le supposent ; si les lignes  
perpendiculaires marquées par le fil à plomb  
dans nos Instrumens Géometriques & Astrono-  
miques sont toutes dirigées au même point que  
l'on prend pour centre de la terre, suivant  
l'hypothese commune, ou si de divers lieux  
fort éloignez les uns des autres, elles se diri-  
gent à des points sensiblement differens, com-  
me plusieurs Modernes le conjecturent.

Ces dernieres recherches auroient dû être  
faites avant que d'entreprendre de calculer tout.

K 4

le

\* 14. Nov. 1701.

le circuit de la terre par la mesure d'une petite partie. Car à moins que ces deux dernières hypothèses des Anciens de la rondeur de la terre, & de la direction de la perpendiculaire au même centre ne soient bien établies, il n'y a point d'assurance dans la pratique de cette méthode. Ainsi *Pline* avoit quelque raison d'admirer la hardiesse de l'Esprit humain, de tenter des choses si difficiles. La seule entreprise d'examiner par les observations ces deux hypothèses est grande: & sans la Protection d'un si grand Roi que le nôtre, elle seroit temeraire. L'hypothèse de la rondeur de la terre; comme composée de continens, & de mers, celle de son détachement du Ciel, & de son équilibre dans l'air fut fondée premièrement sur l'observation du mouvement apparent de tous les Astres d'Orient en Occident, & sur la diversité de la constitution apparente du Ciel, dans les Voyages faits à peu près sous le même meridian vers le Midi, & vers le Septentrion. Cette diversité comparée à la longueur du chemin, donna les premières vûes de mesurer la circonférence de la terre par l'observation des Astres. Nous n'avons pas d'Auteur plus ancien qui soit entré dans le détail de cette méthode qu'*Aristote*, qui en parle comme d'une chose déjà pratiquée de son temps. Voici ce qu'il en dit à la fin du second Livre, de *Cælo*.

„ Il est manifeste, dit-il, par l'apparence  
 „ des Astres, que non seulement la terre est  
 „ ronde, mais qu'elle n'est pas d'une gran-  
 „ deur demesurée. Car pour peu de chemin  
 „ que nous faisons vers le Midi & vers le  
 „ Septentrion, l'horizon se diversifie, & les  
 „ étoiles verticales que nous avons sur la tête  
 „ font



„ font un grand changement , & ne font plus  
 „ toutes les mêmes celles que nous voyons al-  
 „ lant au Septentrion , & allant au Midi. Car  
 „ il y en a que l'on voit en *Egypte* & proche de  
 „ *Cypre* , que l'on ne voit point dans les Pais  
 „ Septentrionaux ; & du côté du Septentrion ,  
 „ il y a des étoiles que l'on voit toujours sur  
 „ terre , & qui se couchent dans les lieux que  
 „ nous venons de nommer. C'est pourquoi  
 „ ceux qui croient que la mer qui est aux co-  
 „ lonnes d'*Hercule* vase joindre & faire la mê-  
 „ me mer avec celle qui est aux *Indes* ne croient  
 „ pas des choses bien incroyables.

„ Les Mathématiciens , ajoute-t-il , qui tâ-  
 „ chent de calculer la grandeur de la circon-  
 „ ference de la terre , la font monter à 400,000.  
 „ stades. D'où l'on infere que non seulement  
 „ la terre est sphérique , mais qu'elle n'est pas  
 „ trop grande à l'égard des autres Astres.

Ce dût être le langage des Auteurs de cette dimension. Car *Aristote* , bien loin de supposer que la terre est un Astre , refute aux Chapitres précédens les *Pythagoriciens* d'*Italie* , qui mettoient la terre au nombre des Astres , & lui attribuoient un mouvement autour du centre du Monde , d'une manière à faire l'alternativé des jours & des nuits : Ce qu'ils n'auroient pas fait , s'ils n'eussent supposé la terre à peu près de la figure & de la grandeur des Astres. Cette dimension rapportée par *Aristote* pourroit donc être attribuée aux *Pythagoriciens* Auteurs de cette hypothèse. Elle est presque le double plus grande qu'elle ne fut trouvée dans la suite par d'autres Mathématiciens : Mais elle ne parut pas assez grande en un temps qu'il y avoit encore des Philosophes , qui après *Xeno-*

226 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
*phanès*, doutoient si elle n'étoit pas d'une grandeur immense.

*Immensum ne patent terra ima, & largior aether.*

Les apparences des Astres rapportées par *Aristote* suggerent deux manieres d'entreprendre la mesure de la terre, qui furent pratiquées aux siecles suivans. Une par les observations des Astres situez au vertical d'un lieu & éloignez du vertical d'un autre ; L'autre par l'observation des Astres à l'horizon d'un lieu, & élevez sur l'horizon d'un autre.

*Eratostenès* sous le Roi *Ptolemée Evergete*, pratiqua la premiere maniere. Il savoit qu'au temps du Solstice d'Eté le Soleil passoit par le point vertical de la Ville de *Sienne*, située aux confins de l'*Ethiopie* sous le tropique du Cancer. Il y avoit un Puits construit pour cette observation, qui sur le midi au jour du Solstice étoit par dedans tout éclairé du Soleil, & il étoit notoire qu'à 150. stades à la ronde, les stiles élevez à plomb sur une surface horizontale ne faisoient point d'ombre. Ayant supposé *Alexandrie* & *Sienne* sous le même meridien, il observa à *Alexandrie* au jour du Solstice, la distance du Soleil au point vertical par l'ombre d'un stile élevé à plomb du fond d'un hemisphere concave. Il trouva que cette distance étoit la 50<sup>e</sup>. partie de la circonference d'un grand cercle ; d'où il conclut que la distance entre ces deux Villes étoit la 50<sup>e</sup>. partie de la circonference de la terre. Ayant supputé cette distance de 5000. stades, il eut toute la circonference de 250. 000. stades.

L'ayant partagée également en 360. degrez  
il

il eut 694. & presque demi, au degré. Mais à la place il prit dans la suite le nombre rond 700. ne croyant peut-être pas pouvoir répondre de 5. à 6. stades dans un degré.

Et multipliant 700. stades par 360. degrez, il eut dans la circonference 252000. stades, qui est la dernière dimension d'*Eratostenès* dont il se servit ordinairement. *Hipparchus* s'en servit aussi, quoiqu'il jugeât qu'il falloit ajoûter à cette dimension 2520. stades.

*Dionosidore* ne fit que prendre pour demi-diametre de la terre la sixième partie de sa circonference tirée de la dernière dimension d'*Eratostenès*, dans la Lettre qui fut trouvée dans son tombeau après sa mort; pour faire accroire qu'il étoit descendu au centre de la terre, & qu'en ayant mesuré la distance, il l'avoit trouvée de 42000. stades.

*Vitruve*, & *Plin* réduisent la mesure d'*Eratostenès* de 252000. stades à 31500. milles Romains en raison de 8 stades par mille.

*Possidone* au temps de *Pompée* le grand entreprit de mesurer la circonference de la terre par la seconde maniere, qui est par les observations horizontales.

Il aprit que l'étoile *Canopus* à *Rhodus*, ne faisoit que paroître à l'horison, & se couchoit aussi-tôt, & qu'à *Alexandrie*, qu'il supposa sous le même meridien, elle s'élevoit sur l'horizon de la quarante-huitième partie de la circonference du Ciel, qui répond à une semblable partie de la circonference de la terre de 7 degrez & demi, & supposant la distance entre ces deux Villes de 5000. stades, il eut toute la circonference de la terre de 240,000. stades. C'est la première dimension de *Possidone* rappor-

tée par *Cleomedès* Auteur du même siècle, ajoutant qu'il la faut diminuer, si l'intervale (en stades) ne se trouve pas si grand.

*Strabon* qui écrit la Géographie sous *Auguste & Tibère*, attribue à *Possidone* la dimension de la circonférence de la terre de 180,000. stades, qui sont en raison de 500. stades au degré. On étoit en peine d'en savoir le fondement. Le voici. Ce même Auteur témoigne dans un autre endroit, qu'*Eratostenès* avoit mesuré la distance entre *Rhodes & Alexandrie* par des instrumens, & qu'il l'avoit trouvée de 3750. stades. La prenant pour la quarante-huitième partie de la circonférence de la terre suivant *Possidone*, elle résulte de 180,000. stades. On la peut donc appeller la dernière dimension de *Possidone*, dans laquelle on employa sa dimension en degrez, & celle d'*Eratostenès* en stades. Elle fut reçue de *Marin de Tyr* Géographe, & d'autres. On l'attribue communément à *Ptolemée*, parce qu'il s'en servit dans sa Géographie. Nous ne rapporterons pas ici ce que l'on oppose à ces méthodes. Nous remarquerons seulement comme une chose qui le mérite, qu'ayant pris précisément le milieu entre les dernières dimensions d'*Eratostenès*, & de *Possidone*, nous avons dans un degré de la circonférence de la Terre 600. stades. Dans une minute 10. stades, qui au compte de *Vitruve* & de *Plin*, font un mille & un quart de la mesure ancienne *Romaine*. Or le mille moderne d' est égal à un mille & un quart des milles anciens, la distance de 25. milles que les Anciens comptoient entre *Boulogne & Modene*, étant estimée présentement de 20. milles modernes. Le mille moderne d'*Italie* est de 10. sta-

stades qui font une minute suivant la dimension moyenne entre celle d'*Eratostenès* & de *Possidone*. Le degré de la circonference de la terre , aura donc à ce compte 60. milles Italiens modernes , & 75. milles anciens. La circonference , 21600. milles modernes , 27000 milles anciens.

Donnant à la lieue moyenne trois milles anciens , on aura dans un degré 25. lieues , & dans toute la circonference 9000. lieues.

Après *Eratostenès* & *Possidone* , plusieurs ont employé les hauteurs du Pôle , dans la dimension de la terre. Les Mathématiciens du Caliphe *Almamon* ayant pris les hauteurs du Pôle dans les campagnes de *Singar* , aux extrémités de deux degrés , trouverent 56. milles dans un degré , & 56. milles & 2. tiers dans l'autre , & jugerent leur mesure plus petite que celle de *Ptolémée* de 10. milles. Cela est bien différent de toutes les autres dimensions , qui la font beaucoup plus grande. Le Géographe de *Nubie* Auteur du 12. Siècle donne 25. lieues au degré. Cette dimension fut confirmée par celle de *Fernel*. Cet Auteur se servit aussi des hauteurs du Pôle tirées des observations du Soleil , pour trouver un lieu à peu près sur le méridien de *Paris* qui en fut éloigné d'un degré , & en ayant mesuré la distance par la révolution des roues , il la trouva de 56747. toises , en ayant rabatu les détours à discrétion. Suivant l'estime des gens du Pais , cette distance étoit de 25. lieues.

*Snellius* qui surpassa en exactitude ceux qui l'avoient précédé , se servit des hauteurs du Pôle observées à *Alcmger* & à *Bergopzoom* , différentes entre elles d'un degré 11 minutes &

demi , & en ayant mesuré les distances par les triangles , il trouva dans un degré 56946. toises de 6. pieds du *Rhin* chacune , & par la difference entre *Alcmaer* & *Leiden* à la distance d'un demi-degré , il trouva 57020. toises en un degré. Il prit pour milieu entre les deux 57000. toises , M. *Picard* ayant égard à la difference entre le pied du *Rhin* , & le pied de *Paris* , le réduit à 55021. toises.

Il y a plus de 42. ans que je fis plusieurs essais à *Bologne* , & à *Ferrare* de la mesure de la terre , tant par les observations verticales que par les horizontales , qui sont rapportées par le Pere *Riccioli* dans sa Géographie. Ce ne fut que pour la transporter dans la ligne meridienne que je traçai dans la grande Eglise de *S. Petrone* pour en tenir compte , s'il le falloit , dans les observations du Soleil. A la distance de 34. toises & deux pieds de *Paris* , où est le milieu de l'image du Soleil au Solstice d'hiver , je marquai la 600000<sup>e</sup>. partie de la circonference de la terre qui est en raison de 57222. toises au degré.

Les PP. *Riccioli* , & *Grimaldi* firent aussi en plusieurs manieres & avec un grand soin la mesure de la terre , comme il est rapporté au long dans sa Géographie reformée. M. *Picard* l'a reduite à 64363. toises de *Paris* au degré.

Mais rien n'a jamais été fait en ce genre avec plus de soin & d'exactitude que ce qui fut executé par M. *Picard* au nom de l'Academie Royale des Sciences immédiatement après son institution dans les trois premieres années.

Il mesura exactement par des triangles les distances entre les paralleles de *Malvoisine* , de

Sour-

*Sourdon* & d'*Amiens*, peu éloignez du meridien de *Paris*, & il observa avec un instrument de 10. pieds les distances d'une même étoile fixe du Zenith de ces 3. lieux. Par la distance entre *Malvoisine* & *Sourdon*, il détermina la grandeur d'un degré de 57064. toises, & par celle de *Malvoisine* à *Amiens* de 1 degré 22' de 57052. toises. Il prit le milieu entre les deux de 57060. toises. La base qu'il mesura actuellement est 11 fois plus grande que celle de *Snellius*. Il n'employa dans la même distance qu'un petit nombre de triangles à proportion du grand nombre qui avoit été employé par *Snellius*. Il se servit d'Instrumens divisez plus finement, & garnis de Lunettes, qui augmentent & distinguent mieux les objets éloignez, & servent à déterminer les distances avec une précision plus grande. Il y employa avec plusieurs aides les plus belles saisons de trois années. J'assistai à plusieurs de ces observations Géographiques & Astronomiques que nous concertâmes ensemble.

La mesure de la grandeur du degré de la circonference de la terre, établie par l'Académie, pouvoit déjà servir à corriger les différences de longitudes trouvées jusques alors par une mesure trop courte. Mais on jugea de devoir encore entreprendre sous la Protection du Roi à déterminer les longitudes des lieux particuliers par des observations Astronomiques faites en même temps à l'Observatoire Royal & ailleurs. Les Eclipses de Lune qui peuvent servir à cet usage, étant trop rares pour en pouvoir profiter en peu de temps : On se proposa d'y employer les observations des Eclipses des Satellites de Jupiter dont nous ayons déjà donné

né des Tables & des Ephemerides immédiatement après l'Institution de l'Academie. Pour une Eclipsé de Lune, il en arrive plus de cent d'un seul Satellite. On trouva par experience que le temps de leurs Immersions dans l'ombre de Jupiter, & de leurs Emerfions, se peut déterminer avec plus de précision & d'évidence, que dans les Eclipses de Lune. L'Academie Royale en fit aussi-tôt des essais qui la satisfirent. On eut d'abord correspondance de ces observations avec l'Academie de *Toscane* qui étoit alors florissante, & avec la Societé Royale d'*Angleterre*. Il n'y eut point d'Astronome en *Europe*, qui étant pourvû d'Instrumens nécessaires, ne prit part à ces observations, & ne les communiquât à l'Academie. Le Roi envoya faire des observations non seulement sur les côtes de *France*, mais dans les lieux les plus considerables des quatre Parties du Monde. Des Ordres Illustres par la Profession des Sciences Divines & Humaines projetterent de faire servir ces observations à la Religion dans les Royaumes de l'Orient où l'Astronomie est en réputation. Leurs observations aussi-bien que celles de la plûpart des Astronomes d'*Europe* comparées avec celles qui ont été faites en même temps à l'Observatoire Royal de *Paris*, ont servi à déterminer en peu de temps les differences de longitude entre cette Ville & la plûpart des Villes les plus considerables.

Rien n'étoit plus important que d'avoir un meridiem bien tracé, comme l'on pouvoit tracer celui de *Paris* par toute la *France*, pour le prendre pour terme des longitudes Orientales & Occidentales de tous les autres lieux de la Terre, comme le plus illustre de l'Univers. Les  
Géo-



Géographes different entr'eux dans le terme du meridiem de *Paris* dans la Méditerranée de toute l'étendue du Pais qui est entre l'embouchure Orientale du *Rhône*, où *Ptolémée* le dirige dans sa Géographie, & la Ville de *Valence* en *Espagne* par où le tire *Hondius* dans sa Carte de l'*Europe*. Ne falloit-il pas éclaircir un point d'une si grande consequence dans la Géographie, & même dans l'Astronomie pour la réduction des Tables Astronomiques d'un meridiem à l'autre, & pour la détermination des Eclipses?

On a commencé ce travail par la Description de la Meridienne à l'Observatoire, tant par les observations du Soleil aux Solstices, que par les étoiles fixes.

On l'a observée plusieurs fois, & en plusieurs manieres, & on a pris un milieu entre les differences. On a pris les angles que la Meridienne fait aux lieux éloignez que l'on voit de l'Observatoire, dont les distances avoient été déjà déterminées dans la premiere dimension. On a tiré de ces lieux-là des perpendiculaires à la Meridienne, qui en déterminent la distance Orientale & Occidentale, & coupent la portion de la Meridienne interceptée entre les paralleles de ces lieux & de l'Observatoire. Et en calculant la distance de ces lieux-là entr'eux & l'angle de la distance à la Meridienne: on a visé aux lieux plus avancez vers le Midi, où l'on est allé faire les mêmes observations, formant toujours des triangles des précédentes, avec les suivantes. L'on a continué ces triangles sans interrompre jamais la suite jusqu'à l'extrémité meridionale du Royaume. Quand il ne se présentoit point d'objets

jets remarquables propres pour la continuation des triangles, on élevoit des Arbres, des Pyramides ou d'autres marques visibles de loin dans les lieux qu'on trouvoit propres pour cet effet.

Par cette maniere on a tracé la Meridienne depuis *Paris* jusques aux plus hautes montagnes des *Pirenées* qui separent le *Rouffillon* de la *Catalogne*. Les Villes principales qui sont les plus proches du meridiem de *Paris* où l'on a fait des observations du Ciel, sont *Orleans*, *Aubigny*, *Lourges*, *Aubusson*, *Aurillac*, *Ribodés*, *Alby*, & *Carcassonne* qui est précisément dans le meridiem de *Paris*, *Perpignan* & *Collioure*, se sont trouvez beaucoup plus à l'Orient qu'on ne le supposoit. Nous n'avons pas négligé la difference entre les lignes tirées par les hautes montagnes & les arcs de la circonférence de la terre qui leur répondent.

Dans les plus hautes montagnes, où l'on a été obligé de monter, on a observé la hauteur du vis argent dans le Barometre pour le comparer à la hauteur qui en étoit observée en même temps à *Paris*, & en déterminer les hauteurs par la comparaison avec les observations faites ailleurs sur des montagnes dont on avoit mesuré la hauteur sur la surface de la mer par le nivellement. On a aussi observé les mêmes hauteurs par le moyen des distances d'une montagne à l'autre & de leurs hauteurs apparentes prises par les Instrumens, continuant ces observations jusqu'à la mer; la plus haute de toutes ces montagnes est celle de *Canigon* qui est presque toujours couverte de neige. On y avoit élevé dans la façon propre par Ordre du Roi, une espece de Pyramide qui la faisoit  
con-

connoître de loin. Sa véritable hauteur tirée de l'apparente au bord de la mer, & de sa distance a été trouvée de 1440. toises qui sont au moins 15. stades. *Cleomedes* dit qu'il n'y a point de montagne dont la hauteur perpendiculaire excède 15. stades ; ainsi cette montagne au jugement de cet Auteur passe pour une des plus hautes.

Nous ne rapporterons pas ici les observations que nous avons faites des grandes irrégularitez de la direction de l'Aiman dans les montagnes du *Limofin*, de l'*Auvergne* & du *Rouergue* abondantes en mines de fer. Il ne faut pas s'étonner si les Cartes de ces Provinces sont mal orientées. Elles ne sauroient être autrement, si on les a dressées sur la Bouffole, comme l'on fait communément.

Nous avons fait des observations des hauteurs du Pôle autour de notre Meridienne dans toutes les Villes principales où nous avons fait quelque séjour dans un temps favorable, & particulièrement dans les lieux déterminés par nos triangles pour conférer les différences des latitudes trouvées dans le Ciel avec ces dimensions prises sur terre. Nos dimensions sur la terre ont été confirmées par une base de 7200. toises mesurée actuellement, & par la continuation des triangles jusques au bord de la mer où nous l'avons prise.

De peur de nous trop éloigner de la Meridienne dans un si long chemin nous l'avons examinée par de nouvelles observations aux lieux où nous l'avons pû faire commodément, & nous n'y avons pas trouvé une différence sensiblement plus grande que celle qu'on y trouve

trouve ordinairement, la traçant plusieurs fois par diverses observations dans le même lieu.

Nous avons eu correspondance d'observations des Eclipses des Satellites de Jupiter faites à *Paris*, à *Lyon*, & à *Marseille* en même temps que nous les faisions aux environs de la ligne meridienne, & nous avons trouvé que la difference des meridiens déterminée par ces observations s'accordoit avec celles que nous avons trouvé par les triangles qui ont servi à tracer la Meridienne à peu près dans les termes que s'accordent ensemble celles qui se font dans un même lieu par differens Observateurs. Nous avons fait le même usage de l'Eclipse de Lune du 22 Février de cette année 1701.

Et comme la difference des Meridiens entre *Sette* & *Montpellier* avoit été déterminée par les observations des Satellites de Jupiter qui avoient été faites par M. *Picard* en ces lieux-là, comparées avec celles que nous avons faites en même temps à *Paris*; nous avons voulu trouver la difference de ces Meridiens par la continuation des triangles jusqu'à ces lieux-là, & calculant leurs distances de nôtre Meridienne, & la réduisant en minutes & en secondes, nous l'avons trouvée aussi d'accord avec celles que nous avons déterminées par les Satellites de Jupiter.

Pour avoir les degrez de la circonference de la terre entre le parallele de l'Observatoire & le terme de nôtre mesure dans les *Pirenees*, nous nous sommes servis à *Collioure* d'un Instrument de 10 pieds de rayon pour observer plusieurs étoiles fixes proche du Zenith, &

des comparer à celles qui nous restoient à observer à *Paris* par le même Instrument l'année suivante dans la même saison. En attendant nous nous sommes servis de celles qui avoient été prises à *Paris* par les Instrumens ordinaires, & nous avons trouvé qu'il y a 6 degrez 18 minutes.

Dans l'hypothese de l'égalité des degrez du Meridien tracé sur la surface de la terre, l'on auroit à chaque minute 954. toises, 5 pieds, 2 pouces 5 lignes, & à chaque degré 57292. toises. Mais il y a des Mathematiciens très-célèbres qui doutent de cette hypothese, aussi bien que de celle de la direction des perpendiculaires au même point. Après que le globe de Jupiter nous a paru un peu ovale, on a douté si la terre ne seroit pas aussi un peu ovale, & après que les observations faites par l'Academie Royale à la *Cayenne*, au *Cap verd*, & aux Isles de l'*Amerique*, nous ont appris que les Pendules de la même longueur font les vibrations plus lentes proche de l'Equinoxial qu'aux grandes distances. M. *Huygens*, & M. *Newton* ont tâché d'expliquer ce Phenomene par une hypothese qui fait l'Equinoxial plus grand que les Meridiens, de sorte que la figure seroit aplatie par des Poles, au lieu que M. *Einsenschmid*, en comparant les diverses dimensions des degrez faites en divers lieux, pour les accorder ensemble, a supposé la terre ovale plus longue d'un Pôle à l'autre que suivant le diametre de l'Equinoxial, faisant les meridiens de figure elliptique dont les perpendiculaires sont dirigées à divers points de l'axe. Il attendoit pourtant le succès de nos dimensions, pour en pouvoir juger avec plus de certitude. La

La grandeur de la minute que nous venons de trouver dans l'hypothese de l'égalité dans l'intervalle qui est entre *Paris* & le parallele de *S. Elme*, excède celle que *M. Picard* trouva dans la même hypothese dans l'intervalle qui est entre *Malvoisine* & *Sordon*, qui fut de 951 toises  $\frac{1}{4}$  & encore plus celle qui se tire des observations faites à *Sordon* & à *Amiens* qui donnent la minute de 947 toises. L'excès de la nôtre sur la premiere est presque de 4 toises 5. pieds; sur la seconde de 7. toises & presque 5. pieds: ainsi plus l'on s'éloigne de l'Equinoxial, plus les dimensions sur terre diminuent, ce qui semble être favorable aux hypotheses modernes que nous venons de rapporter, il est difficile d'en trouver une qui accorde ces differences assez bien ensemble.

Cependant il paroît par les comparaisons que nous avons fait que dans l'espace entre les paralleles d'*Amiens* & de *Colioure* qui est de 7. degrez & plus d'un tiers, la mesure des degrez en allant vers l'Equinoxial, augmente de sorte que le degré suivant excède le précédent de sa 800. partie, qui dans cet intervalle varie de 71. toises & 2. pieds, à 72. toises & un pied. Le degré pris de l'Observatoire vers le Septentrion nous donne 57055. toises & le degré pris de l'Observatoire vers le Midi, donne 57126. toises & demie. Par cette progression, on trouvera la grandeur des autres degrez jusqu'à ce qu'elle continue uniformément. La minute depuis l'Observatoire vers le Septentrion, est 951. toises 5 pieds & demi. Elle est égale à la distance qui est entre l'Observatoire & l'Eglise de *S. Severin*, & peut passer pour le plus petit demi-diametre de *Paris*.

Vers

Vers le Midi, la minute depuis l'Observatoire est de 951. toises, 5. pieds 7. pouces & demi; l'augmentation d'un pouce &  $\frac{1}{2}$  en chaque minute monte à 72. toises d'un degré à l'autre.

Nous avons été surpris de voir que cette augmentation d'une 800<sup>e</sup>. partie d'un degré à l'autre à cette distance des Poles s'accorde avec l'augmentation des degrez de la veritable distance de la Lune de son Apogée aux mêmes degrez de distance entre 40. & 48. degrez, du Pole d'un côté, & de l'Apogée de la Lune de l'autre. Car en cet endroit les degrez de la vraie distance de la Lune à son Apogée augmentent aussi de l'un à l'autre de leur 800. partie. Ainsi les lignes perpendiculaires qui nous terminent les degrez mesurez dans le Ciel seroient analogues aux lignes des moyennes longitudes de la Lune, & les arcs de la circonference de la terre entre ces perpendiculaires seroient de la même grandeur que les arcs de la même circonference compris entre les lignes correspondantes à celles du moyen mouvement de la Lune.

Si cette égalité qui se trouve dans ces 7. degrez de la circonference de la terre, dont nous avons les dimensions, se trouve en toute la circonference, c'est ce que l'on n'oseroit avancer, quoique la Lune ait quelque part à l'Equilibre de la mer, auquel elle apporte quelque variation évidente dans le flux & reflux reglez sur ses mouvemens. Ce seroit un fait à verifier par des dimensions d'une plus grande étendue, si les autres Princes de la terre contribuoiént autant que le Roi à la perfection des Sciences.



# OBSERVATIONS ANATOMIQUES,

*Faites sur des Ovaires de Vaches, & de  
Brebis.*

Par M. DU VERNEY le jeune.

\* **A**YANT rencontré une portiere de Vache qui renfermoit un Fœtus d'environ quinze jours ou trois semaines, dont cependant toutes les parties étoient très-distinctes ; je m'appliquai avec soin à découvrir par où ce Fœtus avoit pû sortir de l'Ovaire. Les trompes & leurs pavillons me parurent un peu plus gonflés & plus spongieux qu'à l'ordinaire, un des Ovaires étoit de la grosseur d'une noix, se terminant un peu en pointe, & les côtez d'une substance dure garnie de vesicules & de quelques points blanchâtres. Tout le reste de l'Ovaire étoit d'une nature spongieuse couvert d'une membrane lisse & très-mince, semée de quelques Vaisseaux sanguins. Sur un des côtez de la substance vesiculaire, il me parut une tache d'un jaune obscur de la largeur d'une lentille, & je crus que ce pouvoit être l'endroit par où le Fœtus étoit sorti. J'y soufflai avec un tuyau, l'air y entra & fit gonfler tout l'Ovaire, je le pressai pour en faire  
sortir

\* 7. Septembre 1701.



fortir l'air & j'y en pouffai de nouveau. Non seulement l'Ovaire se gonfla comme un tissu vésiculaire, mais encore quantité de vaisseaux qui paroissent en sortir. Je reconnus que c'étoient des vaisseaux sanguins. Je me servis de cette ouverture pour entrer dans l'Ovaire. J'y rencontraï plusieurs cavitez très-unies qui paroissent comme des bassinets. J'y soufflai à mesure qu'elles se présenterent, & tous les vaisseaux que j'avois vûs auparavant s'enfioient de même. Tout le milieu de cet Ovaire étoit un corps spongieux qui se détachoit très-aisément, il recevoit des vaisseaux à sa base, & quelques-uns à sa pointe. Il paroît ordinairement en cet endroit un petit enfoncement disposé de telle maniere qu'il semble toujours qu'on y doive trouver une ouverture. Enfin voulant m'assûrer si je ne m'étois point trompé, cherchant la maniere de bien découvrir les œufs sans rompre leur enveloppe extérieure, & comment cette membrane s'émince & s'ouvre à l'endroit de la pointe de l'œuf, je vis deux ouvertures faites en fente à quelque distance l'une de l'autre fermées très-exactement par la membrane même dont un bord passoit sur l'autre en forme d'écaille de poisson.

Pour savoir si ces ouvertures se rencontroient toujours, je pris un autre ovaire qui me parut à peu près de même nature, & ne les y ayant pû trouver ni avec le tuyau ni avec le stilet j'en fis moi-même une avec la lancette. Mais j'eus beau y souffler, l'air ne passa point dans l'Ovaire ni dans ses vaisseaux. Je perçai en plusieurs endroits d'autres Ovaires & toujours en vain, ce qui me fit juger qu'on

ne rencontre pas toujours & en tout temps ces ouvertures. Il est pourtant vrai que je les ai encore découvertes depuis dans plusieurs sujets, ainsi que je le dirai dans la suite.

Pour démontrer les œufs sans rompre leur enveloppe extérieure, il faut séparer peu à peu l'Ovaire en deux à l'endroit où les vaisseaux y entrent. Alors presque tous les œufs se présentent comme d'eux-mêmes, & on a le plaisir de voir & d'observer de quelle manière la membrane est émincée, les endroits où elle est ouverte; & de concevoir aisément comment elle peut s'ouvrir dans un temps de maturité. Cela ne me paroît pas plus difficile à comprendre que la manière avec laquelle la plupart des gouffes s'entr'ouvrent pour donner issue à leurs graines, le calice au gland, & le brou des noix, & des châtaignes à ces fruits.

Ayant ouvert un Ovaire dont la grosseur dépendoit de celle du corps spongieux, je trouvai à la membrane intérieure une fente couverte par un rebord de cette même tunique en forme d'écaille & en y soufflant on remarquoit que l'air faisoit soulever & jouer la membrane extérieure.

En continuant de travailler sur la même matière, je trouvai un Ovaire dont la membrane de la pointe du corps spongieux étoit encore ouverte. Je voulus m'assurer si cette ouverture communiquoit avec les vaisseaux sanguins comme à l'observation précédente. Je soufflai par la veine spermatique, tout l'Ovaire se gonfla & je vis que le vent s'échapoit par cette ouverture. Il semble que le corps spongieux dont on vient de parler naisse à  
l'ex-

L'extrémité des vaisseaux, de même que certains champignons aux Arbres, ou comme l'éponge naît au Rosier sauvage & la noix de galle au Chêne par l'ouverture que fait la picquure de quelque Insecte à quelque vaisseau de ces Arbres, on peut dire aussi que les petites cavitez en forme de bassinets étoient comme les calices, ou les loges de quelques œufs qui en étoient sortis, & dont les bouches des vaisseaux étoient restées béantes; peut-être enfin étoit-ce des réservoirs qui devoient se remplir d'air, & d'esprits en de certains temps afin de donner plus de jeu à ces parties dans le temps de l'amour, & de faciliter dans d'autres la sortie des œufs. Ces faits, tout constants qu'ils étoient, furent contestez à l'Académie par une partie de Messieurs les Anatomistes, & ils souhaiterent de les voir sur de nouveaux sujets. Heureusement on m'apporta trois portieres de Vache dont l'une renfermoit un Fœtus d'environ trois semaines, ou un mois. Je trouvai dans une autre chaque Ovaire couvert par le capuchon & embrassé par le Pavillon de la trompe & ses expansions, mais il ne parût rien de particulier dans la troisième.

Les Ovaires de la portion qui renfermoit un Fœtus étoient bien différens l'un de l'autre.

Celui du côté où étoit le Fœtus, paroissoit flétri, peu vésiculaire, & la partie supérieure étoit unie, lisse & d'un jaune obscur.

L'autre Ovaire étoit tendu, entièrement vésiculaire, & comme transparent.

On observa à la pointe du premier Ovaire une petite ouverture qui avoit la forme d'un

demi-croissant & dont un rebord tomboit sur l'autre, j'y pouffai de l'air, mais il ne fit point gonfler l'Ovaire.

A la partie inferieure de cet Ovaire, on aperçut auprès d'un œuf une petite cicatrice rouge, la peau paroissoit émincée, & on y découvrit une petite ouverture qui avoit aussi la forme d'un demi-croissant. Le vent qu'on y pouffoit en faisoit bien soulever un des bords, mais il ne pénéroit point jusques dans l'Ovaire.

Comme cette petite ouverture étoit à l'endroit de l'œuf où la peau se trouve ordinairement émincée & que l'air ne pénéroit point, j'ouvris l'Ovaire en deux par l'endroit où entroient les vaisseaux, & l'œuf encore à demi enveloppé de son calice, ne resta attaché qu'au lieu où il paroît exterieurement transparent.

Après avoir vuidé la liqueur, j'y pouffai de l'air, la membrane se souleva, & l'air sortit d'entre le calice & l'œuf par l'ouverture exterieure que j'ai décrite. Je soufflai ensuite par l'ouverture exterieure, & le vent remplit la membrane de l'œuf.

Pour me confirmer dans cette experience, je la réitérai plusieurs fois & elle me réussit toujours.

J'examinai ensuite les Ovaires enveloppez par le pavillon de la trompe & ses expansions; j'y soufflai, le capuchon se leva & parut en l'air. Ayant ouvert un de ces Ovaires, j'y trouvai quantité de fibres si étroitement attachées à sa membrane, que quand on les en vouloit separer, elles se déchiroient en plusieurs endroits, ce qui me fit soupçonner que cette disposition n'étoit pas naturelle. Cet

Ovaire

Ovaire renfermoit un corps spongieux & quantité de vésicules dont la plupart paroissoient à demi sorties de leurs calices, & quand je soufflois, l'air passoit entre la membrane de l'œuf & le calice. J'ouvris ensuite l'enveloppe de l'autre Ovaire sur un des côtez, la pointe se presenta rouge comme un fruit d'Alkequenche dans sa bourse; c'étoit le corps spongieux dont la pointe étoit extrêmement molle & ouverte sur un des côtez. Tout proche d'une petite cicatrice rouge, il y avoit un œuf en relief qui se presentoit comme la pointe d'un gland, quand il commence à sortir de son calice.

Quand on souffloit contre la petite cicatrice on voyoit une petite membrane en forme de demi-croissant qui passoit sur l'endroit de l'œuf qui étoit encore dans l'Ovaire. Cet Ovaire ayant été gardé quelques jours, les œufs devinrent fêlés, & lorsqu'on venoit à le presser ils remontoient & sortoient en partie hors de la membrane. Il paroissoit sur un autre bord de l'Ovaire deux autres œufs aussi en relief.

Il y avoit plusieurs fibres du pavillon de la trompe & de ses expansions aux environs de la base du corps spongieux, de maniere qu'on n'en pouvoit voir qu'une moitié.

Ayant encore rencontré plusieurs autres Ovaires ouverts à la pointe du corps spongieux, j'y poussai de l'air qui les fit enfler, & qui sortit par les vaisseaux sanguins, ou spermaticques.

Il y avoit à un des plus gros Ovaires qu'on puisse trouver, une tige rouge, dont la pointe s'élevoit hors la surface quand on le

pressoit par les côtez, c'étoit la membrane qui enveloppoit l'œuf avant sa sortie. Elle étoit encore si vuide qu'en soufflant contre, elle s'enfonçoit dans l'Ovaire & laissoit aisément voir toute la cavité de l'œuf qui étoit sorti.

Dans un autre gros Ovaire que j'avois conservé dans de l'eau de vie, j'ai observé que les œufs étoient tous flétris & que la membrane extérieure s'enfonçoit en dedans de manière qu'on les pouvoit facilement compter. Ayant fait tremper cet Ovaire dans de l'eau, afin qu'il ne fût pas si racorni, je soufflai par la veine spermatique, & je vis que non seulement l'Ovaire s'enfla, mais qu'il y eut aussi deux gros œufs entre autres qui se gonflerent autant que leurs enveloppes purent s'étendre. Ces œufs paroissoient extérieurement distinguez des autres par leur figure, & par leur circonférence.

Tout ce que je viens de dire-là je l'ai pareillement observé sur des Brebis dans les premiers temps de la conception.

## I. F I G U R E.

*a.* L'Ovaire sur lequel on voit des œufs de différentes grosseurs, lesquels se font connoître par leur transparence.

*b.* L'extrémité, ou la pointe du corps spongieux ouvert à sa partie supérieure marqué *c.*

*d. d.* L'ouverture du pavillon de la trompe.

*e. e. e. e.* Fibres charnues des environs du pavillon de la trompe.

*E.* Le pavillon de la trompe tel qu'il a paru lorsqu'on a soufflé dedans, soutenu par la membrane qui forme le capuchon.

*f. f. f.*

- f. f. f.* La trompe.  
*g.* L'insertion, ou l'entrée de la trompe dans la corne de la portiere.  
*h.* Un bout de cette corne.  
*i. i. i. i. i. i. i.* Les veines spermatiques enflées par l'air poussé par l'ouverture naturelle *c*; que j'ai trouvées & démontrées sur plusieurs sujets.  
*K.* L'artere spermatique.

## II. FIGURE.

- a.* L'extrémité de la corne de la portiere.  
*b. b. b.* La trompe.  
*c.* Le pavillon de la trompe levé afin de voir son ouverture, ses fibres charnues, & plusieurs autres des environs attachées à l'Ovaire marqué *o. o.*  
*d. d. d. d. d.* Fibres charnues dont plusieurs s'attachent à l'Ovaire marqué *o. o.*  
*e. e.* Deux œufs dont une partie étoit en dehors, la membrane de l'Ovaire & l'autre partie en dedans, paroissant comme la pointe d'un gland hors son calice.  
*f.* Ouverture en demi-croissant dont on a parlé plusieurs fois.

## III. FIGURE.

*Est un Ovaire développé.*

- a. a. a.* Un gros corps spongieux dont;  
*i. i.* Est la pointe.  
*r.* L'ouverture qui se rencontre quelquefois & presque toujours dans certain temps.  
*n.* L'entrée d'une cavité qui conduit à la partie extérieure, qu'on ne voyoit qu'en soufflant.  
*p. p.* Une moitié de l'Ovaire où l'on voit plusieurs œufs presque détachés de leur calice.

## I V. F I G U R E.

*Est un Ovaire séparé par l'endroit où entrent les vaisseaux, où l'on voit des œufs de différente grosseur.*

*t. t.* Est un œuf dont on a vuide la liqueur afin de faire voir combien la membrane de l'Ovaire est émincée à l'endroit par où l'œuf doit sortir.

## V. F I G U R E.

*a. a. a. a. a. a.* Une partie de la corne de la portiere.

*f. f. f. f. f.* Le capuchon qui embrasse exactement l'Ovaire de toutes parts.

*o. o. o. o. o. o.* La trompe dont le pavillon & son expansion sont cachez par le capuchon.

## V I. F I G U R E.

*Fait voir un autre Ovaire qui étoit aussi embrassé, & caché par le capuchon.*

*a. a. a. a.* Partie de la corne de la portiere.

*b. b. b. b.* Le capuchon ouvert.

*c. c. c.* L'Ovaire sur lequel on voit plusieurs œufs dont il y en avoit un qui paroissoit en relief.

*d.* Le corps spongieux.

*i.* L'endroit où il étoit ouvert.

*x.* Ouverture en demi-croissant dont on faisoit lever le bord qui passe sur l'œuf en soufflant avec un chalumeau.



*Premiere Figure.*








Figure. 2<sup>e</sup>


Fig. 4<sup>e</sup>.


*Fig. 3<sup>e</sup>.*





*Figure 5.<sup>e</sup>*






*Figure 6.<sup>o</sup>*



*Fig. 8.<sup>o</sup>*







*Les Figures 7. & 8. représentent un Ovaire vu par dehors & par dedans.*

## VII. FIGURE.

*a. a.* Corps spongieux séparé de la membrane vésiculaire, ou ovaire.

*b. b.* La partie de l'Ovaire où étoient les œufs.

*c. c.* Deux ouvertures en demi-croissant qui ont été décrites.

## VIII. FIGURE.

*a. a. a.* Le même Ovaire vu par la partie intérieure, où l'on découvre plusieurs œufs.

*b. b.* Un œuf dont on a vuide la liqueur, ce qui faisoit voir en soufflant avec un chalumeau l'ouverture extérieure la plus proche du corps spongieux.



## OBSERVATIONS

*Sur les effets de l'Ypecacuanha.*

Par M. BOULDU.

\* **L**ORSQUE j'ai entrepris de travailler sur les purgatifs, pour en découvrir les principes, & la véritable cause de leur action, je ne me suis point flatté d'y réussir parfaitement; ç'a été jusqu'à présent l'écueil de

L. 5

tous

\* 12. Novembre 1701.

tous ceux qui l'ont voulu tenter, il ne nous est resté de tous leurs travaux que de simples conjectures, & de quoi former des Systèmes qui nous ouvrent le chemin pour aller plus loin & pour faire de nouvelles découvertes, qui ne laissent pas d'être très-utiles dans la pratique, quoique l'on n'en connoisse pas en détail tous les vrais principes.

Ce que j'ose d'autant plus me promettre qu'en faisant l'Analyse & la recherche des vertus de cette racine tant vantée pour la dysenterie, nommée Ypecacuanha, j'ai trouvé le moyen de rendre doux & traitable ce médicament d'ailleurs si farouche, en émoussant ou plutôt en supprimant la force émetique qui en fait toute la violence.

La grande difference qui se trouve entre ce médicament & les autres purgatifs les plus violens, jointe à la contrariété de ses propres vertus, m'anima à en rechercher à fond la nature.

Les autres purgatifs violens, tels que sont la Scammonée, & la Coloquinte, quelque bien préparés & corrigés qu'ils aient été, laissent toujours après eux, ou très-souvent des restes fâcheux de leur action, soit tranchées ou irritations cruelles, jusqu'à produire des dysenteries; mais au contraire l'Ypecacuanha, quelque vif qu'il paroisse tant par le vomissement, que par la purgation, ne laisse ordinairement après son effet qu'un grand calme & une nouvelle striction dans les parties qu'il a le plus ouvertes & le plus fatiguées.

Cependant ayant remarqué par le fréquent usage que j'ai fait de ce remède, qu'il ne portoit pas toujours son coup aussi utilement qu'on

qu'on l'auroit espéré, soit que son action trop précipitée par en haut, prévint sa distribution, & ne lui donnât pas le temps de laisser son impression astringente dans les parties, soit que sa violence émetique nous obligeât très-souvent d'en diminuer la dose par rapport à des estomachs trop délicats ou à des poitrines trop foibles, soit enfin que la frayeur des malades qui fremissent au seul nom d'Émetique, nous en fit reculer l'usage jusqu'à l'extrémité, lorsque les forces ne sont plus en état de le soutenir, je fis reflexion & je crus, que, si l'on pouvoit ralentir ou même supprimer entièrement sa trop grande force, en le dépouillant de ses parties résineuses, & ne lui laissant que ses parties salines, on pourroit s'en servir sans en apprehender aucune mauvaise suite.

Dans cette vûe je travaillai sur cette racine, je la dépouillai de ses parties résineuses par le moyen de l'esprit de vin, & de ses parties salines par l'eau de pluie, je trouvai par l'usage de l'un & de l'autre, que c'étoit véritablement des parties résineuses de la racine de l'Ypecacuanha aussi-bien que de la plupart des purgatifs que dépendoit toute leur violence.

Le premier extrait résineux produisit par le vomissement des efforts encore plus violents que ne fait la racine même, avec peu ou point d'astriktion, ce qui à la vérité ne me surprit point, puisque je le favois dénué de ses principes salins, le second au contraire dépouillé de ses parties résineuses, & ne contenant que les parties salines, poussa par les urines considérablement, purgea modérément avec peu ou point de nausées, & produisit enfin l'effet spécifique dont cette racine est douée; qui est

252 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
de guerir la dysenterie; c'est ce que je n'ai pas  
éprouvé une seule fois, mais plusieurs fois &  
toujours heureusement.

C'est ainsi qu'en recherchant la nature de ce  
remede, & la cause principale de son action,  
j'ai découvert la maniere d'éviter dans l'usage  
les suites fâcheuses qui le faisoient apprehen-  
der, & j'ai observé que quoique l'on ne trou-  
ve pas tout ce que l'on cherche en travaillant,  
on est souvent dédommagé de son travail par  
des découvertes que l'on ne cherchoit pas.

### DE L'ELLEBORE.

Après avoir travaillé sur l'Ypecacuanha, je  
me suis attaché aux autres purgatifs violents,  
j'en suis présentement à l'Ellebore.

L'Ellebore est très-célèbre dans l'ancienne  
Medecine, on l'a préconisé de tout temps,  
comme un purgatif spécifique contre l'aliena-  
tion d'esprit, contre les maladies les plus in-  
veterées & les plus rebelles, & propre à purger  
les parties les plus éloignées; cependant il  
passé pour un très-fort émetique, dont l'u-  
sage demande de très-grandes circonspec-  
tions.

Je ne m'arrêterai pas inutilement à faire la  
description de la plante, elle est trop bien dé-  
crite chez tous les Botanistes, je me conten-  
terai de dire que je n'ai rien observé dans  
l'Ellebore de nos jours, qui le distingue par  
ses fleurs, par ses feuilles & par sa racine, de  
la description que les Anciens nous en ont  
laissée.

On reconnoît deux sortes d'Ellebore, le  
blanc & le noir, les Anciens les ont très-bien  
disting-

distinguées par le différent usage qu'ils en faisoient.

L'Ellebore blanc est très-violent, il excite de grands vomissemens, il cause des convulsions mortelles, c'est pourquoi les Anciens ne le donnoient qu'avec beaucoup de précaution; on préparoit le malade par des bains & par de bons alimens, dit *Hipocrate*. L'on corrigeoit le remede avec du miel & du vinaigre, & toutes ces préparations n'alloient qu'à reprimer la violence du medicament, tel est l'Ellebore blanc dont nous n'osons présentement nous servir, peut-être plus timides en cela, que les Anciens.

Il n'en est pas de même de l'Ellebore noir, nos observations, & les experiences qu'on en fait tous les jours, me font croire qu'on peut le mettre au nombre des medicamens doux & d'une vertu purgative modérée.

Les Anciens l'ont à mon sens connu sur ce pied, car au lieu qu'en donnant l'Ellebore blanc, ils en reprimoient la violence par les susdites précautions, au contraire en donnant l'Ellebore noir, ils tâchoient d'en réveiller la vertu ou son action par l'exercice du corps & par les veilles.

C'est par celui-ci que je commence mes experiences, parce qu'il est le moins suspect, le plus sûr, & le plus en usage parmi nous, me reservant dans une autre séance de parler de l'Ellebore blanc, comme meritant bien un examen particulier.

Il est bon de remarquer que la racine d'Ellebore noir que nous employons ici, & qui nous vient ordinairement (dit-on) par la voye d'Angleterre, est bien différent en vertu de ce-

lui qui nous vient des montagnes de *Suisse*; le premier est si foible dans son action, qu'ayant peine à le reconnoître & à l'avouer pour l'Ellebore noir des Anciens, j'en ai fait expressement venir des montagnes de *Suisse*, où il croît en abondance, j'en ai trouvé les racines beaucoup plus nourries, & les fibres plus grosses, & les frequentes épreuves que j'en ai faites, m'ont fait connoître qu'il est de beaucoup supérieur à l'Ellebore qui nous vient par l'*Angleterre*, car celui-ci pris en substance ou en extrait, ne purge que peu ou point, & cet autre purge assez considerablement, & peut-être que si l'Ellebore noir a été si negligé dans la pratique, ce n'est pas tant pour n'être pas celui des Anciens, que pour n'avoir pas été pris dans cet heureux terroir qui le produit avec toutes ces vertus, à moins que celui qui nous vient icy par l'*Angleterre*, n'eût été alteré par le transport, ou peut-être gardé trop longtemps.

C'est donc sur celui qui m'a été envoyé des montagnes de *Suisse* que j'ai fait mes experiences & mes analyses:

Je les ai commencées suivant l'ancien usage par la distillation, afin de ne rien negliger, & j'ai continué par l'extraction avec les dissolvans convenables & analogues.

Sans entrer dans un long détail, je dirai succinctement, que j'en ai tiré d'abord par la distillation à la cornue à feu de reverbere clos & gradué un esprit acide, & ensuite un esprit & acide & urineux volatil; & en dernier lieu un esprit vraiment alkali volatil, embarrassé néanmoins de quelque petite portion de ce même esprit acide, qui est devenu très-vif & très-pé-

pénétrant avec la liqueur de fel de tartre ; aussi ce même esprit a-t-il considérablement fermenté avec les esprits acides , & j'en ai tiré enfin par la dernière violence du feu , une huile très-pénétrante & très-fœtide , partie assez épaisse & partie de moyenne substance , qui ne diffère point de ces fortes d'huiles distillées , de la masse noire restée dans la cornue , j'en ai tiré un sel fixe qui a fermenté avec les acides.

Je n'ai pas négligé de peser exactement tous les produits de cette analyse , & de les passer à tous les essais ordinaires , pour y avoir recours en cas de comparaison avec d'autres.

Je n'ai pas crû pouvoir tirer de grandes conséquences des produits de ces distillations , parce que je les ai plus regardé comme les ouvrages du feu , que comme de fideles témoins des principes qui sont dans ce mixte , c'est pourquoi j'ai eu recours à l'extraction faite & par l'esprit de vin , & par l'eau de pluie.

L'Extrait que j'en ai tiré par l'esprit de vin étoit en très-petite quantité , parce que cette racine contient peu de parties résineuses , ce dont je me suis d'autant plus assuré , que du marc , j'en ai tiré avec l'eau de pluie , assez grande quantité d'Extrait.

J'ai aussi fait l'extraction de cet Ellébore avec l'eau , & de cette manière j'en ai tiré tout ce qu'il pouvoit contenir d'extrait , puisque du résidu je n'en ai rien tiré avec l'esprit de vin , ce qui marque que cette racine renferme des parties salines au delà de ce qu'il en faut pour étendre & dissoudre le peu de parties résineuses qu'elle contient , sans être obligé de se servir

vir d'esprit de vin pour les tirer.

J'ai remarqué que ce premier extrait purement résineux & fait avec l'esprit de vin, purge avec irritation & peu, que l'extrait de son marc fait avec l'eau, ne purge que peu ou point, mais pousse par les urines, & qu'au contraire, l'extrait fait d'abord avec l'eau & sans esprit de vin, purge bien, doucement & utilement.

J'ai observé jusqu'à présent les mêmes effets, dans l'usage des extraits de la plupart des purgatifs; c'est-à-dire, que les extraits purement résineux, purgent ordinairement par irritation, que les purement salins ne purgent que peu ou point, mais poussent par les urines, & que ceux qui renferment tous ces principes tant résineux que salins tirez seulement par l'eau, purgent doucement & utilement.

D'où j'infere par ma propre experience que l'usage de ces extraits purement résineux, dépouillez de leurs parties salines, doit être vraiment suspect, pour ne pas dire dangereux, puisqu'étant privez de leurs sels propres, qui joints aux levains de l'estomach, ouvrent, divisent & étendent ces résines; il arrive que leurs parties grasses, huileuses & pleines de feu, s'attachent aux fibres de l'estomach, y causent des ardeurs & des tranchées très-violentes, & quelques jours après des inflammations, & des tenesmes encore plus violents, y restent même indissolubles pendant quelque temps, & enfin se terminent plutôt à des irritations & à des tenesmes très-douloureux, qu'à une véritable purgation, au lieu que ces résines accompagnées de leurs parties salines, sont en état de produire l'effet louable qu'on en attend.

Et



Et cela est si vrai que lorsqu'on a recours aux résines pour purger en petite quantité, il est aujourd'hui d'usage chez les habiles Praticiens, d'y joindre quelques sels, comme celui de tartre & semblables, pour ouvrir, atténuer ces parties résineuses, & leur procurer une fonte, d'où s'ensuive une douce purgation.

Je conviens que cet usage est très-judicieux, & très-utile dans ce cas, mais il ne seroit souvent pas nécessaire d'en venir-là, si l'on laissoit à ces extraits résineux le juste mélange des parties salines que la nature leur donne.

D'où je puis conclure qu'en cas d'extraits purgatifs résineux, la méthode de les tirer par les dissolvans aqueux, doit être préférée à celle qui se fait avec les dissolvans sulfureux, ce qui s'exécute beaucoup plus heureusement par le seul secours des dissolvans aqueux, que par celui des dissolvans sulfureux.

Cette manière d'opérer, débarrasse les purgatifs de leurs parties terrestres, sans leur faire rien perdre du juste mélange de leurs principes naturels, laisse aux résineux les sels nécessaires pour les étendre & pour les mettre en fusion, donne à l'Artiste un extrait plus utile & plus parfait, au lieu que celui qui est seulement tiré avec l'esprit de vin, est en quelque façon imparfait, comme dépouillé des sels qui sont si nécessaires aux résines pour en modifier & pour en faciliter l'action.

D'où enfin je conclus que cette dernière méthode quelque nouvelle qu'elle puisse paroître, est beaucoup plus parfaite & plus avantageuse que cette autre, quoique décrite & usitée depuis long-temps.

PRO-

~~~~~

# P R O J E T

*D'un Système touchant les Passages de la Boisson & des Urines.*

Par M. MORIN.

**S**I la liqueur que l'on boit sortoit toujours par les urines dans des intervalles de temps convenables au chemin qui a jusques à présent été marqué par ceux qui ont écrit l'histoire des Parties du Corps humain : s'il étoit possible d'expliquer comment une teinture de Cassé peut passer par le cœur, les arteres & les reins, & être ensuite rendue noire par les urines : on pourroit peut-être se contenter de ce chemin marqué par les Anatomistes. Mais la promptitude avec laquelle plusieurs verres d'eau minérale se chassent les uns les autres : la teinture de Cassé quelquefois rendue par les urines, presqu'aussi noire qu'elle a été prise, me paroissant incompatibles avec la longueur de ce chemin, & avec les differens mélanges qui s'y font : j'ai été tenté de chercher s'il n'y auroit point quelqu'autre voie, par laquelle on pût soupçonner que ces urines se rendissent dans la vessie : & après beaucoup d'observations & de reflexions, que j'ai jointes à quelques-unes qui se trouvent dans les Auteurs du dernier Siècle, & qui ont du rapport à ce même sujet, je me suis enfin fait un Système du passage de la boisson & des urines, que je ne crois pas avoir

voir encore été proposé , & par lequel il me paroît facile de rendre raison de ces Phenomenes : En voici une ébauche , que j'espère devoir être perfectionnée par les autres observations & réflexions que l'on y pourra ajouter , & que je soumetts au jugement de ceux qui se voudront bien donner la peine de l'examiner.

La boisson est une liqueur , dont deux des principaux usages sont de contribuer à la digestion , & de servir de vehicule à la plus pure partie des alimens digerez , avec laquelle elle compose ce qu'on nomme le chyle , & qu'elle porte dans toutes les parties du corps.

L'urine est cette même liqueur poussée par la vessie hors du corps , après avoir servi à ces usages.

La boisson & l'urine étant une même liqueur , ce sera la même chose d'examiner ce que devient la boisson après qu'elle a été reçue dans l'estomach , & examiner par où passent les urines avant que d'être rendues par la vessie.

La boisson reçue dans l'estomach se distribue différemment , selon qu'elle est prise en plus grande ou en moindre quantité , & selon qu'elle est prise avec plus ou moins d'alimens.

Ceux qui boivent beaucoup sans manger , tels que sont ceux qui prennent des eaux minérales , les rendent fort promptement par les urines & sans couleur. Ceux qui sont grands mangeurs & boivent peu , n'urinent que longtemps après les repas , & leur urine est fort colorée. Ceux qui mangent peu & boivent beaucoup , rendent de ces deux sortes d'urine : car  
leurs.

leurs premières urines, c'est-à-dire celles qu'ils rendent incontinent après, ou même pendant le repas, ou sans couleur, ou avec très-peu de couleur, ainsi que celles que rendent ceux qui boivent des eaux minérales: mais leurs secondes urines, c'est-à-dire celles qu'ils ne rendent que plusieurs heures après le repas, sont bien plus colorées & semblables à celles que rendent ceux qui mangent beaucoup & boivent peu. Les unes & les autres de ces urines sortent du corps par la vessie: mais la boisson qui fournit la matière des premières urines, se rend dans la vessie par une voie, & la boisson qui fournit la matière des secondes, par une autre.

Les voies des premières urines sont les pores du ventricule, & peut-être des intestins, les interstices qui sont entre les intestins dans la capacité du bas ventre, & enfin les pores de la vessie même; & les voies des secondes urines sont l'artere émulgente, les reins & les ureteres.

Les artères & les veines de tout le corps sont le réservoir où est renfermé tout le sang, & d'où coulent, comme de leur source, les secondes urines: ainsi que le ventricule, rempli de boisson, est le réservoir d'où coulent les premières urines, comme de leur source.

La boisson commence d'être la matière prochaine des premières urines, au moment qu'elle est reçue dans le ventricule; mais elle ne commence d'être la matière prochaine des secondes urines, que lors qu'ayant été portée, sous la forme de chyle jusqu'au cœur, il l'a poussée dans les artères.

La voie des secondes urines étant également  
cou-

connue & reçue de tous , il seroit inutile de la prouver : & pour celle que je nomme la premiere voie , la voie des premieres urines , qui est au travers des membranes du ventricule & de la vessie , voici comment on peut s'en assurer.

Il faut détacher & tirer hors d'un corps mort, le ventricule & la vessie : les remplir d'eau , lier exactement leurs ouvertures , & l'eau dont ils seront remplis sortira sensiblement par leurs pores. De plus , si on renverse ces mêmes parties , de sorte que leur superficie extérieure soit mise en dedans , & qu'ensuite on les remplisse d'eau , & qu'on lie exactement leurs ouvertures , l'eau dont elles seront remplies sortira par leurs pores avec la même facilité , qu'elle en sort , lorsqu'elles ne sont point retournées. Mais il y a encore quelque chose de plus , qui est que ces mêmes parties vidées de toute liqueur , leurs ouvertures liées exactement , puis mises dans assez d'eau pour qu'elles y nagent : si on les y laisse quelques heures , on trouvera dans leur capacité , une quantité d'eau assez considérable , qui aura passé de dehors en dedans. Voilà une grande facilité à l'eau de passer de dedans en dehors , & de dehors en dedans , par les pores du ventricule & de la vessie.

L'eau passant donc si librement par les pores du ventricule tiré hors du corps , que doit-on croire qu'il arrivera dans un homme vivant , lorsqu'il remplira son estomach de quelque eau minérale , ou que dans un repas il prendra des alimens & de la boisson dans une quantité telle , que les alimens nagent dans la boisson ? Quelle raison pourroit-on avoir de dire que les po-

pores, qui, dans un ventricule mort, laissent échapper l'eau dont on le remplît, ne donneront aucun passage à la boisson, prise seule en abondance, ou dans laquelle nagent les alimens, dans un homme vivant: dans les fibres & dans les pores duquel on doit supposer une souplesse & une activité, qui ne se rencontrent point dans les fibres & dans les pores d'une partie morte. Ne concevra-t-on pas bien plutôt, qu'il est des alimens nageans dans la liqueur, comme d'une éponge remplie d'eau, qui venant à être pressée entre les mains, laisse échapper l'eau dont elle est pleine, par entre les doigts des mains qui la pressent, & en laissent échapper plus ou moins, à proportion qu'on la presse plus ou moins; De même les alimens étant pressés par les parois du ventricule qui les embrasse, laissent échapper par ses pores, une partie de la liqueur dans laquelle ils nagent, & ils en laissent échapper plus ou moins, suivant qu'il y a plus ou moins de liqueur; plus ou moins d'alimens, & suivant que la pression est plus ou moins forte.

Or cette pression du ventricule n'est jamais assez forte pour exprimer toute la liqueur qui est mêlée avec les alimens: mais elle est telle, qu'elle leur en laisse autant qu'ils en ont besoin pour aider à leur digestion: Et cette quantité de liqueur qui demeure avec les alimens, est celle qui dans la digestion devient partie du chyle, passe par les artères & les veines, & est ensuite rendue, chargée de couleur, par la vessie: & c'est ce que je nommerai les secondes urines.

Pour ce qui est de la partie de la boisson qui est exprimée, & sort par les pores du ventricu-

cu-

cule, elle est reçue dans la capacité du bas ventre, où elle lave la superficie extérieure des intestins, & la superficie extérieure de la vessie: car le ventricule, les intestins & le fond de la vessie, sont contenus dans cette capacité, de telle sorte qu'une liqueur ne peut laver extérieurement une de ces trois parties, qu'elles ne lavent en même temps les deux autres.

Or ce qui fait que la liqueur qui tombe par les pores du ventricule, dans la capacité du bas ventre, n'y demeure pas, & n'y cause pas une hydropisie, est que les pores de la vessie, dont le fond est baigné de cette liqueur, lui laissent une issue libre pour passer dans la capacité de la vessie même, d'où elle est ensuite poussée dehors, à l'aide de la compression que font les muscles du bas ventre: & elle passe par les pores de la vessie dans sa capacité, plutôt que par les pores des intestins dans leur capacité, parce que ces pores des intestins sont moins libres, à cause de la pituite glaireuse dont tous les Anatomistes conviennent que leur superficie intérieure est enduite, pendant tout le temps qu'ils demeurent dans leur état naturel.

Voilà donc quelle est la première voie, voilà cette voie par laquelle les premières urines après certains repas, & par laquelle hors des repas les eaux minérales sont rendues si promptement & en si peu de temps. Et quoique dans le ventricule & dans la vessie, froids & tirés hors du corps, l'eau ne passe pas si promptement, son passage n'étant aidé que par son mouvement de liqueur: il n'y aura rien de surprenant, si la distribution s'en fait en si peu de temps dans l'homme vivant, dans lequel le mou-

mouvement de liqueur qui est dans l'eau, est aidé par la souplesse & la continuelle activité des fibres du ventricule & de la vessie, qui avec ces conditions dans l'homme vivant, doivent donner un passage beaucoup plus libre aux liqueurs qui coulent par leurs pores.

Mais pour bien entendre ce Système, il ne suffit pas de connoître les différentes voies, par lesquelles les premières & les secondes urines se rendent dans la vessie : il est encore bon de savoir en quelle proportion & en quel temps les unes & les autres s'y rendent.

Il doit premierement passer pour constant, & l'expérience nous fait connoître, que si on prend beaucoup de boisson lorsque le ventricule est vuide de tous alimens solides, la boisson passe en abondance & très promptement, n'y ayant pour lors rien dans le ventricule qui en ferme ou qui en retarde le passage : ce qui se voit sensiblement dans ceux qui prennent des eaux minérales, ou même dans ceux qui prennent des eaux de la *Seine*, à la maniere que l'on prend les eaux minérales, c'est-à-dire plusieurs verres, brusquement les uns sur les autres. Ces eaux ainsi prises, coup sur coup, passent dans la vessie, en partie par les premières voies, & en partie par les secondes : mais encore que ce qui y est porté par les secondes voies, soit dans une quantité assez considérable : ce qui est porté par les premières, l'est néanmoins bien davantage, & passe bien plus promptement, parce que les premières voies sont & plus courtes, & embarrassées de bien moins de détours.

En second lieu, si buvant beaucoup, on prend en même temps des alimens solides, mais



mais seulement en telle quantité, qu'ils soient nageans dans la boisson, le ventricule doit laisser échapper par ses pores plus de liqueur, à proportion que le volume que forment la boisson & les alimens, causent plus de tension dans les membranes dont le ventricule est composé: car pour lors, ces membranes tendant d'elles-mêmes à reprendre leur état naturel, pressent davantage ce qu'elles renferment, & en expriment davantage de cette liqueur qui fait leur tension, & l'obligent à sortir par leurs pores.

Il est de plus très-probable que lors que cette tension est diminuée, la liqueur ne discontinue pas tout à coup de s'échapper par les pores, mais elle en sort en moindre quantité, un peu colorée, & même mêlée d'un peu de chyle, qui commence à se former: & ainsi peu à peu, la quantité de ce qui passe par les premières voyes, diminue, jusques à ce qu'enfin, le ventricule étant vuide d'alimens & de liqueur qui sont passez par le pylore dans les intestins, il ne tombe plus dans la vessie de cette urine qui passe par la première voye, mais seulement de celle qui passe par la seconde: ce qui arrive dans certains estomachs plutôt, & dans d'autres plus tard, & ce qui continue dans cet état, jusques à ce qu'on remette dans l'estomach de nouvelle boisson.

Pour ce qui est des urines qui tombent dans la vessie par les secondes voyes, c'est-à-dire par les reins & les ureteres, il y a sujet de croire qu'elles y tombent, non seulement sans interruption, mais même dans une quantité moins inégale. Elles y tombent sans interruption, parce que les veines & les arteres, qui sont le

reservoir d'où elles sont<sup>\*</sup> filtrées , ne sont jamais vuides : & elles y tombent dans une quantité moins inégale , parce que la tension des veines & des arteres , & la quantité de la liqueur qu'elles contiennent , ne sont point sujettes à une si grande inégalité.

Il est bien vrai que lors qu'après la digestion des alimens pris dans un repas , il entre environ une livre de chyle , plus ou moins , dans ce reservoir : ou qu'après avoir pris une quantité considerable d'eau minerale , il en passe une partie dans les vaisseaux par les veines lactées , le volume de la liqueur contenue devient plus considerable & par conséquent la tension des vaisseaux plus grande : mais cette difference n'est jamais telle , qu'elle puisse être mise en parallele avec celle du ventricule , qui quelquefois est très-plein , & quelquefois ne contient rien du tout.

La quantité des urines qui tombent dans la vessie , par les secondes voyes , ne souffre donc jamais une si grande inégalité , que la quantité de celles qui y tombent par les premières.

Que si on veut savoir , quelle de ces deux sortes d'urine , tombe en plus grande quantité dans la vessie , cela dépend de la quantité de boisson ou autre liqueur que l'on prend : car si on ne prend précisément de liqueur que ce qui est nécessaire pour la digestion , il est sans doute qu'il tombera plus d'urine dans la vessie par les secondes voyes : ou pour mieux dire , il est assuré qu'il n'y en tombera que très-peu par les premières : tout ce qu'on prend de liqueur , passant en forme de chyle dans les secondes voyes. Que si au contraire on prend une

ne

ne telle quantité de boisson, que ce qui passe le nécessaire soit considérable, pour lors il tombera tantôt plus d'urine dans la vessie par les premières voyes que par les secondes, tantôt également, & même quelquefois moins, suivant le plus ou le moins de boisson que l'on aura pris par dessus le nécessaire à la digestion.

Il y a encore cette différence entre les premières & les secondes urines, que les premières répondent toujours en quantité à la liqueur qui passe par les pores du ventricule dans la capacité du bas ventre, s'il y passe une ou deux livres de liqueur, la vessie recevra une ou deux livres des premières urines : parce que la liqueur qui passe par les pores du ventricule dans la capacité du bas ventre, & de là par les pores de la vessie dans sa capacité, reçoit plus rarement quelque diminution dans son chemin : mais il n'en est pas de même des secondes urines, elles ne répondent pas en quantité, à la liqueur qui a passé sous la forme de chyle dans les veines & les artères : cette liqueur ne passe par les reins dans la vessie, qu'après avoir souffert une diminution très-considérable, premièrement en réparant tant la substance solide que l'humide, de toutes les parties du corps, dont il se fait une continuelle dissipation : & en second lieu en s'évaporant elle-même par la transpiration ou par les sueurs : ce que *Sanctorius* a estimé si considérable, qu'il n'a point feint de dire que ce qui sortoit du corps par la transpiration, étoit non seulement équivalent, mais même surpassoit tout ce qui en sort par toutes les autres évacuations. Ce n'est donc qu'après cette diminution, qu'une partie de la

liqueur qui a servi de vehicule à la plus pure partie des alimens , est enfin filtrée par les reins , & passe dans la vessie sous le nom de secondes urines.

De tout ce que je viens de dire , il s'ensuit.

1°. Que les premieres urines ne se rendent dans la vessie , ni continuellement & sans interruption , ni dans une quantité toujours égale.

2°. Que les secondes urines se rendent dans la vessie continuellement & sans interruption , & dans une quantité moins inégale.

3°. Que ce sont quelquefois les premieres urines qui tombent en plus grande quantité dans la vessie , & quelquefois les secondes.

4°. Que les premieres urines reçoivent peu de diminution dans leur chemin , & que les secondes en reçoivent beaucoup.

Ce ne sont pas seulement les experiences faites sur le ventricule & la vessie , tirez hors du corps , qui rendent fort probable ce Systeme du passage des urines , la convenance qu'il a avec certains Phenomenes , & la facilité qu'il donne à les expliquer plus nettement , qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent , feront qu'il y aura peu de personnes qui ne conviennent de cette probabilité.

Un des premiers Phenomenes qui se présentent à expliquer , est la difference de couleur qui se rencontre entre les urines qui passent par la premiere voye , & celles qui passent par la seconde : les premieres sont fort claires , & n'ont quelquefois pas plus de couleur que l'eau commune , principalement , s'il se trouve que dans le repas on ait bû un peu largement , & que les alimens ayent été en petite quan-

quantité : car pour lors une partie de la boisson passera par la premiere voye , & donnera des urines qui seront presque sans couleur , & elles sortiront telles en plus grande ou en moindre quantité , suivant qu'il y aura plus ou moins de boisson par dessus le necessaire à la digestion : la force d'exprimer la liqueur par les pores , étant précisément telle dans le ventricule , qu'elle ne commence à trouver trop de résistance dans les alimens solides qu'il contient , que lorsqu'il ne leur demeure de liqueur que le necessaire pour la digestion.

Quant aux secondes urines , elles sont dans leur état naturel , lors qu'elles sont d'un jaune clair , transparent & un peu orangé , & cette couleur leur vient de ce que la boisson qui leur sert de matiere , se trouve mêlée avec les alimens , pendant que la digestion s'en fait dans l'estomach , & avec le sang dans les arteres & dans les veines : où elle lui sert de vehicule pendant tous les tours & retours du cœur dans les parties , & des parties au cœur : & où elle se charge , comme une lessive , des sels tant fixes que volatils , & autres excremens sulfureux & terrestres du sang : des particules desquels les figures sont telles , qu'elles peuvent passer avec la liqueur qui s'en est chargée , par le filtre des reins , & qui donnent à cette liqueur la couleur que nous remarquons dans les urines.

Sur quoi on peut faire une remarque , qui est , que dans ceux qui laissent un intervalle un peu long entre leurs repas , prenant peu d'alimens solides , ce qu'il tombe d'urine dans la vessie par les premieres voyes , est entierement fourni par la boisson qui a été prise dans le repas

pas que l'on vient de faire : ce qui ne peut pas être dit des urines qui passent par les secondes voyes : parce que la partie de la boisson , qui passe sous la forme de chyle jusques au cœur , passe delà dans les arteres & dans les veines , comme dans un grand reservoir , dans lequel elle se mêle confusément avec 25 ou 30. livres de sang , qui est la quantité dans laquelle il est assez ordinairement contenu : & il n'y a pas plus de raison de croire que ce qu'il tombe d'urine , des reins dans la vessie , cinq ou six heures après que le chyle a passé par le cœur , est précisément pris de la même liqueur , qui dans ce chyle serroit de vehicule : que de croire , qu'ayant jetté une ou deux livres d'eau dans un vaisseau , dans lequel il y en a déjà 25 ou 30. livres , on trouvera un moyen d'en separer environ demie livre , qui sera précisément prise des deux livres que l'on y aura mêlées : tout au plus ce qu'on pourroit conjecturer , est que lorsqu'il entre deux livres de nouvelle liqueur dans ce même reservoir du sang , peut-être que la compression des vaisseaux sera telle , qu'elle en poussera deux autres livres hors des mêmes vaisseaux , dont la plus considerable partie sortira par les pores du corps , par la transpiration , ou par les sueurs , & la moindre partie sera filtrée & sortira par les reins & la vessie : & dans cette moindre partie que les reins filtreront , il y a une espece d'assurance , que l'on n'a peut-être fait aucun repas depuis plus de six ou sept mois , ou même plus , dont la boisson n'ait fourni quelque particule à cette moindre partie.

Ayant donc expliqué les causes de la couleur naturelle des urines , il est facile de dire pour-

pourquoi les eaux minerales sortent toujours sans couleur , & pourquoi les premieres urines , après certains repas , sortent ou sans couleur , ou presque sans couleur : c'est parce qu'elles ne se sont trouvées mêlées , ni avec le sang dans les veines & les arteres , ni assez de temps avec les alimens , pendant la digestion , mais sont passées dans la vessie par des voyes où il n'y avoit rien qui leur pût donner de la couleur.

Et voilà comment ce nouveau Systeme sert à expliquer ce premier phenomene , c'est-à-dire , la difference de couleur qui se rencontre entre les premieres & les secondes urines , en faisant voir pourquoi les premieres n'en ont point du tout , ou très-peu.

Un second Phenomene qui se présente à expliquer , est la couleur qui se remarque dans les urines que l'on rend une ou deux heures après avoir pris de la Cassé , car elles ont toujours un œil d'un roux un peu verdâtre , & quelquefois sont presque aussi noires qu'une teinture de cassé que l'on prend pour se purger.

Il est comme impossible que les Medecins à qui il est arrivé de voir de telles urines , ne se soient pas demandé à eux-mêmes : comment se peut-il faire que cette teinture de cassé ait été portée par les voyes du chyle au cœur ? s'est-elle mêlée avec le chyle , ne s'y est-elle pas mêlée ? comment se peut-il faire qu'elle ait passé avec sa noirceur du ventricule droit , au travers des poumons , dans le ventricule gauche , sans causer aucun accident ? a-t-elle été poussée dans les arteres tant superieures qu'inférieures ? ou quelle cause peut l'avoir déterminée

née à ne passer que dans les inferieures? quelle compatibilité de cette liqueur froide & paresseuse avec le sang arteriel, si plein d'esprits, & poussé avec tant de vigueur, pour supposer qu'ils ayent coulé ensemble dans les mêmes vaisseaux? comment étant dans les arteres inferieures, a-t-elle pû se démêler du sang, passer précisément dans l'artere émulgente, pour être filtrée dans les reins, & enfin tomber dans la vessie avec sa couleur d'un roux verdâtre, & quelquefois même avec presque toute sa noirceur: & tout cela dans l'espace d'une ou deux heures?

Il n'y a pas d'apparence qu'il se trouve personne, qui faisant toutes ces reflexions, ne tienne pour assuré que cette teinture ne passe point par toutes ces voyes, & qu'il faut nécessairement qu'il y ait quelqu'autre chemin par lequel elle se rende dans la vessie.

Or cet autre chemin ne peut être que ce qu'on nomme dans ce nouveau Système, la premiere voye des urines: c'est-à-dire, les pores du ventricule & de la vessie: par lesquels les experiences faites sur des ventricules & des vessies tirez de corps morts, font voir que les liqueurs ont un libre passage. Et ce qui peut encore confirmer ce sentiment, est que si on met dans ces mêmes ventricules & vessies tirez de corps morts, une teinture de casse crue & froide, elle passera, veritablement moins vite, & en très-petite quantité, mais néanmoins il en passera un peu, & ce peu qui passera, aura un œil d'un roux verdâtre.

Ajoutons à cela la facilité que donne ce même Système, d'expliquer pourquoi ces mêmes teintures de casse ne paroissent que dans les u-



rines que l'on rend dans le temps que la casse se fait encore sentir dans l'estomach, celles que l'on ne rend qu'après que la casse a passé du ventricule dans les intestins, ne retenant plus rien de cette noirceur. Ce qui vient de ce que les urines, passant par les premières voyes, ne souffrent point les différentes alterations, coctions & mélanges, que souffrent celles qui passent par les secondes, c'est-à-dire par les intestins, par le cœur & les poumons, par les arteres, & enfin par les reins.

Ce que je viens de dire des urines qui ont passé avec la teinture de casse, se doit de même entendre de celles qui passent quelquefois rouges, après avoir mangé des Betteraves, ou bû une infusion de racines de Garéncé, ou qui passent teintes d'un violet brun après avoir bû quelque'eau minérale de celles qui ont passé par des mines de fer, si en buvant cette eau, on y mêle quelque peu de noix de galle rapée, ou qui sentent une odeur de violette, ou une mauvaise odeur, après avoir pris de la terebenthine, ou mangé des asperges. De toutes ces urines, il n'y a que celles qui sont rendues les premières, qui aient ces couleurs ou ces odeurs, celles qui ne viennent qu'après la digestion achevée, ou après que ce qui les cause est passé du ventricule dans les intestins, n'ont point d'autre couleur ou odeur que les urines ordinaires.

En un mot ces couleurs & ces odeurs extraordinaires ne paroissent point dans les dernières urines, parce que les différentes alterations qu'elles ont souffertes, les ont fait disparaître : comme au contraire la couleur jaune ne paroît point dans les premières urines, parce

qu'elle ne paroît qu'après les différentes coctions & les différens mélanges.

Voilà comment la difficulté où l'on étoit d'expliquer le passage si prompt des eaux minérales & de la teinture de casse, disparaît en admettant cette première voye des urines, proposée & prouvée dans ce nouveau Système.

Il faut néanmoins avertir en finissant ce Mémoire, qu'on y a dit des choses touchant les urines, qui ne se doivent entendre qu'en général: on n'ignore pas qu'il n'y ait des exceptions à faire, à raison des âges, des saisons, des coutumes, &c. lesquelles exceptions ne détruisent point la probabilité du Système, dont on s'assûrera de plus en plus, par les observations & les réflexions que l'on y pourra ajouter, & auquel on n'est point si fort attaché, qu'on ne veuille bien l'abandonner, sitôt qu'on fera voir, ou que l'ancien Système des urines peut suffire, ou que l'on a quelque chose de meilleur.

~~~~~

## DISSERTATION

*Sur une Plante nommée dans le Bresil , R-  
quetaya , laquelle sert de correctif au Sené ,  
& sur la préférence que nous devons don-  
ner aux Plantes de nôtre païs , par dessus  
les Plantes étrangères.*

Par M. MARCHANT.

\* **L**A Botanique découvre tous les jours quelque chose de nouveau ; & les découvertes qu'elle fait , non seulement sont curieuses , mais souvent elles sont très-importantes , ou pour la conservation de la santé , ou pour les commoditez de la vie.

Les anciens Botanistes jusques au seizième Siecle , ne connoissoient qu'environ six mille Plantes : mais sur la fin du siecle dernier , on a découvert plus de quatre mille autres plantes , toutes différentes de celles dont les Grecs , les Latins & les Arabes , ont parlé dans leurs Livres ; & c'est de ces nouvelles Plantes , que l'on tire aujourd'hui les meilleurs remedes qu'il y ait dans la Medecine. Elles nous ont fourni les plus assurés specifics , pour la guérison de la plupart des maladies ; & au lieu de l'Elebore , de la Coloquinthe & de tous les autres violents purgatifs dont on se servoit autrefois , qui étoient toujours très-désagréables , & sou-

M 6

vent

\* 12. Novembre 1701.

vent presque aussi dangereux que les maladies mêmes auxquelles on les faisoit servir de remèdes, la Botanique a donné depuis peu, des médicamens benins, agréables, & commodes. Il n'est pas nécessaire d'en faire ici un long dénombrement ; il suffit d'en nommer deux, le Quinquina pour arrêter les fièvres, & l'Ipecacuanha pour guérir la dysenterie.

Voici une autre découverte, faite depuis un an ou deux, qui à la vérité n'est pas aussi importante que celles du Quinquina & de l'Ipecacuanha, mais qui ne laisse pas d'être d'une très-grande utilité. C'est la découverte des vertus de l'Yquetaya.

Il n'y a pas long-temps, que dans une de nos Assemblées j'en dis un mot en passant. Comme pour lors la Compagnie jugea, que la chose meritoit que je l'en informasse plus particulièrement, & que je donnasse un détail de tout ce que j'en pouvois savoir ; je dirai ici en peu de mots ce que j'en ai appris & par la Relation des autres, & par les expériences que j'en ai moi même faites.

Il n'y a pas encore deux ans, qu'un Chirurgien François qui a long-temps pratiqué la Médecine dans le *Bresil*, étant de retour en *Portugal*, où il reside présentement, écrivit ici à un de ses amis, que lorsqu'il étoit au *Bresil*, il avoit découvert un simple, dont les vertus étoient admirables.

Comme c'est l'ordinaire de vanter avec exagération, tous les nouveaux remèdes, principalement quand ils viennent de fort loin ; ce Chirurgien assûroit que ce nouveau remède étoit un spécifique sûr pour la pleuresie, qu'il étoit excellent pour l'apoplexie, & qu'il gué-  
ris-

rissoit toutes sortes de fièvres intermittentes. Mais on a été tant de fois trompé, par de semblables promesses magnifiques, que nous n'y ajoutâmes pas beaucoup de foi, jusqu'à ce que l'expérience nous eût appris ce que nous en devions croire. Après avoir parlé de ces grandes vertus de son médicament, il ajoûtoit une particularité moins importante, mais plus croyable: c'est que les feuilles de cette plante étant mises dans l'infusion du sené, ôtoient entièrement le mauvais goût, & l'odeur désagréable de ce purgatif, sans en diminuer la vertu purgative, & sans lui communiquer aucune mauvaise qualité.

Ce qui rendoit croyable cette particularité, c'est qu'il n'y avoit pas d'apparence que ce Chirurgien se fût avisé d'attribuer à son remède une vertu si singulière, à moins que l'expérience ne lui en eût appris quelque chose. Cependant, ce correctif du sené nous parut être d'une utilité qui n'étoit pas à négliger. Car il est certain, que le sené est un excellent purgatif; & si l'on pouvoit corriger certaines mauvaises qualitez qu'il a, comme en ont tous les autres cathartiques, il n'y auroit peut-être point de purgatif qui lui fût préférable. Il y a long-temps qu'on a trouvé moyen de corriger la plupart des autres mauvaises qualitez qu'on lui attribue; mais on n'avoit point encore trouvé le secret de lui ôter cette mauvaise odeur & ce goût désagréable, dont les personnes délicates ont tant d'aversion: & il est certain que ce seroit rendre un service considérable au public, que de remédier à ce dégoût, qui empêche beaucoup de personnes de se servir d'un remède si salutaire.

Celui qui donnoit avis de cette Plante inconnue, en avoit envoyé avec sa Lettre, quelques feuilles seches, afin qu'on en fît l'expérience, mais il s'étoit bien donné de garde, de marquer le nom de la plante ni aucune autre chose qui pût la faire connoître. Les feuilles qu'il avoit envoyées, étoient si brisées, que l'on ne pouvoit connoître de quelle plante elles étoient; & il sembloit même qu'il eût tâché de déguiser cette plante, en donnant l'idée d'une autre plante toute différente, dans l'esperance d'en tirer quelque avantage par le commerce qu'il avoit dessein d'en faire. Ces feuilles n'étoient pas en assez grande quantité pour pouvoir faire l'expérience des vertus qu'il attribuoit à cette plante pour la guérison de l'apoplexie, de la pleuresie, & des fièvres: mais il y en avoit assez pour éprouver cette vertu de corriger le goût & l'odeur du séné. On en fit l'essai, & l'expérience confirma ce que ce Chirurgien en avoit écrit. C'est ainsi qu'on a découvert ce nouveau correctif du séné, qui donne un moyen aisé de se servir sans dégoût, de cet excellent purgatif. Il est vrai que cette plante venoit des *Indes*, & qu'il eût fallu l'aller chercher bien loin. Mais que ne fait-on point pour conserver sa santé? Et quand on seroit obligé d'aller chercher dans l'*Amerique* une plante si utile, l'on ne devroit pas se plaindre de prendre pour aller chercher ce remede, autant de peine que l'on en prend pour aller chercher des drogues bien moins utiles.

Mais voici quelque chose de plus. Cette nouvelle plante que nous serions trop heureux d'aller chercher au bout du monde, se trou-

trouve en *Europe*, & non seulement à l'extrémité de l'*Europe*, mais en *France*; & même ici dans nos prairies voisines, & nos Païsans la foulent aux pieds tous les jours. Voici comme cela a été découvert. *M. Homberg*, qui a une sagacité toute particulière pour découvrir ce qu'il y a de plus caché dans la nature, & qui avoit été un des premiers, qui avoient fait l'essai de cette plante étrangere, apperçut parmi les feuilles seiches & brisées qui avoient été envoyées, quelques petites graines & des morceaux des capsules où elles avoient été contenues. Il crut avec raison que ces graines & ces capsules pourroient faire découvrir quelle étoit cette plante inconnue que l'on avoit pris peine à déguiser. Il me fit la grace de m'en parler, & il me fit voir ces graines. Il me sembla après les avoir bien examinées, qu'elles avoient beaucoup de rapport avec la graine des Scrophulaires.

Je ne manquai pas de semer une partie de ces graines qu'il me donna. C'étoit au mois de Mai; & la saison étant favorable elles leverent en peu de temps. La plante étant devenue grande, j'en fis secher les feuilles, pour éprouver si elles feroient les mêmes effets, dont *M. Homberg* m'avoit fait recit. Ayant fait infuser ces feuilles avec le sené, je vis avec admiration, qu'elles avoient entierement ôté le mauvais goût & la mauvaise odeur du sené: ce qui redoubla l'envie que j'avois de connoître une plante si admirable. L'ayant bien examinée, je me confirmai dans la pensée que j'avois eu d'abord, que cette plante étoit une espece de Scrophulaire; & je crus même que c'étoit l'espece que *Caspar Bauhin* ap-

appelle *Scrophularia aquatica major*. Ce qui me donnoit pourtant quelque doute, c'est que cette plante dont la graine venoit du *Bresil*, étoit beaucoup plus feuilleue, & plus branchue que nôtre Scrophulaire aquatique; que ces feuilles étoient plus petites en toutes leurs parties, qu'elles étoient d'un verd plus brun, & d'une odeur moins pénétrante: & dans la suite je vis qu'elle gardoit quelques feuilles pendant l'hyver, & qu'au mois de Mai suivant elle avoit fleuri plutôt que nôtre Scrophulaire. Ainsi il y avoit apparence que c'étoit quelque espece particuliere de Scrophulaire. Mais les experiences que j'ai faites depuis, m'ont fait connoître que ces differences se doivent attribuer à la culture & au climat, qui font souvent de grandes varietez dans les especes. Car ayant fait infuser avec du sené, les feuilles de nôtre Scrophulaire aquatique, je trouvai qu'elles avoient fait le même effet que les feuilles de cette plante *Brasilienne*, ayant entierement ôté le mauvais goût & la mauvaise odeur du sené. J'en ai fait depuis plusieurs autres experiences, qui m'ont toujours réussi; & quantité de personnes à qui j'ai donné ce remede à éprouver, ont été surpris d'en voir le même succès. Enfin cette plante du *Bresil* si vantée, se trouve être la même qu'une plante très-ordinaire, qui vient par tout ici au bord des eaux.

Cette vertu admirable de corriger l'infusion du sené avoit été jusqu'ici inconnue, parce qu'au lieu d'examiner par les experiences, la nature & la vertu des plantes de nôtre climat; souvent nous aimons mieux nous servir des plantes qui nous viennent des Pais étrangers.

Voici



Voici la maniere dont je me suis servi pour faire cette experience, que tout le monde peut faire.

Il faut mettre dans un vaisseau de terre, une chopine d'eau commune que l'on fera chauffer jusqu'à ce qu'on n'y puisse plus tenir la main : puis on y jettera deux gros de sené, & en même temps autant de feuilles seches de nôtre Scrophulaire aquatique ; on retirera aussi-tôt du feu l'infusion ; & cette infusion étant refroidie, on aura un purgatif excellent, qui aura toutes les bonnes qualitez du sené, sans en avoir ni l'odeur, ni le goût : ce qui prouve que cette Plante étrangere & nôtre Scrophulaire aquatique, sont d'une même espece ; puisqu'outre leur ressemblance, elles produisent le même effet, non seulement sur le sené, mais encore sur les liqueurs tant sulfurées, qu'acides..

On sait fort bien qu'en Medecine, on aromatise certains medicamens, pour en déguiser ou ôter le goût & l'odeur, ou même pour fortifier les ingrediens qui les composent ; pour lors, l'odeur de l'Aromate leur demeure, mais il n'en est pas de même ici : car cette plante ne communique aucune nouvelle qualité au sené, & elle n'en détruit point l'action.

La meilleure maniere de faire secher cette plante, quand on s'en veut servir à cet usage, est de la mettre d'abord secher à l'ombre pendant dix ou douze jours ; puis après l'exposer au Soleil jusqu'à ce qu'elle soit entierement seche. Car en la mettant premierement secher à l'ombre, on arrête avec le flegme les parties salines & les parties huileuses dont cette plante abonde, lesquelles se condensent  
par

par l'affaiffement des parties faute de circulation : & en l'exposant après au Soleil, on en dissipe les parties les plus aqueuses. Car dans l'Analyse chimique, cette plante après avoir donné d'abord du flegme lorsqu'elle est verte, donne beaucoup de sel volatil concret, & ensuite beaucoup d'huile, & c'est pour cela même que l'on ne doit pas être surpris, que cette plante soit si resolutive & si émolliente, puisqu'elle est remplie de principes actifs, ni s'étonner non plus de l'effet qu'elle produit sur le sené, d'autant qu'elle est remplie de sel volatil, qui étant mis en action par l'infusion, s'échape avec précipitation & emporte avec lui l'odeur & le goût du sené, & par son huile en retient la partie purgative.

Sur ce sujet, il semble qu'on auroit lieu de s'étonner de ce que les *Arabes* ont mis en usage un purgatif si desagréable, lorsqu'ils en ont tant d'autres chez eux. Mais il semble aussi qu'il est bien plus surprenant, de voir que dans la Médecine, nous nous servions si obstinément des purgatifs des Anciens, sans qu'on veuille tenter les remèdes que produisent les plantes qui naissent ici, & par ce moyen tâcher de nous exempter de nous servir de quantité de remèdes étrangers : & c'est, à ce qu'il semble, un reproche qu'on pourroit faire à la Botanique. Car que sert-il, dira-t-on, de connoître une infinité d'espèces qui ne sont d'aucun usage, & qui n'ont que de fort legères différences.

On voit déjà que plusieurs célèbres Botanistes, dans ce grand nombre d'espèces, confondent quantité de plantes, soit en les nommant deux fois sous differens noms, ou en exposant plu-

plusieurs figures d'une même plante.

Si les Auteurs de quantité de Livres nouveaux de Plantes étrangères, s'étoient contentez de bien caractériser un genre, & de chercher dans les especes ou dans le genre même quelque spécifique; il est vrai que cela feroit enrichir la Botanique, & non pas la surcharger d'especes par des varietez qui se rencontrent dans les différentes parties des plantes; comme dans les feuilles, d'être plus grandes, plus pointues, plus ou moins découpées, onnées, veluës, de différent verd, & plusieurs autres différences qui viennent souvent de la culture & du climat, lesquelles ont été connues & suffisamment expliquées par quelques sçavants Botanistes, par le mot *variat*, & qui enfin paroissent de vrais jeux de la nature, & dont on ne peut tirer aucune utilité pour la Medecine, ou même pour les Arts.

Mais pour revenir à l'usage des plantes de nôtre Pais; qui empêche, par exemple, qu'on ne se serve des plantes purgatives qu'on a en ce Pais-ci? On est assez convaincu, que l'E-purge, le Cabaret, la Gratiolle, le Nerprun, la Laureole, la Chicorée sauvage, les Roses, & quantité d'autres de nos Plantes sont purgatives, ou même émetiques. Il est vrai aussi, que peut-être l'on ne se peut servir de quelques-unes sans correctifs; mais en ce cas, on ne fera que ce qu'on fait à l'égard de quantité de remedes étrangers ou chimiques dont on se sert en Medecine, lesquels on n'employé point seuls, & qui ont leurs correctifs: & cet usage de Plantes de nôtre Pais, seroit d'autant plus louable, qu'outre la commodité d'a-

d'avoir des remedes chez nous, nous en aurions un degré de connoissance plus parfait; au lieu qu'il semble qu'on préfere de se faire instruire par des Sauvages, des vertus des Plantes étrangères, qu'on n'a ici que difficilement, & qu'on ne pourra peut-être point avoir dans certains temps, lesquelles tout au plus, ne sont pas plus efficaces, que celles que nous foulons aux pieds.

Les experiences que quantité de gens font, & que même tout le monde peut faire sur la petite Centaurée, en sont des preuves convaincantes. Car si l'on en fait une forte infusion, si l'on en donne la poudre en substance, ou que l'on en donne l'extrait, si même l'on en fait prendre des décoctions pour la guérison des fièvres, on trouvera que selon les saisons & selon les fièvres, elle produira souvent d'aussi bons effets qu'en produit le Quinquina, & peut-être que cette plante auroit encore des effets plus certains, si on l'avoit autant combinée, qu'on a fait le Quinquina.

Il est donc vrai de dire que la passion de voir des Plantes étrangères, qui regne presque chez tous les Botanistes, a fait une forte impression sur leur esprit, de laquelle s'ils avoient pû se guérir, ils auroient peut-être plus avancé dans la Medecine, principalement pour l'usage des Plantes de l'*Europe*.

Cette verité étoit parfaitement connue d'un des plus habiles Botanistes \* de ce Siecle, & qui avoit l'honneur d'être de l'Academie Royale des Sciences, lequel après avoir pen-

\* Feu M. *Marchant*.

dant huit années parcouru la *Grece*, l'*Egypte* & une partie de l'*Afrique*, où il avoit pratiqué la Medecine & conversé avec les plus savants Medecins de ces Pais-là, étant de retour en *France*, a souvent assuré, qu'il y a autant de Plantes en ce Pais-ci, desquelles on peut faire usage, que dans tous les lieux qu'il avoit parcourus.

Ce n'est pas qu'il desapprouvât les voyages que l'on peut faire dans les Pais étrangers, pour s'instruire de quantité de choses qu'il seroit difficile d'apprendre ailleurs. Il reconnoissoit que les voyages qu'il avoit faits, lui avoient beaucoup servi: mais il vouloit que nous fissions nôtre capital de nous instruire des vertus des Plantes de nôtre Pais; & c'est dans cette vûe qu'il avoit projeté de commencer l'Histoire des Plantes par celles de nôtre Pais, entre lesquelles une des premieres qu'il choisit & qu'il fit graver, fut la Plante décrite & figurée dans les Memoires de *Pena* & de *Lobel*, sous le nom de *Achillea montana Arthemisia tenui folia facie*, qui aujourd'hui est si fort en usage, & qu'on ordonne aux Astmatiques, pour fumer à la maniere du Tabac, & dont on a vû des effets très-surprenants pour la guérison des maladies de la poitrine.

On est à present parfaitement convaincu par une infinité d'experiences, que la racine de fougere est un remede admirable & assuré pour chasser toutes sortes de vers hors du corps, ainsi que nous l'enseigne *Dioscoride*.

Enfin on pourroit nommer quantité de Plantes qui sont autant de specifics, dont on pourroit se servir avec assurance dans la Medecine; s'il s'agissoit ici de faire l'éloge  
des

des Plantes de nôtre païs. *Rulandus* favant Medecin de *Ratisbone*, ayant lû dans *Galien* qu'un bon Medecin doit savoir faire la Medecine même avec les excremens des animaux, a dans cette vûe, composé un Traité qui a pour Titre, *Pharmacopœa nova in qua reposita sunt stercora & urine*, dans lequel il fait voir qu'on peut faire la Medecine, & guérir toutes les maladies curables avec ces sortes de remedes; je n'ai garde de dire qu'il faille avoir recours à de si sales remedes, quand on en a d'autres aussi utiles. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas composer des Pharmacopées, qui n'emploient pour la guérison des maladies, que des Plantes de nôtre païs, puisque nous avons des experiences certaines, qui prouvent qu'on trouve dans nos Plantes d'excellens remedes, comme sont, des Febrifuges, des Purgatifs, des Emetiques, des Cordiaux, des Sudorifiques, des Diuretiques, des Dysenteriques, & des Vulnéraires; & qu'enfin les vertus des Plantes ne sont point des choses si frivoles, que quelques gens se le sont imaginez; joint que la guérison des maladies dépend, pour l'ordinaire, de causes si differentes, qu'on ne doit pas se rebuter, ni attribuer la faute du succès aux remedes composez avec des Plantes. C'est pourquoi loin de les negliger, il faut s'en servir préferablement aux remedes étrangers, dans lesquels la prévention que l'on a pour ce qui vient de loin & pour la nouveauté, fait souvent trouver le merveilleux, qu'on trouvera veritablement dans quantité de nos Plantes, lorsqu'on en voudra faire usage, ainsi que nous l'avons experimenté dans nôtre Scrophulaire aquatique,

que , qui fait les mêmes effets sur le Sené,  
que produit la Scrophulaire du *Bresil* : & ce  
que je dis de l'application que nous devons  
avoir à connoître les Plantes de nôtre païs, est  
conforme au sentiment du même *Galien*, qui  
conseille à un Medecin de tâcher de connoître  
en général toutes les Plantes, mais tout  
au moins, dit-il, il faut qu'un Medecin ait  
une parfaite connoissance de la nature des  
Plantes, qui sont les plus familiares.

~~~~~

## OBSERVATIONS

*Sur une Comete, faites à Pau le 28 & le  
31 d'Octobre par le P. Pallu de la Com-  
pagnie de Jesus, & rapportées à l'Acad-  
emie,*

Par M. DE LA HIRE.

\* **L**E Pere *Pallu* de la Compagnie de *Jesus*,  
m'écrit de *Pau* en *Bearn* du premier  
Novembre 1701. qu'il avoit observé une Co-  
mete le 28. & le 31. du mois précédent, &  
le jour même qu'il écrit, entre la constella-  
tion de la Vierge & celle de la Coupe. Cette  
Comete étoit petite & faisoit alors par jour de  
son mouvement propre environ 40. min. On  
jugeoit qu'elle étoit sur sa fin, à cause que de-  
puis le 28. Octobre jusqu'au premier Novem-  
bre, elle avoit diminué sensiblement de gran-  
deur. Elle avoit une queue si petite qu'à pei-  
ne pouvoit-on l'appercevoir, & comme elle  
alloit du Septentrion vers le Midi, elle doit  
s'être perdue dans la clarté du Crépuscule du  
matin.

\* 12. Novembre 1701.

288 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
matin. Ce Pere marque les positions de cette  
Comete par celles des étoiles fixes qui en  
étoient alors le plus proche.

~~~~~

## OBSERVATIONS

*Sur les sels volatils des Plantes.*

Par M. HOMBERG.

\* **L** arrive dans presque toutes les analyses  
des Plantes non fermentées lorsque la  
distillation a été poussée jusques à la fin de la  
liqueur aqueuse, qu'il s'amasse dans le reci-  
pient, une liqueur rousse, laquelle dans les  
essais, donne tout à la fois des marques d'un  
alcali & d'un acide, c'est-à-dire que la même  
liqueur fait une forte ébullition avec l'esprit  
de sel, & elle rougit en même temps la tein-  
ture de Tournesol, ce qui paroît une espece  
de Paradoxe dans l'idée que nous avons des  
acides & des alcalis, qui ne se doivent tou-  
cher qu'en se détruisant les uns les autres.

Je me suis imaginé que cette liqueur rousse  
ne contenant pas seulement l'esprit acide &  
l'esprit urineux de la Plante, mais aussi une  
portion de son huile fetide, que cette huile  
pourroit bien être la cause que ces deux esprits  
n'agissent pas l'un sur l'autre, tant en bou-  
chant par sa graisse les pores de l'alcali uri-  
neux, qu'en enveloppant les pointes de l'aci-  
de; & qu'ainsi ne se touchant pas immédiate-  
ment, ils ne pourroient pas se pénétrer ni pro-  
duire aucune effervescence.

Ce-

\* 23. Novembre 1701.



Cependant ce fait m'ayant paru extraordinaire, il m'a donné la curiosité de l'examiner avec soin. J'ai donc pris pour cet effet deux Plantes, dont l'une contient beaucoup de sel volatil, & l'autre beaucoup d'acide, je les ai distillées séparément, j'ai déflegmé l'acide de l'un, & j'ai rectifié le sel volatil de l'autre avec son esprit urineux en le distillant sur des cendres bien nettes pour en séparer l'huile fétide, puis j'ai dissous ce sel volatil dans son esprit urineux, en sorte que cet esprit étoit fort chargé de sel volatil, & l'acide ressembloit au vinaigre distillé. J'ai versé cet esprit acide dans l'esprit urineux, ils n'ont fait aucune ébullition ensemble, quoique séparément ils fissent une très-grande effervescence, l'un avec l'esprit de sel, & l'autre avec l'huile de tartre.

J'ai été fort étonné de ce que la confusion de ces deux liqueurs n'a produit aucun mouvement ni sur le champ ni dans la suite, nonobstant que par leur rectification, j'en avois séparé, (à ce qui me paroissoit) toute l'huile fétide qui les accompagnoit dans le commencement. Ce qui m'a montré que ma première conjecture n'étoit pas juste. Voulant donc les reséparer d'ensemble par la distillation, je les ai mis sur l'Athamor dans un alembic de verre à fort petite chaleur, il en a distillé une liqueur légèrement urineuse, & à la fin il s'est sublimé un sel blanc, cristallin, salé, ayant conservé un peu d'odeur d'urine.

Ce sel m'a paru tout-à-fait nouveau; ne sachant personne qui ait fait mention d'un sel volatil salé de Plantes, comme est celui-ci.

J'ai fait user de ce sel à une personne in-

commodée depuis long temps de douleurs de reins, elle en a été extrêmement foulagée, & n'étant pas réglée auparavant; elle l'a été fort bien depuis.

Ce sel est une espece de sel Ammoniac dans lequel le sel du vinaigre distillé fait les mêmes fonctions que fait le sel commun dans le sel Ammoniac qui se vend chez les Droguistes; la difference qu'il y a dans la figure de l'un & de l'autre, est que nôtre sel volatil se crystallise & se sublime en longues aiguilles grasses, blanches, & transparentes; & que le sel Ammoniac se sublime en une croute seche, farineuse, blanche & opaque; le goût de l'un est legerement salé, tirant un peu sur l'acide, & le sel Ammoniac est d'un goût salé & très-piquant. Mais la principale difference qu'il y a entre le sel Ammoniac & le nôtre, est que ce dernier est un mélange de deux sels volatils tirez l'un & l'autre d'une même substance, savoir des Plantes, & que le sel Ammoniac est un mélange de deux sels de différentes substances, savoir l'un animal & l'autre mineral, dont l'union ne se fait pas si parfaitement, que par un intermede terreux ils ne se séparent d'ensemble sans même les mettre au feu.

Le Sel volatil que j'ai employé dans cette operation ressembloit parfaitement au sel volatil d'urine, & l'acide que j'y ai employé ressembloit au vinaigre distillé; ce qui m'a fait croire que le vrai sel d'urine & le veritable vinaigre distillez pourroient bien composer un sel de la même nature que le précédent qui est provenu d'un acide & d'un alcali volatil de Plantes.

J'ai

J'ai donc versé du vinaigre distillé dans l'esprit d'urine très-chargé de sel, environ six parties de vinaigre distillé sur une partie d'esprit d'urine, il ne s'est pas fait d'effervescence ni d'ébullition; je l'ai mis à distiller à très-petit feu, il en est arrivé parfaitement la même chose que dans l'opération précédente, c'est-à-dire que la liqueur distillée a senti un peu l'urine, & il s'est sublimé un sel volatil salé, très-beau, blanc & cristallin en assez grande quantité.

J'en ai voulu faire une seconde fois, mais n'ayant plus d'esprit d'urine j'ai dissous du sel volatil d'urine dans de l'eau de rivière sur lequel j'ai versé du vinaigre distillé; il s'est fait une très-grande ébullition: j'ai continué à y verser du vinaigre distillé jusques à cessation d'ébullition, puis je l'ai distillé. La liqueur qui en est sortie a toujours senti le vinaigre & non pas l'urine comme dans les précédentes distillations; il en est venu du sel volatil semblable aux précédents à la réserve qu'il ne sentoit pas l'urine comme l'autre, c'est-à-dire que le sel des premières opérations avoit retenu l'odeur d'urine, & que ce dernier-ci ne le sentoit point du tout, au contraire il avoit conservé un peu l'odeur & le goût du vinaigre distillé.

Je crois que la raison pourquoi ce dernier sel-ci sentoit plutôt le vinaigre qu'il ne sentoit l'urine, & que le premier a plutôt senti l'urine que le vinaigre, est que le sel volatil d'urine dans la dernière opération a été rassasié du vinaigre distillé: car j'en ai versé dessus jusques à cessation d'ébullition; & que dans les premières opérations le sel urineux n'a pas eu

assez d'acide, parce qu'il ne s'y est point fait d'ébullition en versant l'acide dans l'esprit d'urine; & par conséquent je n'ai pas pû juger de sa saturation.

J'ai cherché la cause pourquoi les deux premières fois il n'y a pas eu d'ébullition dans la confusion du vinaigre distillé avec l'esprit d'urine, & pourquoi le sel d'urine dissous dans cette dernière operation a fait une si forte ébullition avec le vinaigre distillé; je me suis apperçu que l'esprit d'urine que j'avois employé aux premières operations, étoit beaucoup plus chargé de sels volatils que ne l'avoit été la dissolution du sel d'urine employé dans la dernière operation. Pour m'assurer donc de la cause de cette différence, j'ai fait du nouvel esprit d'urine très-fortement chargé de sel volatil, j'ai versé dessus environ vingt fois autant de vinaigre distillé par diverses reprises; à la fin l'ébullition a commencé, & en continuant à y verser du vinaigre distillé, l'ébullition a continué aussi jusques à ce que la saturation en ait été faite: ensuite l'ébullition a cessé, & le mélange n'a plus senti l'urine, mais il a senti le vin nouveau; comme il est arrivé dans la dernière operation. J'ai pris de ce même esprit d'urine si fort chargé de sel volatil, je l'ai affoibli par beaucoup de flegme de la même urine, ensuite j'ai versé du vinaigre distillé dessus, & il s'est fait sur le champ une forte ébullition.

Ceci m'a fait voir que le vinaigre distillé n'est pas capable de ranger le sel volatil d'urine & de se ficher dans les pores quand le sel d'urine est dissous en fort peu de liqueur; en quoi il est différent des esprits acides minéraux,

raux, qui font d'abord une forte ébullition avec l'esprit d'urine, quelque fortement chargé de sel volatil qu'il soit.

Pour donner une raison plausible de ce fait, il faut considérer premièrement, qu'un acide mineral doit consister en pointes plus massives & par conséquent plus roides que ne sont les pointes du vinaigre distillé, parce qu'il est tiré immédiatement des sels fossiles sans avoir souffert aucune fermentation; au lieu que ce même sel qui se trouve répandu dans la terre, & qui a été succé par la racine de la vigne, reçoit une coction & une fermentation dans la Plante, ce qui doit produire une subdivision dans toute la masse nourricière de la Plante; parmi laquelle se trouve ce sel de la terre; puis le raisin ayant été pressé on l'a fait fermenter pour devenir vin, & par conséquent ces pointes sont brisées de nouveau; enfin le vin changeant en vinaigre, ces pointes souffrent un troisième brisement.

Le sel acide de la terre qui est entré dans la Plante, ayant souffert tous ces brisemens de différentes fermentations doit avoir ses pointes plus déliées & par conséquent plus foibles que ne sont ceux, qui par la distillation se tirent immédiatement du sel de la terre.

Secondement il faut considérer aussi que beaucoup de sel d'urine délaïé dans peu de liqueur fait une masse fort pesante, dont les petites parties se comprimant tant par leur propre pesanteur que par leur arrangement serré, se bouchent les pores les uns aux autres que les pointes trop foibles du vinaigre distillé ne sont pas capables de relever: mais lors que le sel d'urine est delayé en beaucoup d'eau,

leur figure n'est point comprimée & ils présentent leurs pores tout ouverts aux pointes du vinaigre distillé, lesquelles dans cette situation y peuvent entrer sans aucun empêchement.

J'ai observé dans la sublimation de notre sel volatil, qu'il est resté une matiere épaisse, huileuse & rouge-brune dans le fond de la Cucurbitre, nonobstant tout le soin que je m'étois donné auparavant pour séparer toute l'huile de l'esprit d'urine en la faisant distiller sur des cendres; ce qui m'avoit rendu mon esprit d'urine blanc comme de l'eau. Cette huile est apparemment une partie de l'huile fetide de l'animal ou de la plante selon le sel volatil: il pourroit bien être que cette huile soit la cause de la mauvaise odeur du sel volatil d'urine, puisque notre sel volatil ayant déposé son huile qui reste au fond de la Cucurbitre, n'a plus la mauvaise odeur du sel volatil d'urine.

~~~~~

## M E M O I R E

*Sur la Circulation du Sang des Poissons qui ont des Ouies, & sur leur respiration.*

Par M. DU VERNEY, l'aîné.

\* **D**ANS les divers Mémoires que j'ai lus à la Compagnie, j'ai fait voir quelle étoit

\* 29. Novembre 1701.

étoit la structure du Cœur des Poissons & celle de leurs Ouïes. Pour suivre cette matiere, il est à propos de parler de leurs usages : mais pour les rendre intelligibles à tout le monde, il est absolument nécessaire de faire ici une brève récapitulation de ce que j'ai dit touchant cette même structure.

On remarquera donc qu'elle est différente dans les différentes especes de Poissons où on trouve ces parties. J'ai fait voir à la Compagnie des Exemples de ces différences, mais je m'arrête aujourd'hui particulièrement à la Carpe que l'on trouve commodément & sur laquelle on pourra avec facilité verifiser tout ce que je vais dire.

Chacun fait que le cœur de tous les Poissons qui ne respirent pas l'air n'a qu'une cavité & par conséquent qu'une oreillette à l'embouchure du vaisseau qui y rapporte le sang. Celle du cœur de la Carpe est appliquée au côté gauche.

La chair du cœur est fort épaisse par rapport à son volume, & ses fibres sont très-compactes : aussi a-t-il besoin d'une forte action pour la circulation comme on le verra dans la suite.

Il n'y a personne qui ne sache ce que c'est que des Ouïes : mais tout le monde ne fait pas que ce sont ces parties qui servent de poumons aux Poissons. Leur charpente est composée de quatre côtes de chaque côté qui se meuvent tant sur elles-mêmes en s'ouvrant & se resserrant qu'à l'égard de leurs deux appuis supérieur & inférieur en s'écartant de l'un & de l'autre, & en s'en rapprochant. Le côté convexe de chaque côte est chargé sur ses deux

bords de deux especes de feuillets, chacun desquels est composé d'un rang de lames, étroites, rangées & serrées l'une contre l'autre qui forment comme autant de barbes ou franges semblables à celles d'une plume à écrire; & ce sont ces franges qu'on peut appeller proprement le poumon des Poissons.

Voilà une situation de parties fort extraordinaire & fort singuliere. La poitrine est dans la bouche aussi bien que le poumon: les côtes portent le poumon, & l'Animal respire l'eau.

Les extrémités de ces côtes qui regardent la gorge sont jointes ensemble par plusieurs petits os, qui forment une espece de sternon; en sorte néanmoins que les côtes ont un jeu beaucoup plus libre sur ce sternon, & peuvent s'écarter l'une de l'autre beaucoup plus facilement que celles de l'homme, & que ce sternon peut être soulevé & abaissé. Les autres extrémités qui regardent la base du crane sont aussi jointes par quelques osselets qui s'articulent avec cette même base & qui peuvent s'en éloigner, ou s'en approcher.

Chaque côte est composée de deux pieces jointes par un cartilage fort souple, qui est dans chacune de ces parties ce que sont les charnières dans les ouvrages des Artisans.

La premiere piece est courbée en arc, & sa longueur est environ la sixième portion du Cercle dont elle feroit partie.

La seconde décrit à peu près une S romaine majuscule.

La partie convexe de chaque côte est creusée en gouttiere, & c'est le long de ces gouttieres



res que coulent les vaisseaux dont il sera parlé ci-après.

Chacune des lames dont les feuillets sont composez, a la figure du fer d'une faux, & à sa naissance elle a comme un pied ou talon qui ne pose que par son extrémité sur le bord de la côte.

Chacun de ces feuillets est composé de cent trente-cinq lames, ainsi les seize contiennent huit mille six cens quarante surfaces, que je compte ici parce que les deux surfaces de chaque lame sont revêtues dans toute leur étendue d'une membrane très-fine, sur laquelle se font les ramifications presque innombrables des vaisseaux capillaires de ces sortes de poumons.

J'ai fait voir à la Compagnie qu'il y a quarante six muscles qui sont employez aux mouvemens de ces côtes; il y en a huit qui en dilatent l'intervalle, & seize qui le resserrent; six qui élargissent le cintre de chaque côte, douze qui le rétreussent, & qui en même temps abaissent le sternon; & quatre qui le soulèvent.

Les Ouïes ont une large ouverture, sur laquelle est posé un couvercle composé de plusieurs pieces d'assemblage, qui a le même usage que le panneau d'un soufflet; & chaque couvercle est formé avec un tel artifice, qu'en s'écartant l'un de l'autre ils se voutent en dehors pour augmenter la capacité de la bouche; tandis qu'une de leurs pieces qui joue sur une espece de genou tient fermées les ouvertures des Ouïes, & ne les ouvre que pour donner passage à l'eau que l'Animal a respiré; ce qui se fait dans le temps que le couvercle s'abat & se resserre.

Il y a deux muscles qui servent à soulever le Couvercle, & trois qui servent à l'abbatre & à le resserer.

On vient de dire que l'assemblage qui compose la charpente des couvercles les rend capables de se vouër en dehors. On ajoutera deux autres circonstances. La première est que la partie de ce couvercle qui aide à former le dessous de la gorge est plié en éventail sur de petites lames d'os pour servir en se déployant à la dilatation de la gorge dans l'inspiration de l'eau. La seconde que chaque couvercle est revêtu par dehors & par dedans d'une peau qui lui est fort adhérente. Ces deux peaux s'unissant ensemble se prolongent au delà de la circonférence du couvercle d'environ deux à trois lignes, & vont toujours en diminuant d'épaisseur. Ce prolongement est beaucoup plus ample sous la gorge que vers le haut de la tête. Il est extrêmement souple, pour s'appliquer plus exactement à l'ouverture sur laquelle il porte, & pour la tenir fermée au premier moment de la dilatation de la bouche pour la respiration.

Voilà pour ce qui regarde la structure des Ouïes: passons à présent à la distribution de leurs vaisseaux.

L'Artere qui sort du Cœur se dilate de telle maniere, qu'elle en couvre toute la base: Ensuite se rétrécissant peu à peu elle forme une espece de cone. A l'endroit où elle est ainsi dilatée elle est garnie en dedans de plusieurs colonnes charnues qu'on peut considérer comme autant de muscles qui font de cet endroit de l'Aorte comme un second cœur ou du moins comme un second ventricule,

le-

lequel joignant sa compression à celle du cœur, double la force nécessaire à la distribution du sang pour la circulation.

Cette Artere montant par l'intervalle que les Ouïes laissent entr'elles, jette vis-à-vis de chaque paire de côtes de chaque côté une grosse branche, qui est couchée dans la gouttière creusée sur la surface extérieure de chaque côte; & qui s'étend le long de cette gouttière d'une extrémité à l'autre du feuillet. Voilà tout le cours de l'Aorte dans ce genre d'Animaux. L'Aorte qui dans les autres Animaux porte le sang du centre à la circonférence de tout le Corps, ne parcourt de chemin dans ceux-ci que depuis le cœur jusqu'à l'extrémité des Ouïes, où elle finit.

Cette branche fournit autant de rameaux qu'il y a de lames sur l'un & sur l'autre bord de la côte. La grosse branche se termine à l'extrémité de la côte, ainsi qu'il a été dit, & les rameaux finissent à l'extrémité des lames auxquelles chacun d'eux se distribue. Pour peu que l'on soit instruit de la circulation & des vaisseaux qui y servent, on fera en peine de savoir par quels autres vaisseaux on a trouvé un expédient pour animer & nourrir tout le corps depuis le bout d'embas des Ouïes jusqu'à l'extrémité de la queue. Cet expédient paroîtra clairement, dès qu'on aura conduit le sang jusqu'à l'extrémité des Ouïes.

Chaque rameau d'Artere monte le long du bord intérieur de chaque lame des deux feuillets posés sur chaque côte; c'est-à-dire le long des deux tranchans des lames qui se regardent: ces deux rameaux s'abbouchent au milieu de leur longueur; & continuant leur route par-

viennent, comme j'ai dit, à la pointe de chaque lame. Là chaque rameau de l'extrémité de l'artere trouve l'embouchure d'une veine; & ces deux embouchures appliquées l'une à l'autre immédiatement ne faisant qu'un même canal malgré la différente consistance des deux vaisseaux, la veine s'abbat sur le tranchant extérieur de chaque lame, & parvenue au bas de la lame elle verse son sang dans un gros vaisseau veineux couché près de la branche d'artere dans toute l'étendue de la gouttière de la côte. Mais ce n'est pas seulement par cet abouchement immédiat des deux extrémités de l'Artere & de la veine que l'Artere se décharge dans la veine, c'est encore par toute sa route.

Voici comment le rameau d'Artere dressé sur le tranchant de chaque lame, jette dans toute sa route sur le plat de chaque lame de part & d'autre, une multitude infinie de vaisseaux; qui partant deux à deux de ce rameau l'un d'un côté de la lame, l'autre de l'autre, chacun de son côté va droit à la veine qui descend sur le tranchant opposé de la lame, & s'y abbouche par un contact immédiat. C'est ainsi que le sang passe dans ce genre d'Animaux, des Arteres de leur poumon dans leurs veines d'un bout à l'autre. Les Arteres y sont de vraies arteres, & par leur corps & par leur fonction de porter le sang. Les veines y sont de vraies veines, & par leur fonction de recevoir le sang des Arteres, & par la délicatesse extrême de leur consistance. Il n'y a jusques là rien qui ne soit dans l'économie ordinaire: Mais ce qu'il y a de singulier, est premierement l'abbouchement immédiat des Arteres avec les veines, qui

se

se trouve à la verité dans les poumons d'autres Animaux ; sur tout dans ceux des Grenouilles ; & des Tortues ; mais qui n'est pas si manifeste que dans les ouies des Poissons. 2°. La regularité de la distribution qui rend cet abbouchement plus visible dans ce genre d'Animaux ; car toutes les branches d'Arteres montant le long des lames dressées sur les côtes, sont aussi droites & aussi également distantes l'une de l'autre que les lames : Les rameaux transversaux capillaires qui partent de ces branches à angles droits, sont également distans l'un de l'autre ; de sorte que la direction & les intervalles de ces vaisseaux tant montans que transversaux, étant aussi reguliers que s'ils avoient été dressés à la regle & espacez au compas ; on les suit à l'œil & au Microscope. On voit donc que les Arteres transversales finissent immédiatement au corps de la veine descendante, & chacune de ces veines descendantes ayant reçu le sang des Arteres capillaires transversales de part & d'autre de la lame, s'abbouche à plomb avec le tronc de la veine couchée dans la gouttiere.

Il faut avouer que cette distribution est fort singuliere : ce qui suit l'est encore davantage. On est en peine, comme j'ai dit, de la distribution du sang pour la nourriture & la vie des autres parties du corps de ces Animaux. Nous avons conduit le sang du cœur par les Arteres du Poumon, dans les veines du Poumon. Le cœur ne jette point d'autres Arteres que celles du Poumon. Que deviendront les autres parties, le Cerveau, les Organes des sens, & tout le reste du corps ? Ce qui suit le fera voir.

Ces troncs de veines pleins de sang arteriel,

sortant de chaque côte par leur extrémité qui regarde la baze du crane , prennent la consistance & l'épaisseur d'Arteres ; & viennent se réunir deux à deux de chaque côté. Celle de la premiere côte, fournit avant sa réunion des branches qui distribuent le sang aux Organes des sens, au Cerveau, & aux parties voisines, & fait par ce moyen les fonctions qui appartiennent à l'Aorte ascendante dans les Animaux à quatre pieds : ensuite elle se rejoint à celle de la seconde côte, & ces deux ensemble ne font plus qu'un tronc, lequel coulant le long de la baze du crane reçoit encore de chaque côté une autre branche formée par la réunion des veines de la troisième & quatrième paires de côtes, & toutes ensemble ne font plus qu'un tronc.

Après cela, ce tronc, dont toutes les racines étoient veines dans le Poumon, devenant Artere par sa tunique & par son office, continue son cours le long des Vertebres ; & distribuant le sang arteriel à toutes les autres parties, fait la fonction d'Aorte descendante, & le sang arteriel est distribué par ce moyen également à toutes les parties pour les nourrir & les animer ; & il rencontre par tout des racines de veines qui reprennent le residu & le reportent par plusieurs trôncs formez de l'union de toutes ces racines, au reservoir commun qui le doit rendre au Cœur ; c'est ainsi que s'acheve la circulation dans ces Animaux.

Voilà comment les veines du Poumon de ce genre de Poisson deviennent Arteres, pour animer & nourrir la tête & le reste du corps.

Mais ce qui augmente la singularité, est que  
ces

ces mêmes veines des Poumons sortant de la gouttière des côtes par leur extrémité qui regarde la gorge, conservent la tunique & la fonction de veines, en rapportant dans le réservoir de tout le sang veinal, une portion du sang artériel qu'elles ont reçue des Arteres du Poumon.

Comme le mouvement des Machoires contribue aussi à la respiration des Poissons, il ne fera pas hors de propos de faire remarquer que la supérieure est mobile, qu'elle est composée de plusieurs pièces qui sont naturellement engagées les unes dans les autres, de telle manière qu'elles peuvent en se déployant, dilater & allonger la Machoire supérieure.

Toutes les pièces qui servent à la respiration de la Carpe, montent à un nombre si surprenant, qu'on ne fera pas fâché d'en voir ici le dénombrement.

Les pièces osseuses sont au nombre de quatre mille trois cents quatre-vingt six: Il y a soixante neuf muscles.

Les Arteres des Oües, outre leurs huit branches principales, jettent quatre mille trois cents vingt rameaux; & chaque rameau jette de chaque laine, une infinité d'Arteres capillaires transversales dont le compte ne sera pas difficile, & passera de beaucoup tous ces nombres ensemble.

Il y a autant de nerfs que d'Arteres, les ramifications des premiers suivant exactement celles des autres.

Les veines ainsi que les arteres, outre leurs huit branches principales jettent quatre mille trois cents vingt rameaux qui sont de simples tuyaux, & qui à la différence des rameaux des  
ar-

arteres , ne jettent point de vaisseaux capillaires transversaux.

Voilà une legere idée de la structure des ouies de la Carpe : Mais quelque exactitude que j'aye apportée à les décrire , j'avoue qu'il sera toujours difficile de s'en former une juste idée , sans le secours des Figures. C'est aussi à quoi on travaillera dans la suite , en donnant au Public tout ce qui regarde l'Anatomie comparée des ouies. Il s'agit à present d'examiner les usages de ces parties.

Le sang qui est rapporté de toutes les parties du Corps des Poissons , entre du reservoir où se dégorgent toutes les veines , dans l'oreillette , & delà dans le cœur ; qui par sa contraction le pousse dans l'Aorte , & dans toutes les ramifications qu'elle jette sur les lames des ouies : & comme à sa naissance elle est garnie de plusieurs colonnes charnues fort epaisses , qui se resserrent immédiatement après ; elle seconde & fortifie par sa compression l'action du cœur , qui est de pousser avec beaucoup de force le sang dans les rameaux capillaires transversaux situez de part & d'autre , sur toutes les lames des ouies.

On a fait observer que cette artere & ses branches , ne parcouroient de chemin que depuis le cœur , jusqu'à l'extrémité des ouies , où elles finissent. Ainsi ce coup de piston redoublé doit suffire , pour pousser le sang avec impetuositè dans ce nombre infini d'arterioles si droites & si regulieres , où le sang ne trouve d'autre obstacle que le simple contact ; & non le choc & les reflexions , comme dans les autres Animaux , où les arteres se ramifient en mille manieres , sur tout dans leurs dernieres subdivisions.

Voi-



Voilà pour ce qui concerne le passage du sang dans le Poumon. Voici comment s'en fait la préparation.

Je suppose que les particules d'air qui sont dans l'eau, comme l'eau est dans une éponge, peuvent s'en dégager en plusieurs manieres : Premièrement, par la chaleur, ainsi qu'on le voit dans l'eau qui boût sur le feu ; 2 par l'affoiblissement du ressort de l'air, qui presse l'eau où ces particules d'air sont engagées ; comme on le voit dans la machine du vuide. 3. Par le froissement & l'extrême division de l'eau, sur tout quand elle a quelque degré de chaleur.

On ne peut pas douter qu'il n'y ait beaucoup d'air dans tout le Corps des Poissons, & que cet air ne leur soit fort nécessaire. La machine du vuide fait voir l'un & l'autre.

J'ai mis une Tenche fort vive dans un vaisseau plein d'eau que l'on a placé sous le recipient ; & après avoir donné cinq ou six coups de piston, on a remarqué que cette Tenche étoit toute couverte d'une infinité de petites bulles d'air qui sortoient d'entre les écailles, & que tout le corps paroissoit perlé. Il en sortoit aussi un très-grand nombre par les ouïes, beaucoup plus grosses que celles de la surface du corps : Enfin il en sortoit par la bouche, mais en moindre quantité. En recommençant à pomper tout de nouveau deux ou trois fois de suite, ce qui fut fait à plusieurs reprises, on remarquoit que le Poisson s'agitoit & se tourmentoit extraordinairement, & qu'il respiroit plus fréquemment. Après avoir passé un gros quart d'heure dans cet état, il tomba en langueur, tout le corps & même les ouïes n'ayant plus aucun mouvement sensible. Pour lors  
ayant

ayant tiré le vaisseau de dessous le recipient, on jetta le Poisson dans de l'eau ordinaire, où il commença à respirer & à nager, mais foiblement; & il fut longtemps à revenir à son état naturel.

J'ai fait la même experience sur une Carpe: je l'ai mise dans la même machine, & ayant pompé l'air trois ou quatre fois comme on l'avoit fait à la Tenche, le Poisson commença d'abord à s'agiter: toute la surface du corps devint perlée; il sortit par la bouche & par les ouïes une infinité de bulles d'air fort grosses, & la region de la vessie d'air s'enfla beaucoup. Quoique cette Carpe fût plus grosse que la Tenche, le battement des ouïes cessa plutôt. Lorsqu'on recommençoit à pomper, les ouïes recommençoient aussi à battre, mais très-peu de temps, & fort foiblement. Enfin elle demeura sans aucun mouvement; & la region de la vessie devint si gonflée & si tendue, que la laitte sortoit en s'éfilant par l'anus. Cela dura environ trois quarts d'heure, au bout desquels elle mourut, étant devenue fort plate. L'ayant ouverte, on trouva la vessie crevée.

On a aussi expérimenté qu'un Poisson mis dans de l'eau purgée d'air n'y peut vivre longtemps.

Outre ces experiences qu'on peut faire dans la machine du vuide, en voici d'autres qui prouvent aussi que l'air, qui est mêlé dans l'eau, a la principale part à la respiration des Poissons.

Si vous enfermez des Poissons dans un vaisseau de verre plein d'eau, ils y vivent quelque temps, pourvu que l'eau soit renouvelée: mais

fi

si vous couvrez le vaisseau , & le bouchez enforte que l'air n'y puisse point entrer , les Poissons seront étouffez. Cela prouve bien que l'eau ne sert à leur respiration , qu'autant qu'elle a la liberté de s'impregner d'air.

Mettez plusieurs Poissons dans un vaisseau qui ne soit pas entierement rempli d'eau ; si vous le fermez , ces Poissons qui auparavant nageoient en pleine liberté , & s'égaioient , s'agiteront & se presseront à qui prendra le dessus pour respirer la portion de l'eau , qui est la plus voisine de l'air.

On remarque aussi , que lorsque la surface des Etangs est gelée , les Poissons qui sont dedans , meurent plus ou moins vite suivant que l'étang a plus ou moins d'étendue & de profondeur ; & on observe que quand on casse la glace en quelque endroit , les Poissons s'y présentent avec empressement pour respirer cette eau impregnée d'un nouvel air. Ces experiences prouvent manifestement la necessité de l'air pour la respiration des Poissons. Voyons maintenant ce qui se passe dans le temps de cette respiration.

La bouche s'ouvre , les lèvres s'avancent : par là la concavité de la bouche est allongée , la gorge s'enfle , les couvercles des ouïes , qui ont le même mouvement que les panneaux d'un soufflet , s'écartant l'un de l'autre , se voûtent en dehors par leur milieu seulement , tandis qu'une de leurs pieces , qui joue sur une espece de genou ; tient fermées les ouvertures des ouïes , en se soulevant toutefois un peu , sans permettre cependant à l'eau d'entrer ; parce que la petite peau qui borde chaque couvercle ferme exactement l'ouverture des ouïes.

Tout

Tout cela augmente & élargit en tout sens la capacité de la bouche, & détermine l'eau à entrer dans sa cavité, de même que l'air entre par la bouche & les narines, dans la trachée-artère & les poumons; par la dilatation de la poitrine. Dans ce même temps les côtes des ouïes s'ouvrent, en s'écartant les unes des autres; leur cintre est élargi, le sternon est écarté, en s'éloignant du palais; ainsi tout conspire à faire entrer l'eau en plus grande quantité dans la bouche. C'est ainsi que se fait l'inspiration des Poissons. Ensuite la bouche se ferme, les lèvres auparavant allongées se raccourcissent, sur tout la supérieure qui se plie en éventail, la lèvre inférieure se côle à la supérieure par le moyen d'une petite peau en forme de croissant qui s'abbat comme un rideau de haut en bas, & qui empêche l'eau de sortir. Le couvercle s'applatit sur la baie de l'ouverture des ouïes. Dans le même temps les côtes se ferment les unes contre les autres, leur cintre se retrecit, & le sternon s'abbat sur le palais.

Tout cela contribue à comprimer l'eau qui est entrée par la bouche: Elle se présente alors pour sortir par tous les intervalles des côtes & par ceux de leurs lames, & elle y passe comme par autant de filieres; & par ce mouvement la bordure membraneuse des couvercles est relevée, & l'eau pressée s'échape par cette ouverture. C'est ainsi que se fait l'expiration dans les Poissons. On voit donc par là que l'eau entre par la bouche, & qu'elle sort par les ouïes par une espece de circulation entrant toujours par la bouche, & sortant toujours par les ouïes. Tout au contraire de ce qui arrive dans

dans les Animaux à quatre pieds , dans lesquels l'air entre & sort alternativement par la même ouverture de la trachée-artère.

Voilà tout ce qui concerne les mouvemens de la respiration des Poissons. Suivons à présent la route du sang dans les ouïes, & voyons quelle préparation il y reçoit.

Le sang qui sort du cœur de la Carpe se répand de telle manière sur toutes les lames dont les ouïes sont composées , qu'une très-petite quantité de sang se présente à l'eau sous une très-grande superficie ; afin que par ce moyen chacune de ses parties puisse plus facilement & en moins de temps , être pénétrée par les petites parties d'air qui se dégagent de l'eau par l'extrême division qu'elle souffre entre ces lames : C'est pour cela qu'il a fallu non-seulement que chaque feuillet en eût un si grand nombre , mais aussi que toutes leurs surfaces fussent couvertes de rameaux capillaires transversaux de l'aorte.

On observe en quelque manière la même mécanique dans les poumons des autres Animaux ; car ils sont formez d'un nombre prodigieux de petites vésicules membraneuses qui tiennent lieu de lames , & ils sont tapissés d'une infinité de petits vaisseaux ; ce qui fait que le sang se répand de telle manière dans la substance des poumons , qu'il se présente aussi à l'air sous une très-grande superficie.

Mais le nombre de ces vaisseaux dans les vésicules du poumon , n'approche point du nombre de ceux des lames. Aussi est-il plus difficile de tirer l'air de l'eau que de respirer l'air pur tel qu'il entre dans les poumons vésiculaires.

Si

Si l'on fait attention au froissement & à la division extraordinaire que souffrent les parties d'eau dans le temps de l'expiration, on sera porté à croire que c'est alors que l'air entre dans les vaisseaux capillaires des ouïes: Il est donc probable que la même chose se passe dans les poumons des autres animaux; car comme il faut à l'air quelque force pour s'insinuer dans les vaisseaux, il ne paroît pas qu'il y puisse entrer dans le temps de l'inspiration, c'est-à-dire lorsqu'il entre naturellement dans les poumons. Au contraire lorsqu'il est repoussé par l'expiration, il cherche à s'échaper de toutes parts; & forçant tous les obstacles qu'il rencontre, il passe au travers des membranes fines & déliées qui composent les vaisseaux, tandis que la plus grande partie de cet air ressort par la trachée-artère.

La difficulté avec laquelle ces petites parties d'air passent par les pores de ces vaisseaux, comprime leur ressort; d'où il s'ensuit que lorsqu'elles y sont entrées, ce ressort doit se débarrasser avec impetuosité contre les particules du sang qui sont alors abatues, agitées & broiées avec violence; ce qui fait qu'elles s'entre-choquent en tout sens; & c'est par là qu'elles acquièrent un nouveau mouvement de liquidité & de chaleur.

Si cela est vrai dans les animaux qui respirent l'air, cela doit être encore plus vrai dans les animaux qui respirent l'eau; parce qu'ici l'air est tout autrement comprimé que ne l'est l'air libre que les premiers respirent; de sorte que le grand écart de ces particules d'air si comprimé doit suppléer en quelque manière à

la moindre quantité d'air qui entre dans les vaisseaux des ouïes.

Quand on considère que le sang des veines des ouïes est d'un rouge plus vermeil que celui de l'aorte, on juge aisément qu'il s'y est chargé de quelques particules d'air. On remarque dans les autres animaux la même différence entre le sang de l'artere du poulmon qui est toujours d'un rouge obscur, & celui de la veine du poulmon qui est toujours d'un rouge fort éclatant.

Le sang ainsi imbreigné des particules d'air & par là devenu vraiment arteriel, entre dans les veines des ouïes; & ces veines sortant de la gouttiere des côtes par l'extrémité qui regarde la baze du crâne, prennent la consistance d'arteres & distribuent ce sang à toutes les parties. Il est ensuite repris par les veines qui le portent au cœur.

Il ne faut pas oublier que l'artere qui sort du cœur a un battement, au lieu que les vaisseaux qui font la fonction d'aorte n'en ont point, au moins qui soit sensible. Premièrement, parce qu'ils n'ont point de communication immédiate avec le cœur. 2. Parce que ce sang y passe d'un petit tuyau dans un grand. Mais il faut aussi considérer que les poussées du sang ne sont nullement nécessaires à la nutrition des parties, pour laquelle il suffit que le sang coule d'un cours paisible; de même qu'il n'est pas nécessaire qu'il coule autrement pour sa distribution & sa circulation, sur tout dans les animaux, où elle est beaucoup plus lente, & qui par là transpirent peu, & peuvent vivre longtemps sans aucune nourriture.

Il est aisé de juger par tout ce qu'on vient de

de dire , que la situation & la conformation des poumons & leur commerce avec le cœur sont bien differens dans les differentes espèces d'animaux ; ce qui n'avoit pas été inconnu à *M. Malpighi*.

Dans le fœtus , il y a des conduits particuliers qui ont une communication si prochaine avec les ventricules du cœur , & la tête des vaisseaux du poumon , qu'ils font passer presque tous les sucs nourrisriers de la mere immédiatement dans l'aorte , qui les distribue à tout le reste du corps ; au lieu qu'après la naissance tout le sang des veines entre dans le ventricule droit , lequel le pousse immédiatement dans les poumons ; d'où , après que par un long circuit il s'est impregné des particules d'air , il passe dans le ventricule gauche qui le répand ensuite par l'aorte dans toutes les parties.

Dans les Tortues , les Grenouilles , & les autres animaux qui leur sont analogues , un tiers du sang passe par le poumon à chaque circulation , & il y reçoit toutes les préparations nécessaires aux fonctions de la vie. Ce sang qui revient du poumon se mêle ensuite avec celui des veines dans la cavité du cœur , où ce dernier étant impregné des parties actives de l'air , dont le premier s'étoit chargé dans le poumon , est ensuite distribué par l'aorte à tout le corps.

Dans les Poissons tout le sang qui sort du cœur passe par le poumon , où s'étant aussi impregné des parties actives de l'air , il va ensuite se distribuer à tout le corps , & jusques-là cette circulation est conforme à celle de l'homme. Cependant les Poissons n'ont qu'un seul ven-



ventricule , mais cette circulation si singuliere vient de ce que l'aorte fait la fonction de l'artere du poumon , & que les veines du poumon devenues arteres font la fonction de l'aorte.

Dans les insectes les trachées qui leur servent de poumon , sont répandues dans toutes les parties où elles se ramifient à la maniere des bronches dans les poumons vésiculaires ; de sorte qu'au lieu que dans les autres animaux l'air emprunté des bronches est distribué dans toutes les parties par les arteres ; ici il est immédiatement distribué dans les suc qui sont actuellement dans chaque partie.

La raison d'une distribution si surprenante vient de la nature des liqueurs contenues dans les tuyaux de ces animaux , lesquelles , pour être extrêmement gluantes & visqueuses & par conséquent très-propres à se lier entr'elles & à se coler à la superficie de leurs vaisseaux , ont dû être imprégnées , dans tout leur cours , des parties actives de l'air qui facilitassent leur circulation & les rendissent propres à la nourriture.

On voit par cette énumération , que les fonctions des poumons n'ont pas toujours une étroite liaison avec celles du cœur , & que chacune de ces parties a des usages fort differens par rapport au sang.

Le cœur n'est que pour le mouvement qu'on nomme circulation. Le poumon la favorise par l'introduction des particules d'air , & encore par l'impulsion de l'eau dans les animaux dont il s'agit. Mais sa principale fonction est d'imprégner le sang d'air , & de le rendre par là capable de porter par tout l'aliment , la vie

& la chaleur. C'est pour cette raison qu'on vient de montrer, 1. que dans tous les animaux, hors les insectes, le sang ne passe jamais du cœur dans l'aorte qu'il n'ait passé par les poumons mêmes dans le fœtus, de la manière dont nous l'avons expliqué. 2. Que dans la plupart il faut qu'il y passe nécessairement tout entier, comme dans l'homme, les animaux à quatre pieds; les Oiseaux & les Poissons. 3. Ou qu'il y passe en partie, comme dans les Tortues, les Grenouilles, &c. Et il est nécessaire qu'au moins le tiers du sang passe par les poumons de ces animaux, pour être vivifié autant que le demandent leurs fonctions.

Enfin on a montré que si dans les insectes il n'y a point de poumons par où le sang puisse passer, c'est que l'air se mêle nécessairement dans toutes leurs parties avec les sucs nourriciers; de sorte que par cette mécanique chaque partie se tient lieu de poumon à elle-même.

Comme ce qu'on vient de dire touchant la respiration des Poissons a été lû dans une Assemblée publique, on a été obligé de se resserrer dans les bornes étroites que l'heure prescrivait. Mais on espère dans la suite traiter plus amplement cette Matière.

S E C O N D  
 M E M O I R E  
 SUR LA FECONDITE' DES PLANTES.

*Conjectures sur ce sujet.*

Par M. DODART.

\* J'AI dit à la fin du Mémoire précédent que les branches & tout ce qui s'ensuit de leur subdivision, c'est-à-dire les feuilles, les fleurs, les graines sont actuellement dans la plante naissante. J'entens les graines & tout ce qu'elles contiennent dès leur première origine, c'est-à-dire radicule, plantule, & tout ce que ces parties naissantes comprennent; racines, tiges, branches, rameaux, fleurs, graines, & ainsi de suite à l'infini, c'est-à-dire tout ce qui compose médiatement ou immédiatement la fin & les moyens de la multiplication successive & perpétuelle, mais je ne l'ai vû ni prouvée nulle part. C'est une proposition hasardée par plusieurs Auteurs: Reste donc à la rendre au moins probable si on ne peut parvenir à la rendre certaine.

A l'égard de la multiplication actuelle des branches qui arrive ensuite des retranchemens, il semble impossible qu'elle paroisse comme elle paroît, s'il n'y avoit eu dès avant le retran-

O 2

che-

\* 10. Dec. 1701.

chement un bourgeon invisible , par tout où dans la suite il paroît une nouvelle branche. Or qui dit bourgeon petit ou gros , invisible ou visible , dit une branche en raccourci avec tout ce qu'elle doit produire : C'est ce qu'on voit au Printemps dans la génération ordinaire. Car les yeux des Arbres qui ont commencé à poindre dès l'Automne pour être mis en réserve sous un grand nombre de diverses enveloppes sans augmenter de volume durant tout l'hiver, prennent , au premier degré de chaleur du renouveau , un accroissement soudain qui rend sensible , démêle & déploie , quelquefois en deux ou trois jours , tout ce qui étoit raccourci comme en un point indivisible à toute l'industrie humaine & par là impénétrable aux sens , mais très-distinct & très-démêlé en lui-même. Voici ce qui m'a fait entrer dans cette pensée.

\* Si cela n'étoit ainsi , il n'y auroit dans un Arbre étêté que sa charpente grossière , c'est-à-dire la gerbe des fibres & la sève de l'Arbre. Il ne s'agit donc que de savoir si la sève peut produire des bourgeons , c'est-à-dire des branches & tout ce qui s'ensuit , car je ne crois pas que personne s'avise d'attribuer aucune production aux fibres. Un Corps mort , immobile , purement passif ne produit rien. Les fibres sont telles par elles-mêmes & conçues comme étant séparées de la sève. Elles sont à la vérité capables d'être allongées , & peut-être d'être

\* I. Principe de cette pensée.

Comme tout animal naît d'un mâle dans une femelle ; toute Plante naît d'une graine dans la terre ou dans quelque matrice équivalente.

tre grossies , dilatées , dégauchies , mais elles sont incapables de tout cela par elles-mêmes & la seule sève qui leur tient lieu de sang & de vie les rend capables de tous ces changemens ; & je ne vois pas que tous ces changemens étant pris ensemble ou séparément, puissent produire une seule feuille. L'accroissement des fibres peut allonger & grossir le Skelet de l'Arbre , & cet accroissement peut bien être une condition nécessaire à l'accroissement du bourgeon : mais il est impossible de concevoir que les fibres puissent être à elles-mêmes ni principe d'accroissement ni par l'accroissement, principe de génération.

S'il y a donc dans l'Arbre quelque principe capable de produire quelque partie nouvelle , c'est la sève. La sève de l'Arbre est la sève de la terre-reçue dans l'Arbre. J'entens par la sève de la terre , son humidité avec ses modifications particulieres qui sont infiniment plus générales que celles qu'elle emprunte de l'Arbre où elle est reçue. Les modifications de la sève de chaque espece de terre toutes générales qu'elles sont , ne laissent pas de la rendre plus propre à certaines plantes qu'à d'autres & la rendent même inhabile à élever certaines plantes. Telle est la sève de la terre du *Brazil* à l'égard de l'Ail & de l'Oignon. Mais enfin quelque favorable que la sève d'une terre soit à une graine , elle ne produira jamais cette graine. Aussi ne se trouvera-t-il pas qu'aucune terre produise jamais par elle-même aucune des plantes qui y réussissent le mieux , & il se trouvera toujours que la production de la plante qui vegete le mieux dans une certaine espece de terre , suppose inévitablement une

graine présentée à la sève de cette terre. La sève de la terre est donc très-propre à nourrir quelque chose d'actuellement existant ; mais comme entre les animaux nulle femelle ne produit jamais aucun animal par elle-même , ni la terre ni sa sève ne produiront jamais rien d'elles-mêmes. Toute plante naît d'une graine déposée dans la terre ou dans l'eau , ou sur quelque corps qui lui tient lieu de terre , comme les mousses & les hepaticques sur l'écorce des arbres , & sur les pierres. Tout animal naît d'un mâle & croît dans la femelle du même genre ou d'un genre analogue. Toute plante naît d'une graine dans la terre ou dans quelque matrice analogue ; d'où elle tire son accroissement , non son être.

Or qu'est-ce que la graine d'une plante ? C'est un bourgeon de plante abrégée accompagnée d'une pulpe qui lui tient lieu de *placenta*. Ce bourgeon est comme planté dans cette pulpe pour recevoir par ce philtre la seule sève de la terre en certaines plantes où la pulpe féminale demeure sous terre durant tout le cours de leur germination , comme les légumes , c'est-à-dire toutes les espèces , de pois , fèves &c. Les grains , blé , seigle , orge , avoine , les Chênes même , &c. ; car en presque toutes les autres plantes outre la sève de la terre , les plantes naissantes reçoivent celle de l'air par leur pulpe poussée à l'air sous l'apparence de deux feuilles ; & c'est par cette pulpe que la jeune plante croît jusqu'au point de subsister par elle-même dans les deux parties qui composent la plante abrégée. Ces deux parties sont la racine & la pousse.

Si cette graine est considérée comme un œuf

œuf d'Oiseau ou de Poisson, suivant l'expression d'*Empedocle* dans *Aristote*\*, le contenu dans la cicatricule y sera la plante dans ses deux parties. Le jaune & le blanc seront la sève de la terre, entant que filtrée dans la pulpe & transmise de la pulpe dans la plante. Toute la charpente de l'animal, & par maniere de dire, la fourniture dont elle est garnie, parenchymes, enduits, canaux, &c. tout cela est dans la cicatricule. Le jaune & le blanc fournissent la seule matiere de l'accroissement. Il en est de même dans la plante naissante. Toute la plante est dans le germe, la terre fournit la seule matiere du seul accroissement des deux parties actuelles & distinctes dont le germe est composé. Et comme personne ne peut dire que le jaune ni le blanc forment aucune des parties du Poulet, personne aussi ne doit penser que la sève de la terre forme aucune des deux parties de la plante naissante ni des parcelles qui constituent la pousse ou la racine. On le pensera même moins des graines que de l'œuf. La sève de l'œuf, je veux dire le liquide du jaune & du blanc, passent immédiatement au corps de l'Oiseau; mais aux plantes, la graine a beaucoup plus de rapport à l'arrière-faix des Quadrupedes: car la sève de la terre est filtrée au travers de la pulpe, dont l'usage en ceci a quelque rapport à celui du *Placenta* dans les animaux à quatre pieds. Dans ces animaux & dans les plantes, c'est un intermede qui appartient tout à fait à l'embryon, né avec lui, aussi ancien & aussi nouveau que lui; en un mot cet

O 4

in-

\* De la génération des Animaux l. I. c. 23.

intermede est fait pour lui & par conséquent il a dû être garni de tous les conduits & de tous les levains necessaires pour filtrer & disposer la sève générale de la terre d'une maniere particuliere propre à nourrir la jeune plante, jusques à ce que la racine bien empreinte de ce suc particulier soit devenue capable de recevoir & changer par elle-même la sève de la terre d'une maniere qui la rende propre à nourrir la pousse, & ce même intermede poussé à l'air & verdi en feuilles en la plupart des plantes hors les légumes, les graines &c., a dû être garni de même de tous les conduits & de tous les levains necessaires pour filtrer & disposer la sève générale de l'air, jusques à ce que la pousse bien empreinte du suc particulier fabriqué & assaisonné dans cet intermede, soit devenue capable de recevoir & de changer par elle-même la sève de l'air d'une maniere qui la rende propre à nourrir la racine.

Je reviens au principe de tout ce raisonnement, & je dis: nulle plante ne naît immédiatement de la terre. Toute plante vient d'une graine conçue dans la terre. Ce n'est point la terre qui la nourrit immédiatement; c'est la pulpe de la graine qui nourrit la plante de la graine, aussi la plante n'est-elle pas plantée immédiatement dans la terre, mais dans la pulpe de la graine où elle a ses premieres racines qui sont les vaisseaux de son *placenta* qui tous aboutissent au collet de sa radicule & de la plantule. Voilà pour ce qui regarde la sève de la terre à l'égard de la premiere production de la plante.

Il me paroît clair que cette premiere production n'est point une vraie production d'un être



être nouveau , mais la manifestation d'un être déjà formé, mais invisible dans les petites graines , rendu visible par son accroissement & connoissable par le développement de ses parties. Pour cela il doit suffire à tout Physicien de voir dans quelques graines l'embryon de la plante toute formée , & d'entrevoir par la structure des parties des plantes, qu'il est absolument impossible d'en expliquer la formation. Cette impossibilité ne peut être prouvée que par un détail qui sera le sujet d'un autre Mémoire. En attendant chacun peut s'en persuader en cherchant dans les Auteurs , & dans soi-même des principes d'où il puisse déduire le détail de la formation. On n'a qu'à voir sur cela le livre des Principes entre les Oeuvres attribuées à *Hippocrate* , les Livres d'*Aristote* sur la génération des Animaux ; ceux de *Theophraste* sur les causes de Plantes , & celui de *Galien* sur la formation du *Fœtus* , & après un peu de réflexion on reconnoîtra qu'il n'y a rien dans tous ces grands Ouvrages qui soit capable de la résoudre ni de l'éclaircir , ni même qui touche la question ; tout s'y réduit à des faits que tout le monde sait , & que les Philosophes mêmes ont appris des Jardiniers , & des gens de Ménagerie.

Supposant donc cette impossibilité comme prouvée par l'impuissance où tous les hommes se trouvent à cet égard , en attendant des preuves positives que j'espère donner un jour ; je dis que par l'embryon de la plante formé dans les grandes graines , tout Physicien a raison de penser qu'il y a dans chaque petite graine un petit embryon de la plante qu'elle doit mettre au jour , fut-elle aussi petite qu'un grain de

poussière ; comme les graines des Capillaires, des Mousses, &c. \* Je dis en second lieu que par l'impossibilité de concevoir la formation de

\* Ces graines qui ne se voyent gueres qu'avec des Microscopes sont échappées à l'attention des Anciens, & à cette occasion *Aristote* a cru que quelques Plantes & même quelques Animaux s'engendrent d'eux-mêmes. *Theophraste* l'a dit de quelques plantes, & a cru outre cela une certaine métamorphose des plantes l'une en l'autre, mais on ne fait pourquoi ; si ce n'est que ces deux grands Philosophes n'y ont pas regardé d'assez près, & n'ont pas assez approfondi leur propre pensée ; car cette pensée approfondie montre une contradiction manifeste dans les termes. Et l'on en est d'autant plus surpris quand on voit qu'*Aristote* a fort bien su que le mâle engendre seul, que la femelle ne donne que le couvert, & l'aliment au principe de la génération reçu du mâle, & que la jonction des deux sexes est nécessaire pour la génération de la plupart des insectes. (Voyez *Aristote* au l. 1. de la Génération des Animaux ch. 1.) Mais on est bien plus surpris de voir dans le *Timée*, & dans le *Critias* de *Platon*, que les hommes mêmes sont nez de la terre, chaque Nation dans son pays, & celles de l'Isle Atlantique, comme les autres ; & quand on remarque que cette étrange opinion rapportée par *Critias* sur les Mémoires de *Solon*, non comme opinion Philosophique, mais comme une Tradition des Prêtres Egyptiens, est prise pour authentique par *Critias* ; on s'étonne moins de voir *Lucrece* aller jusqu'à dire que les matrices étoient autrefois des plantes qui prenoient leur accroissement de la terre par leurs racines, & que les premiers hommes étoient le fruit de ces plantes : car on fait que tout paroît bon à un *Epicurien*, pourvu qu'il puisse se passer d'admettre un Esprit souverain, Moteur de la Nature.

de quelque plante & de quelque être vivant que ce soit, tout Physicien est en droit de soupçonner qu'il ne se produit rien de nouveau. Aussi vois-je tous les Physiciens modernes qui considèrent la nature avec attention, persuadés de quatre veritez, qui sont autant de principes, d'où s'ensuit, que toutes les générations ne sont que des accroissemens.

La première de ces veritez, est que nulle plante ne naît sans graine, ou partie de plante équivalente: La seconde que cette graine, ou équivalence, n'est pas un être informe, purement matériel, & inarticulé: mais au contraire qu'elle est d'une structure, tant interne, qu'externe, arrêtée, précise, & uniforme dans chaque espèce en tout ce qui est essentiel à l'espèce. La troisième, que nul animal ne naît que de la jonction des deux sexes au moins dans le même genre. La quatrième qu'encore que la semence du mâle ne paroisse point d'autant articulée, au lieu que celle des plantes l'est parfaitement, néanmoins elle contient des animaux incomparablement plus articulés qu'aucune graine, quoi qu'infiniment plus petits que la plupart des graines les plus menues. Or il s'ensuit de là: 1. Que la terre n'est capable que de couvrir, faire éclore, & nourrir, & non d'engendrer. 2. Que les plantes sont toutes en leur manière comme des mâles, par leurs graines, & les équivalences de la graine & la terre comme la femelle commune à tous ces mâles, & que les animaux sont à cet égard comme les plantes, & qu'il n'y a que le mâle, qui produit; c'est-à-dire qui met au dehors les êtres qui lui doivent succéder, déjà tout formés,

mez, & même tout animez; quoique sous une figure très-différente comme chacun le peut voir dans le genre des Grenouilles, qui naissent Poisson composé d'une grosse tête, & d'une queue ondoyante, & deviennent Quadrupedes amphibies; & dans celui des Insectes volants qui naissent Vers, & deviennent Oiseaux dès que leur maillot est rompu. 3. Que la femelle n'est que pour couvrir, & faire éclorre ces embryons ou au dedans d'elle-même comme les quadrupedes, ou au dedans, & au dehors comme les oiseaux; ou pour leur donner le couvert seulement au dehors d'elle-même par les œufs infconds qu'elle offre au frai du mâle, dont le contact rend les œufs feconds en y introduisant l'Animal embryon, qui par ce moien est donné à couvrir à l'eau, ou à la bourbe, & à la chaleur du Soleil, comme dans le genre des Poissons écailleux. 4. Qu'ainsi le mâle même, à proprement parler, ne produit rien, mais met seulement en dépôt sa postérité qui lui a été confiée toute formée, ou dans la femelle, comme le genre des quadrupedes, des Poissons cetacées, & des oiseaux, ou hors la femelle dans ses œufs mis au jour, comme font les Poissons écailleux, & les Papillons des chenilles, ce qui se voit manifestement dans les Vers à foye.

J'avoue que tout ceci ne fait pas une démonstration, à la maniere des Géometres; ce n'est pas non plus un principe clair par soi-même; mais aussi n'est-ce pas une simple pensée qui n'ait autre fondement qu'une conjecture. Il me paroît au contraire que c'est une de ces pensées raisonnables dont on ne peut à la vérité convaincre personne par des Argumens, mais

mais à laquelle on ne peut gueres résister que par une prévention contraire; & dont chacun se peut convaincre soi-même en la repassant plusieurs fois & en la recherchant par les observations & par les comparaisons. Car plus on recherche telles pensées fondées sur des principes certains, mais inusitées, peu approfondis, & par cette raison, ayant besoin d'être suivis pour être développés, plus on s'y confirme & par les observations & par le démentement des principes; & lors qu'on en est venu là, ces principes deviennent en Physique ce que les axiomes sont en Géométrie, c'est-à-dire des fondemens d'une espece de démonstration; car il y en a en Physique & même en Medecine, quoi qu'en petit nombre & seulement dans certaines matieres. Mais ce sera le sujet d'un autre Mémoire: je reviens au sujet de celui-ci.

Ce que j'ai dit sur la sève de la terre & sur son entière incapacité à produire rien de nouveau, je le dis de la sève du *placenta* de toutes les plantes. Dès que la plante paroît, tout ce qui paroîtra dans la suite est déjà formé au dehors & au dedans. Ce n'est pas le *placenta* qui l'a formée. Il ne l'a pas formée par sa partie solide; cette partie n'est qu'une charpente immobile, incapable d'action. Il ne l'a pas formée par sa partie liquide qui n'est capable ni de se donner une figure ni d'en communiquer aucune, mais qui est au contraire très-capable de la recevoir par tout ce qui peut la contenir ou la transmettre. Elle est à la verité capable de mouvement interne & seulement en elle-même, mais non d'un mouvement progressif sur tout de bas en haut.

Tout cela d'ailleurs suppose un moteur ; & la progression de la sève dans l'embryon de la graine de bas en haut & de haut en bas suppose des tuyaux & des arrosoirs. Ce n'est pas non plus la plante qui se forme elle-même, car en remontant on trouveroit qu'elle seroit avant que d'être, & en descendant on reviendroit à ce qui vient d'être dit du *placenta* & de la sève.

Et c'est ce qui m'a porté à penser sur l'origine de tout ce qui paroît dans la suite de la vie, de toute plante, soit dans les évolutions naturelles, soit à l'occasion des évolutions forcées, tout ce que j'avois pensé sur l'origine de la plante même.

\* Tous les animaux naissent parfaits ; & c'est pour cela que si on en retranche quelque partie, tant s'en faut qu'on les voye comme les plantes non-seulement se réparer, mais multiplier ; qu'au contraire l'animal se trouve pour toujours privé de la partie retranchée sans trouver d'ailleurs aucune ressource. Mais les plantes n'arrivent jamais à la perfection de leur structure, qu'au moment qui précède celui de leur mort ; & toute leur vie n'est qu'une germination réitérée, & une naissance successive. Ainsi dès que la dernière a paru, là commence leur mort qui arrive successivement & par parties comme le progrès de leur vie, mais en un sens contraire ; car comme l'Arbre

\* II. Principe de cette pensée.

Nulle plante n'arrive jamais à son entière perfection par rapport aux parties qu'elle contient, & sa vie est une continuelle succession de germinations des parties plantées les unes dans les autres.

bre a commencé à vivre par le pied, il commence à mourir par la cime.

Cela étant, comme la première pousse a été dès l'origine, plantée, non dans la terre, mais dans son propre *placenta*; la seconde dans les plantes vivaces se trouve plantée dans la première, & commence à poindre à la fin de la première année pour paroître dès le Printemps de la seconde: la troisième se trouve plantée dans la seconde, & commence à poindre dès la seconde année finissante pour paroître au Printemps de la troisième: la quatrième dans la troisième, & ainsi de suite jusques à la centième & par delà dans les plantes de longue vie telles que sont les Arbres, comme les Chênes, les Ormes &c. selon le progrès & la durée de la vegetation. Suivant cette idée, les branches se trouvent dès l'origine de la plante, plantées dans le tronc, les rameaux dans les branches, les brins dans les rameaux, les pedicules dans les brins, &c. Toutes ces parties à commencer depuis les secondes racines jusques aux dernières, & depuis le colet de la racine jusques au fruit, servant de *placenta* les unes aux autres; la racine fournissant à ces *placentas* par l'entrepôt du tronc & des branches, le suc nécessaire à l'accroissement du bourgeon.

Il me semble donc que je dois dire de la sève de l'Arbre ce que j'ai dit de celle de la terre & de celle de la pulpe. Cette sève n'est pas faite pour rien produire, mais pour donner accroissement & nourriture à des parties actuellement existantes. Il faut donc que la branche soit avant que de se nourrir & de croître. Sans cela comme la sève de la terre ne pous-

poufferoit jamais aucune plante sans être impregnée d'une graine actuelle, & ne feroit que s'exaler inutilement s'il n'y avoit point de graine, la sève de l'Arbre ne poufferoit jamais aucune branche, si l'Arbre qui la pouffe par l'impulsion & l'insinuation de la sève n'étoit impregné d'un bourgeon actuel qui lui tient lieu de plantule, comme l'Arbre tient lieu de *placenta* au bourgeon par la partie où il se trouve implanté. Ainsi dans les productions forcées, occasionnées par des retranchemens, la sève ne feroit que suinter par le moignon de l'Arbre retranché comme on voit arriver en quelques rencontres, s'il n'y avoit des bourgeons actuels quoi qu'invisibles qui présentant leurs tuyaux ouverts à la sève de l'Arbre élançée de bas en haut, la reçoivent & en profitent pour leur accroissement.

Sans le retranchement la sève auroit toujours été son droit chemin dans les branches & dans les rameaux déjà déploiez & malgré le retranchement sans les bourgeons invisibles & innombrables dont tout le tronc étêté est parsemé, & sur tout ceux qui se trouvent rangez autour de la couronne; sans ces bourgeons, dis-je, la sève renfermée & recognée par l'air & par le retrécissement de l'extrémité des fibres desséchées & quelquefois emplâtrées de terre & de linges, ne feroit au plus que suinter par le contour de l'Arbre, comme il arrive quand par quelque cause externe il s'y trouve quelque ouverture sensible. Et malgré les bourgeons invisibles cachez dans le contour du reste du tronc au dessous de la couronne, la sève élançée droit jusqu'à l'endroit retranché passe sans s'écarter vers ces bourgeons qui  
ne



ne paroîtront que quand un nouveau retranschement d'une portion du tronc obligera la sève à s'épancher dans ces bourgeons, qui sans cela n'auroient jamais paru. A peu près comme on disoit il y a quelques années que certaines terres fouillées profondément donnerent lieu de germer à quelques graines comblées depuis un temps immémorial, & de pousser plusieurs pieds d'une plante dont l'espece avoit péri dans ce canton, où sans cet accident elle n'auroit peut-être jamais reparu.

Voilà les deux Principes sur lesquels j'ai fondé ce Mémoire que j'abrege en cette seule Proposition: Comme toute plante sortant immédiatement de la terre suppose nécessairement une graine actuellement existante & même préexistante, & une plantule dans cette graine que la sève de la terre ne fait que grossir & déployer. Ainsi toute pousse ordinaire ou extraordinaire, naturelle ou forcée, suppose dans la plante un bourgeon en raccourci actuellement existant & même préexistant avec tout ce qu'il doit naturellement contenir. La sève de l'Arbre ne le produit nullement, mais le fait seulement grossir au point de le rendre visible, l'allongeant ensuite & déployant à proportion de son accroissement sans y rien ajouter que le volume & sans y rien changer que la consistance, la couleur & la proportion des parties qui le composent: ce qui suppose préexistence non-seulement du bourgeon & de tout ce que doit contenir un bourgeon à feuilles, mais un bourgeon à fruit; c'est-à-dire des graines & tout l'appareil de la multiplication ordinaire dans chaque

que individu de chaque génération.

Il est vrai que cela semble aller à l'infini ; mais il me paroît que cette espece d'infini n'est point du tout un inconvenient , parce que cette infinité n'est qu'une infinité négative, telle qu'elle se trouve dans l'étendue & dans les nombres ; car on ne peut nier cette double espece d'infinité négative. On ne peut nier celle des nombres, puisqu'on ne peut assigner aucun nombre, quelque grand qu'il puisse être, qui ne puisse être augmenté à l'infini, dès qu'on n'applique ce nombre à aucune quantité déterminée quelque petite qu'on la puisse imaginer. Au contraire on ne peut imaginer aucune étendue si petite dans un corps quel qu'il soit qui ne puisse être divisée à l'infini dès que les subdivisions seront contenues les unes dans les autres ; c'est-à-dire la seconde dans une des parties de la première, la troisième dans une des parties égales de la seconde ; ainsi à l'infini, quelque multiple que puisse être la première division & les subdivisions suivantes, pourvu qu'elles soient supposées en nombre fini. Or tout cela se rencontre dans cet infini prétendu qu'on pourroit sans cela reprocher à ce Mémoire.

Si l'on compte pour un inconvenient la multitude infinie des individus de Chênes renfermez dans le premier Chêne, & la multitude infinie des animaux renfermez dans le premier animal de chaque espece, il n'y a pour se tirer de cet embarras prétendu qu'à considérer que tous ces Chênes & tous ces animaux futurs dans toutes les lignes de descendance directe dans les plantes, & tant directe que collaterale dans les animaux en remontant,

sont

font enfermées dans celui qui les doit mettre au jour & n'en font qu'une très-petite partie, parce que le chef de chaque ligne contient toute cette ligne de descendance selon les degrés d'étendue diminuée d'une certaine quantité proportionnée au contenant qui convient à chaque degré de descendance. Cela étant, quand je supposerois dans le premier Chêne créé parfait, un aussi grand nombre de Glands au moment de sa création que j'ai calculé de graine plate & feuillue actuelle dans un Orme qui vivra cent ans, c'est-à-dire 20.000.000. il n'en sera pas plus incommodé que cet Orme l'étoit à la fleur de son âge de toute sa postérité qui ne devoit croître que successivement pour paroître chacune en son temps. Car la partie féminale d'un Arbre adulte qui doit produire au renouveau prochain, n'est peut-être pas durant l'hiver la dix millionième partie de son corps, & ce fardeau ne le charge que quand cette multitude si nombreuse ayant pris son accroissement est prête à tomber. Il en est de même dans les animaux excepté que leur fruit venu à maturité leur pèse davantage; quoi qu'il soit infiniment moins nombreux. Mais les vers feminaux qui entrent en mouvement chez eux de saison en saison en une multitude si prodigieuse, mais d'une petitesse encore plus prodigieuse, puisqu'à peine égaient-ils chacun la millionième partie d'un grain de sable; tous ces vers, dis-je, ne font qu'une partie infiniment petite du corps de la plupart des animaux & n'est pas capable de les charger. Ceux qui doivent entrer en action dans la saison prochaine immobiles & engourdis comme des bourgeons d'Automne, les in-

com-

commodent encore moins: Enfin toute la posterité qu'ils contiennent chacun à l'infini sans mouvement & contenus les uns dans les autres pour entrer en action de génération en génération selon l'ordre des successions: Toute cette posterité, dis-je, leur est comme si elle n'étoit pas; car que leur importe qu'un seul de ces animaux contienne en soi-même un nombre infini de générations chacun de plusieurs millions d'animaux, si tous ces millions d'animaux contenus les uns dans les autres, n'occupent qu'une très-petite place dans cet animal seminal qui n'est que la millionième partie d'un grain de sable. Il y a donc aussi peu de sujet de craindre que les êtres vivants soient surchargez de leur posterité toute actuelle qu'on la suppose qu'il y a peu de sujet de craindre qu'ils manquent de posterité.

Cette double indéfinité en nombre & en petitesse n'est donc pas un inconvenient dans ce Système. Il me paroît d'ailleurs impossible d'expliquer la fécondité par toute autre hypothèse. Car celle de la formation prétendue tentée par l'Auteur du Livre des Principes ou des Chairs qu'on a dans les Oeuvres & sous le nom d'*Hippocrate*, & par *Galien* dans le Livre de la formation du Fœtus, renferme un nombre infini de contradictions, de pétitions de principe & d'impossibilité manifestes. Il n'y a qu'à approfondir pied à pied pour s'en convaincre.

Au contraire tout semble confirmer le Système insinué dans ce Mémoire, non-seulement les principes posez & avouez des Physiciens, mais la chose même qui semble se montrer d'elle-même.

Pour

Pour en être persuadé il ne faut que considérer ce qui suit.

1. Dès que les parties dont les bourgeons des Arbres sont composez sont assez grandes pour être feuilletées par un instrument non tranchant, très-fin, on démêle les feuilles & les fleurs; or les fleurs supposent le fruit en raccourci dans la plupart des plantes, avec tout l'appareil dont il a besoin pour sa perfection & pour sa conservation; umbilic, enveloppes, style, étamines, sommets; car la graine de la plupart des plantes est dans la fleur ou sous la fleur.

2. On ne peut donc douter à l'égard des herbes que la première pousse ne contienne tout actuellement en raccourci, puisqu'on trouve même la fleur dans la racine de certaines plantes, par exemple des plantes bulbeuses, & par conséquent le fruit.

3. On peut donc aussi peu douter qu'on ne trouve tout actuellement formé dans toutes les pousses des herbes coupées depuis la première coupe jusques à la 20. & 25. qui paroissent successivement après chaque retranchement environ de cinq en cinq, ou de six en six jours durant quatre ou cinq mois, par exemple, dans l'ozeille.

4. On peut donc sans temerité porter le même jugement & former la même conjecture des bourgeons qui commencent à poindre dès l'Automne dans les Arbres, & que l'Hiver maintient dans le même volume jusqu'au Printemps qu'ils prennent un accroissement aussi soudain que la 2. la 3. la 4. & la 20. ou 25. pousse des herbes. Car souvent cinq jours grossissent les bourgeons au point de pouvoir être feuilletés.

5. On

5. On doit donc avoir la même pensée des bourgeons de ressource qui paroissent d'une sève à l'autre en certains Arbres & à d'autres d'une année à l'autre : & ces bourgeons paroissent innombrables, puisqu'il n'y a nul endroit où on ne les puisse supposer suivant ce qui a été dit ; cependant suivant le même principe ils doivent être supposés actuellement existans avant le retranchement.

6. Et ce qui semble confirmer ceci, est que dans les Arbres que l'on ente en tuyau comme les Châtaigniers, chaque tuyau portant 3. ou 4. yeux, il n'y a que ces yeux qui profitent de la sève qui ne produit rien par tout ailleurs dans le même contour, ce qui fait voir que la sève ne produit rien. Cependant, dès que ces yeux auront produit une branche, on en trouvera le bois inséparablement uni au bois du sauvageon, ce qui semble ne pouvoir être qu'en supposant, que l'œil de l'écorce du franc a rencontré précisément à l'endroit où il a été appliqué, la partie ligneuse d'un autre œil invisible préexistant dans le bois du sauvageon, & de même vis-à-vis des autres yeux du même tuyau ; ce qui suppose encore un coup non seulement préexistence, mais encore multitude presque infinie.

Je ne vois donc plus qu'un inconvenient dans ce Systême ; c'est que, soit qu'il soit vrai, soit qu'il soit faux, il nous renvoie immédiatement au miracle de la création ; car la génération étant impossible sans semence ou équivalent, c'est-à-dire sans graine & sans bourgeon, ou tout a été créé dès l'origine des choses, ou il se fait tous les jours des créations : Or les Physiciens comptent avec justi-

ce pour un défaut dans un Système d'y introduire Dieu comme en machine. Ces dénouemens, dira-t-on, peuvent être soufferts dans les Pièces de Théâtre, quand le sujet le merite, mais non pas dans un Discours physique.

Cette objection seroit recevable si, laissant là des causes physiques explicables au moins en général, on avoit recours à quelque fiction qui n'auroit pour fondement que l'embarras où on se trouve. Car quand on a parcouru & épuisé tous les Systèmes qui peuvent expliquer les nouvelles générations: Si on ne trouve rien qui y satisfasse; si on trouve même dans l'ordre général de la nature une nécessité indispensable & sans exception de poser une préexistence enveloppée, sans nouvelle génération; qui peut trouver mauvais qu'on dise, ou qu'il ne se fait rien de nouveau, ou que s'il se fait quelque nouvelle production, c'est par la même puissance qui agissoit au moment de la première création & de la même manière; c'est-à-dire par une nouvelle création.

Je ne vois pas de milieu dans cette alternative. Il me semble donc qu'il est plus philosophique de penser que Dieu a tout créé à la fois, comme semble le marquer la lettre de ce passage: \* *Deus creavit omnia simul*. Mais quelque parti qu'on prenne dans cette alternative, ce n'est point introduire le Créateur en machine où il n'est pas, mais le trouver où il est en approfondissant la nature. Or tant s'en faut que ce soit un inconvenient en physique que c'est son plus noble usage que de nous mener à ce but, & que la Nature même  
toute

\* Eccles. XVIII. 1.

336 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
toute entiere n'est faite que pour cela seul.

Ce n'est donc pas une pensée gratuite & sans fondement; mais une conséquence nécessaire de l'état des corps vivants que de dire, \* que tout ce qui paroît dans le cours d'une longue vegetation étoit dans le germe & par conséquent que tous les corps vivans étoient dans le premier de chaque espèce, & que tout a été fait ensemble; c'est-à-dire que toutes les parties & même toute la posterité de tout être vivant ont été produites au même moment; mais ce doit être le sujet d'un 3<sup>me</sup>. Memoire, dans lequel on tâchera de prouver de plus en plus, tant par la structure du corps des animaux que par celle des plantes, que la génération n'est qu'une augmentation, & la multiplication forcée une simple manifestation des reserves, & qu'il est comme impossible que cela soit autrement.

~~~~~

## CONSTRUCTION

*D'un nouvel Astrolabe universel.*

Par M. DE LA HIRE.

\* **O**N n'a donné jusqu'à présent que deux Constructions différentes d'Astrolabes universels. Le premier porte le nom de *Royas*, dont nous avons une Description imprimée

\* 3. Decembre 1701.



primée à *Paris* en 1551. L'autre est de *Gemma Frison* dont on en trouve plusieurs exécutez en grand & avec beaucoup de justesse. Mais ces deux Astrolabes ont des défauts ou incommoditez considerables dans la représentation du Globe ou de la Sphere.

Dans le premier dont la projection se fait par des Lignes paralleles entr'elles, ou bien l'œil étant supposé à une distance infinie, les divisions du Planisphere ou de l'Astrolabe en degrez du centre à la circonference, sont si serrées vers les bords du cercle extérieur, qu'il est presqu'impossible de les pouvoir distinguer les uns des autres; & par conséquent les figures qu'on y représente y sont si défigurées, qu'on ne peut les reconnoître qu'avec peine. Il a pourtant un avantage considerable, que plusieurs des cercles de la Sphere y sont representez par des lignes droites, ce qui donne une grande commodité dans sa description, & dans quelques-unes des operations qu'on y fait.

Le second, qui est celui de *Gemma Frison*, dont l'œil dans la projection est placé à l'extrémité d'un Diamètre sur le Globe, lequel est perpendiculaire au plan de l'Astrolabe, représente les degrez de l'Hemisphère fort serrez vers le centre de l'Astrolabe, & fort écartez les uns des autres vers le bord extérieur, ce qui fait une difformité dans les figures ou dans les positions des parties du Globe qu'on y représente.


Celui-ci n'a pas tant de commoditez que l'autre dans son usage, à cause que pour les cercles la plus grande partie y sont representez par des portions de cercles, & dans l'autre

par des lignes droites : mais il y en a aussi de plus utiles qui sont formez par des demi-Ellipses qu'on regarde comme des lignes plus composées & plus difficiles à décrire que des cercles qui sont les seules courbes de l'Astrolabe de *Gemma Frison*.

En examinant les incommoditez de ces deux Astrolabes, j'en ai trouvé un qui étant aussi universel n'a pas leurs défauts ; car les degrez qui sont représentez sur les diamètres de l'Astrolabe y sont à très-peu près égaux entr'eux ; & comme il est fait par une projection reguliere de la Sphere, comme les autres ; il peut servir aussi aux mêmes usages & avec autant de justesse. Par ce moyen les Figures qu'on y représente sont à très-peu près dans la même proportion que celles du Globe, autant qu'il est possible de faire dans la représentation d'un Hemisphere sur un plan. Voici sa construction.

Soit *FDGH* le plan d'un des grands cercles du Globe ou de la Sphere, lequel soit imaginé perpendiculaire au plan de l'Astrolabe, & passant par son centre *C*, & par conséquent *FCG* est le diamètre commun de ces 2 cercles. Soit *DCH* un autre diamètre perpendiculaire à *FCG* lequel soit prolongé en *O*, & soit pris *HO* égal au sinus *AB* de l'arc de 45 degrez *DA*. Ce point *O* sera le centre ou la place de l'œil dans la projection de cet Astrolabe.

Je dis premicrement que si du point *O* on mène le rayon *OA* jusqu'au point de 45 degrez en *A*, le demi-diamètre *CG* sera coupé en deux également en *E* par le rayon *OA* ; donc les parties *CE*, *EG* de la ligne droite  
*CG*



$CG$  qui représente le quart de cercle  $DAG$ , feront égales entr'elles comme les arcs  $DA$ ,  $AG$  le sont entr'eux ; ce que je démontre en cette sorte.

Posant le rayon du cercle  $FDGH$  qui est  $CD$ ,  $CA$  ou  $CH = 2r$  on aura  $BA$ ,  $CB$  ou  $HO$  qui est le sinus de 45 degrez  $= \sqrt{2rr}$  par la construction.

Maintenant pour avoir la grandeur de  $CE$  je dis  $OB$  est à  $BA$ , comme  $OC$  à  $CE$  & en termes analytiques  $\frac{2r}{P} + \frac{2\sqrt{2rr}}{2} \mid \frac{\sqrt{2rr}}{2r} \mid$

$2r + \sqrt{2rr} \mid \frac{2r \sqrt{2rr} + 2rr}{2r + 2\sqrt{2rr}} = CE$  mais ce dernier terme trouvé qui est la valeur de  $CE$  se réduit à  $r$ , comme il est facile à voir, & par conséquent  $CE$  est la moitié de  $CG$ , ce qu'il falloit prouver.

Mais pour les arcs des parties de  $DA$  & de  $AG$  il y aura quelque peu de différence; par exemple, si l'on cherche dans cette projection, quelle doit être la partie du Rayon  $CG$  qui répond à l'arc de 22 deg. 30. min. qui est le quart de 90 deg. en commençant en  $D$ , on trouvera 248 parties dont le rayon seroit 1000. enforte que la différence ne seroit que de deux millièmes des parties du rayon, car on devroit avoir 250 parties, ce qui n'est pas considerable dans un Astrolabe; & quand même il y auroit d'un côté & d'autre du point du milieu  $E$  des différences assez grandes, cela ne feroit rien à la justesse de l'Astrolabe qui est une projection reguliere.

Mais comme dans cet Astrolabe quelques cercles du Globe y sont representez par des portions d'Ellipses comme dans celle de *Royas*, il faut maintenant expliquer une maniere de décrire ces Ellipses bien plus facilement que les portions de cercles dans l'Astrolabe de *Gemma Frison*; car lorsque ces cercles sont proches du centre de l'Astrolabe, ils ont leurs centres si éloignez du centre de l'Astrolabe, qu'il est presque impossible d'avoir des compas qui puissent servir à les décrire, au lieu que pour décrire les Ellipses dont on a besoin dans nôtre Astrolabe, il ne faut pas une superficie plus grande que celle de l'Astrolabe même.

Soit

Soit donc proposé, par exemple, de décrire la portion d'Ellipse qui représente le Meridien éloigné de 45 degrez de celui qui est représenté sur l'Astrolabe par le diametre  $DH$ , les poles étant placez en  $D$  & en  $H$ , lequel par conséquent passera par le point  $E$  qu'on a déjà trouvé.


Si l'on prolonge le Rayon  $AC$  jusques à la circonference du cercle en  $I$ , & qu'on tire la ligne  $OI$  prolongée jusqu'au diametre  $FCG$  prolongé, s'il est nécessaire, jusqu'en  $K$ , il est évident que  $KE$  fera l'un des axes de l'Ellipse de la projection du cercle requis.

On a donc maintenant dans une Ellipse proposée un des axes  $KE$  & deux points  $DH$  par où elle doit passer, ce qui est plus qu'il ne faut puisqu'un seul de ces points suffit.

Ayant divisé  $KE$  en deux également en  $L$ , on menera par le point  $L$  la ligne  $ML$  perpendiculaire à  $KE$ , & du point  $D$  pour centre & pour rayon  $KL$  ou  $LE$  on décrira un arc de cercle en  $M$  qui coupera  $LM$  au point  $M$ . Ensuite on tirera la ligne  $MD$  prolongée jusqu'à  $KE$  en  $N$ ; je dis que  $DN$  est la grandeur de la moitié de l'autre axe de cette Ellipse; mais on n'a pas besoin de cet axe pour la description de l'Ellipse.

Si l'on prend maintenant une regle de la grandeur de  $MN$  & qu'au point  $D$  de cette regle il y ait une pointe, lorsque les extrémités  $MN$  de la ligne ou du côté  $MDN$  de cette regle couleront au long des branches de l'équaire  $MLE$ , la pointe  $D$  décrira la portion de l'Ellipse  $DE$  qu'on demande.

On fera avec la même regle l'operation de l'autre côté de  $KE$  pour l'autre portion d'Ellipse  $EH$ .



Il n'y aura pas plus de difficulté à décrire les parallèles à l'équateur que les Meridiens, puisque l'on aura toujours dans les Ellipses par lesquels ils sont représentez, l'un des axes & deux de leurs points sur la circonference du cercle extérieur de l'Astrolabe. Les axes de toutes ces Ellipses se trouvent de la même manière que les diamètres des cercles dans l'Astrolabe de *Gemma Frison* ; mais les points com-

comme *K* qui déterminent l'une des extrémités de ces axes ne s'écarteront que fort peu de l'extrémité *F* du diamètre *FG*.

On remarquera que les axes de ces Ellipses seront d'autant plus petits qu'elles seront plus proche du diamètre *DH*, & que par conséquent il ne faudra pas une si grande place pour les décrire, au contraire des cercles de l'Astrolabe de *Gemina Frison*.

C'est sur cette maniere de projection comme la plus conforme au Globe de toutes celles qu'on peut trouver, que j'ai construit deux Planispheres celestes dont les poles de l'Ecliptique sont au centre, & l'Ecliptique en fait le cercle extérieur. Ces Planispheres paroîtront dans peu de jours, chez *M. de Fer*, sur le Quai de l'Horloge.



## DES TÂCHES

*Observées dans le Soleil au mois de Novembre de l'année 1700. au mois de Mai, à la fin d'Octobre & au mois de Novembre de cette année 1701.*

Par *M. CASSINI*, le Fils.

**D**EPUIS le mois de Novembre de l'année 1700. que nous apperçûmes des tâches dans le Soleil étant à *Rhodes*, nous y en avons

P 4

en-

\* 7. Decembre 1701.

encore découvert d'autres au mois de Mars de cette année 1701. à *Montpellier*, & depuis notre retour à *Paris*, à la fin d'Octobre & au commencement du mois de Novembre. Nous les observâmes à *Rhodes* le 11. Novembre 1700. après midi lors que nous prenions des hauteurs du Soleil pour vérifier l'horloge, & nous en distinguâmes deux de figure longue comme elles sont ordinairement vers les bords du Soleil, la plus grande desquelles étoit vers le bord Occidental. Nous en déterminâmes la situation par le passage des bords du Soleil, & des taches par le fil horizontal & par le vertical de notre quart de cercle, & nous les trouvâmes dans la partie Occidentale du disque du Soleil beaucoup plus près du bord que du centre; de sorte qu'il y avoit neuf ou dix jours qu'elles auroient dû paroître sur le disque du Soleil si elles eussent été visibles, ou si nous avions eu le temps favorable de les observer.

Nous les observâmes encore le lendemain à midi par le passage des bords du Soleil & de ces taches par le vertical & par la hauteur Meridienne du bord supérieur du Soleil & des taches. Elles étoient toutes les deux sur le même cercle de déclinaison & passoient par le Meridien l'une après l'autre dans l'intervalle de 3 secondes.

Le 13. Novembre qui étoit le dernier jour qu'elles devoient paroître, le temps ne fut pas propre pour les observer.

Le 29. Mars de cette année 1701. étant à *Montpellier*, nous découvrîmes encore d'autres taches dans le Soleil. Elles étoient au nombre de trois ou quatre. La plus grande étoit ronde comme elles sont ordinairement vers le

cen-



centre du Soleil. Nous en déterminâmes la situation par le passage des bords du Soleil, & de la tache par les fils de la lunette du quart de cercle. Elle étoit alors dans la partie Orientale du disque du Soleil près de son centre. Le lendemain, le Soleil n'étant plus clair, l'on ne pût les appercevoir; & le 31. on reconnut qu'elles étoient entièrement disparues.

Le 31. Octobre de cette année 1701. j'appercûs ici une tache dans le Soleil en prenant sa hauteur Meridienne. Je pris la différence du passage entre les bords & la tache par le vertical & la hauteur Meridienne des bords du Soleil & de la tache pour déterminer sa situation dans le disque du Soleil, que je vérifiai ensuite par d'autres observations faites par la machine parallaëctique.

Elle étoit dans la partie Orientale du disque du Soleil, & paroissoit seule observée avec une Lunette de 40 pieds, entourée d'un Atmosphere & d'une grande quantité de facules qui occupoient une grande étendue.

Le 1. Novembre nous déterminâmes à midi sa situation dans le disque du Soleil, comme nous avons fait le jour précédent, & l'ayant observée par une Lunette de 40. pieds, nous y découvrîmes quatre autres taches beaucoup plus petites, situées entre la tache principale & le bord Oriental du Soleil.

Le 2. Novembre une des petites taches disparut, & une autre parut double.

Le 3. Novembre les petites taches disparurent, & l'on ne vit que la tache principale qui paroissoit composée de deux taches de figures irrégulières jointes l'une à l'autre.

Le 4. Novembre le Soleil étoit couvert au

temps de son passage par le Meridien.

Nous continuâmes de l'observer le 5. & le 6. entre lesquels la tache passa par le centre du Soleil. Je remarquerai ici en passant qu'elle étoit une seconde à passer par le vertical ; & que par conséquent , suivant la parallaxe que l'on attribue ordinairement au Soleil , son diamètre étoit un peu plus petit que n'est celui de la terre.

Le 7. & le 8. le Ciel étant couvert , l'on n'observa la tache que le 9. qu'elle parut séparée en deux de grandeur inégale , la plus petite desquelles étoit plus Meridionale.

Le 10. on les observa sans aucune variation dans leur figuration.

Le 11. à midi , le Ciel n'étant pas fort serain , on ne put les appercevoir. Elles étoient alors fort près du bord du Soleil qui est une situation où il est très-difficile de les pouvoir observer.

Pour pouvoir décrire la situation de ces taches dans le Globe du Soleil à l'égard de leur Equinoxial & du Colure du Soleil , j'ai décrit un cercle qui représente le disque apparent du Soleil , dans lequel j'ai tiré un diamètre qui représente la section du plan de l'Ecliptique dans le Globe du Soleil : J'ai placé à l'égard de l'Ecliptique que j'ai toujours considéré comme fixe , les cercles de déclinaisons qui conviennent aux temps des observations des trois taches différentes de même que leurs Equinoxiaux qui varient aussi en apparence à divers temps de l'année , quoique moins sensiblement : J'ai déterminé ensuite la situation de la tache que nous avons observée à *Rhodes* , par rapport au cercle de déclinaison du Soleil ; & j'ai trou-

trouvé que sa latitude prise de l'Equinoxial des taches étoit d'environ 9. degrez & demi vers le midi.

Sa longitude Occidentale du centre du Soleil le 12. Novembre 1701. à midi étoit de 66. degrez. Si donc l'on suppose que cette Tache décrivait par son mouvement journalier 13. degrez 6. minutes sur le Globe du Soleil comme on l'a observé en plusieurs autres, l'on trouve qu'il y avoit environ 5. jours & une heure que cette tache avoit passé par le centre du Soleil, auquel, par conséquent, elle étoit arrivée le 7. un peu avant midi. Par l'observation du 11. elle seroit arrivée le 7. deux heures avant midi ; mais on ne peut pas avoir une si grande exactitude dans ces sortes d'observations, étant difficile de déterminer le passage du centre par les observations d'une tache faites aux extrémités du disque du Soleil, à cause de son mouvement apparent qui est alors fort lent.

J'ai fait les mêmes operations pour déterminer la situation de la tache que nous avons observée le 29. Mars de cette année 1701. à *Montpelier*. J'ai trouvé sa latitude de 12. degrez vers le midi. Sa longitude Orientale le 29. à quatre heures du soir, étoit de 2. degrez 10. minutes, que la tache par son mouvement journalier parcourt en un peu moins de 4. heures. Cette tache a donc passé par le centre du Soleil le 29. Mars à huit heures au soir, & cette détermination est beaucoup plus exacte que celle de la précédente, à cause de son mouvement apparent qui étoit alors dans sa plus grande vitesse.

La Tache que nous aperçûmes à la fin du  
P 6 mois

mois d'Octobre de cette année que nous avons observé plusieurs fois pendant le temps qu'elle a parcouru le disque apparent du Soleil, m'a donné lieu d'examiner si son mouvement apparent, tiré des observations immédiates, répondoit à celui qui résulte de l'hypothèse de mon Pere sur le mouvement des taches. Suivant cette hypothèse le pole Boreal de l'Equinoxial des taches du Soleil se rapporte au 8<sup>e</sup>. degré des Poissons, & est éloigné de 7. degrez & demi du pole de l'Ecliptique du Soleil. Le Meridien du Soleil qui passe par le pole de son Ecliptique & par le centre apparent répondant à divers points de l'Ecliptique d'un jour à l'autre, le pole de l'Equinoxial du Soleil, quoi que fixe, paroît avoir un mouvement autour d'un cercle qui est éloigné du pole de l'Ecliptique  $7^d \frac{1}{2}$ .

Ce pole est dans l'horizon apparent du Soleil; lorsque le Soleil est éloigné de 3. signes du colure solstital des taches, ce qui arrive quand il est dans le 8<sup>e</sup>. du Sagittaire ou dans son opposé; & alors la ligne qui représente l'Equinoxial des taches passe par le centre & est une ligne droite; mais lorsque le Soleil est hors de ces points, alors la projection de l'Equinoxial représente une Ellipse qu'il est nécessaire de tracer dans la figure du Soleil pour compter delà les latitudes.

Ayant choisi une des observations plus exactes de cette tache, & l'ayant placé dans la figure par rapport au cercle de déclinaison & de l'Equinoxial; j'ai tiré par cette tache une Ellipse parallele à celle qui représente l'Equinoxial des taches au temps de cette observation, & j'ai trouvé que toutes les observations  
que

que nous en avons faites se trouvoient sur ce parallele avec moins de difference qu'il ne s'en trouve souvent entre les observations faites dans le même temps par diverses methodes.

En me servant de cette hypothese , j'ai aussi décrit le parallele qu'elle a dû parcourir dans la révolution précédente en cas qu'elle ait été visible , & celui qu'elle devoit décrire dans la révolution suivante, si elle ne s'étoit pas dissipée avant le temps de son retour comme il est arrivé.


La latitude de cette Tache étoit d'un peu plus de 12. degrez vers le Midi, comme étoit celle de la tache que nous avons observé le 29. Mars de cette année 1701. à *Montpellier*. Sa longitude Orientale , le 5. Novembre à midi , étoit de 2. degrez 10. minutes , que la tache parcourt par son mouvement propre en quatre heures. Cette tache a donc passé par le milieu de son cours dans le Soleil le 5. Novembre à quatre heures après midi ou à  $4^h \frac{1}{2}$  suivant une autre détermination tirée des observations du 5 & du 6.

Supposant la révolution de cette tache autour du Soleil semblable à celle que l'on a observée depuis long-temps de 27. jours 12. heures , elle est entrée dans le disque apparent du Soleil le 29. Octobre à sept heures au soir , & elle a dû en sortir le 12 à une heure après midi.

Il faut remarquer ici que l'arc apparent du Soleil que la tache décrit , n'est pas la moitié de sa circonference. Il en differe de la grandeur de l'angle visuel ; c'est-à-dire du diamètre apparent du Soleil, que l'on a observé a-

lors de  $32^{\circ} 30''$  ce qui donne à l'arc apparent  $179^{\circ} 27' 30''$ , & à l'arc occulte  $180^{\circ} 32' 30''$ . La tache employe donc plus de temps à parcourir l'arc occulte que l'apparent, & cette différence monte à deux heures, dont l'on peut tenir compte dans la détermination de l'entrée & de la sortie des taches.

Cette tache s'étant trouvée avoir la même latitude que celle que nous avons observé à *Montpellier*, j'ai examiné si dans l'intervalle de temps qui se trouve entre les deux observations, il y avoit un nombre entier de revolutions. La premiere ayant passé le 29. Mars à huit heures du soir le 5. Novembre 1701. par le centre de l'Equinoxial des taches du Soleil, & la dernière à quatre heures après midi; il y en a entre le temps de ces observations 220. jours 20. heures, qui étant partagez par huit, donneroient à chaque révolution 27. jours 14. heures & demi, supposant que ce soit la même tache. Cette révolution est un peu plus grande que celle que l'on suppose ordinairement dont il est difficile de donner des regles certaines, à cause des transformations qu'on remarque dans leur figure qui peuvent être jointes à quelques mouvemens particuliers.




ache qui a paru au mois de Novembre 1700

ache qui a paru au mois de Mars 1701

qui a paru au mois d'Octob. et de Novemb. 1701







~~~~~

# SOLUTION

*Du Problème proposé aux Geometres dans  
les Mémoires de Trévoux des mois de  
Septembre & Octobre 1701.*

Par M. CARRE.

\* **I**L semble qu'il est inutile de donner aujourd'hui la Solution de ce problème, après qu'il en a paru trois autres de differens Géometres dans le même Journal où il a été proposé: mais comme celle-ci peut passer pour la premiere, puisqu'on l'a fait voir huit jours après que les *Mémoires de Trévoux* ont été donnez au Public, comme on le peut verifiser par la datte des Regîtres de l'Academie, l'on a jugé à propos de la faire aussi imprimer.

## PROBLEME.

*Trouver la nature de la courbe, dont les ordonnées suivent la progression des nombres naturels 1, 2, 3, 4, 5, &c. & les segmens de l'axe qu'elles font suivent la progression des nombres triangulaires.*

Ces nombres appelez triangulaires, parce que l'arrangement de leurs unitez peut former un triangle équilateral, ont une propriété remarquable entre plusieurs autres; c'est que si

on

\* 17. Decembre 1701.

on multiplie un nombre triangulaire quelconque par 8, & que l'on ajoûte l'unité au produit, la somme sera un nombre quarré.

La formule pour trouver tous les nombres triangulaires est  $\frac{x x + a x}{2 a}$ , en sorte que prenant  $x$  successivement pour les nombres naturels, &  $a$  pour l'unité, l'on aura tous les nombres triangulaires. L'on aura donc par l'hypothese cette égalité;  $\frac{x x + a x}{2 a} = y$ , ou  $x x + a x = 2 a y$ . Or je dis contre le sentiment de l'Auteur, que cette équation est un lieu à la parabole ordinaire \* que je construis ainsi.

Soit décrite la demi-parabole  $CAM$ , & soit menée du sommet  $C$  la tangente indéfinie  $CP$ , & du point  $P$  la perpendiculaire  $PM$  rencontrant la courbe en  $M$ ; l'on prendra ensuite  $PB$  ou  $CD = \frac{1}{2} a$ , & menant  $BD$  parallèle à  $PC$ , l'on aura  $DA$  ou  $CE = \frac{1}{2} a$ . Je dis que la portion  $AM$  de la courbe est le lieu cherché depuis  $A$  jusqu'à l'infini. Car nommant  $EP$ ,  $x$ ; donc  $CP = \dots x + \frac{1}{2} a$ ;  $BM$ ,  $y$ ; donc  $PM = y + \frac{1}{2} a$ : mais par la propriété de la parabole  $PM (y + \frac{1}{2} a) = CP (x + \frac{1}{2} a) :: CP (x + \frac{1}{2} a) = 2 a y$ , qui est l'équation qu'il falloit construire.

Il est facile présentement de résoudre toutes les questions que l'Auteur dit être si importantes pour la pratique des arts. 1. Si la courbe est géométrique ou mécanique. 2. Comment l'on peut avoir géométriquement ou par des

des instrumens reglez tous les points de cette courbe. 3. Si cette courbe tournoit autour d'une de ses appliquées perpendiculaire à l'axe, quelle seroit la solidité ou la grandeur du corps qui se formeroit. 4. Où seroit le centre de pesanteur de la moitié de ce solide coupé en deux par un plan qui passeroit par cette appliquée. Comme l'on a résolu ces Problèmes dans un autre lieu, il seroit inutile de s'y arrêter ici.

Non seulement l'on peut trouver la nature de la courbe dont les segmens de l'axe suivent l'ordre des nombres triangulaires, mais aussi de toutes celles dont les segmens suivent la progression des autres nombres polygones, & toutes ces courbes ne seront point différentes de la parabole ordinaire; ce qui est une très-belle propriété que l'on n'avoit peut-être point encore remarquée. En voici quelques exemples.

I. Trouver la courbe dont les ordonnées suivant l'ordre des nombres naturels, les segmens de l'axe suivent la progression des nombres pentagones 5, 12, 22, 35, 51, 70, 92, &c.

Ces nombres appelez pentagones parce que l'arrangement de leurs unités peut former un pentagone, ont cette propriété, si on multiplie un nombre pentagone quelconque par 24, & que l'on ajoûte l'unité au produit, la somme sera un nombre quarré.

La formule pour trouver tous ces nombres est  $\frac{3xx - ax}{24}$ ; mais supposant  $3x - a = z$ , donc  $x = \frac{z+a}{3}$ , & mettant cette valeur à la

pla.

place de  $x$ , elle se changera en celle-ci  $\frac{zx + az}{6a}$ . L'on aura donc par l'hypothese  $zx + az = 6ay$ , qui est un lieu à la parabole dont le parametre  $= 6a$ ; que l'on construit ainsi.

Les mêmes choses étant posées que dans le Problème precedent; soit prise  $PB = \frac{1}{24}a$ ; donc  $DA = \frac{1}{2}a$ ; ainsi nommant  $BM, y$ , donc  $PM = y + \frac{1}{24}a$ ;  $EP, z$ ; donc  $CP = z + \frac{1}{2}a$ ; l'on aura à cause de la parabole  $y + \frac{1}{24}a. z + \frac{1}{2}a :: z + \frac{1}{2}a. 6a$ ; d'où l'on tire  $zx + az = 6ay$ , qui est l'équation qu'il falloit construire.

Si l'on prend  $x = z + \frac{1}{2}a$ , l'égalité  $3xx - ax = 2ay$  se changera en celle-ci  $zz = \frac{2ay}{3} + \frac{1}{36}aa$ , qui est à la parabole dont le parametre  $= \frac{2}{3}a$ ; ce qui fait connoître que pour construire immédiatement la premiere égalité, il faut retrancher de  $CP$  que l'on prend ici pour  $x, \frac{1}{2}a$ , & l'on aura  $PB = \frac{1}{24}a$ , ainsi faisant  $\frac{2}{3}a. x - \frac{1}{2}a :: x - \frac{1}{2}a. y + \frac{1}{24}a$ , il viendra  $xx - \frac{ax}{3} = \frac{2}{3}ay$ .

II. Trouver la courbe dont les segmens de l'axe suivent la progression des nombres exagones 6, 15, 28, 45, 66, 90, 120, &c.

Ces nombres ont cette propriété. Si l'on multiplie un nombre exagone par 8, & que l'on ajoute l'unité au produit, la somme sera un nombre quarré.

La formule pour les trouver est  $\frac{2xx - ax}{a}$ ; ou supposant  $2x - a = z$ , elle se changera en celle-ci  $\frac{zz + az}{2a} = y$ ; qui est encore à la parabole

rabole dont le parametre  $= 2a$ . Si l'on veut construire immédiatement la premiere égalité l'on prendra  $PB = \frac{1}{4}a$ , donc  $DA = \frac{1}{4}a$ , & le parametre  $= \frac{1}{2}a$ ; ainsi faisant  $\frac{1}{2}a$ .  $x - \frac{1}{4}a :: x - \frac{1}{4}a . y + \frac{1}{4}a$ ; l'on aura l'équation qu'il falloit construire.

III. Trouver la courbe dont les segmens de l'axe se suivent selon l'ordre des nombres eptagones 7, 18, 34, 55, 81, 112, 148, &c.

Une des proprietéz de ces nombres est que si on les multiplie par 40, & que l'on ajoute 9 au produit, la somme sera un nombre quarré.

Leur formule est  $\frac{5xx - 3ax}{2a}$  qui se changera en celle-ci  $\frac{xx + 3ax}{10a}$  en supposant  $5x - 3a = z$ . l'on aura donc  $zz + 3ax = 10ay$  qui est encore un lieu à la parabole dont le parametre  $= 10a$ .

Pour construire cette équation l'on prendra  $PB = \frac{9}{40}a$ ; donc  $DA = \frac{1}{2}a$ : ainsi l'on aura  $y + \frac{9}{40}a . z + \frac{1}{2}a :: z + \frac{1}{2}a . 10a$ ; donc &c. Si l'on veut construire immédiatement l'égalité  $5xx - 3ax = 2ay$ : l'on retranchera de  $CP$  que l'on prend pour  $x$ ,  $\frac{1}{10}a$ , & l'on aura  $PB = \frac{9}{40}a$ ; & le parametre  $= \frac{1}{2}a$ ; ainsi faisant  $\frac{1}{2}a$ .  $x - \frac{1}{10}a :: x - \frac{1}{10}a . y + \frac{9}{40}a$ ; il viendra l'égalité cherchée.

L'on trouvera avec la même facilité les Courbes dont les segmens de l'axe suivent la progression des autres nombres polygones en se servant des formules que voici jusqu'au dodécagone, & qu'il sera facile de continuer.

## F O R M U L E S.

$$\text{Octogone. } \frac{3xx - 2ax}{a}$$

$$\text{Enneagone. } \frac{7xx - 5ax}{2a}$$

$$\text{Decagone. } \frac{4xx - 3ax}{a}$$

$$\text{Endecagone. } \frac{9xx - 7ax}{2a}$$

$$\text{Dodecagone. } \frac{5xx - 4ax}{a}$$

~~~~~

O B S E R V A T I O N S  
S U R L E S H E R N I E S.









Par M. M E R Y.


## P R E M I E R E O B S E R V A T I O N.

\* L E 16. Août 1701. un jeune Garçon âgé de dix-huit à 20. ans, vint à l'Hôtel-Dieu affligé d'une descente qu'il avoit dans le Scrotum du côté droit. Je l'examinai sur les quatre heures du soir, & j'appris de lui-même qu'il y avoit quatre à cinq jours qu'il vomissoit les matieres fecales.

La tumeur que sa descente formoit, n'étoit pas fort grosse ni même fort dure. On avoit fait

\* 20. Decembre 1701.







fait en ville plusieurs tentatives, qui toutes furent inutiles, pour réduire dans le ventre les parties qui étoient renfermées dans les bourses. J'essaiai comme les autres à les y faire rentrer. Je crus d'abord en pouvoir venir à bout; parce qu'à la première compression que je fis sur la tumeur, j'entendis un bruit & sentis un mouvement de matière qui me firent juger qu'elle remontoit par l'intestin dans le ventre: en effet quelques momens après la tumeur disparut presque entièrement; il resta seulement dans l'aîne une espèce de cordon qui en se prolongeant jusque dans le fond du Scrotum diminuoit insensiblement de grosseur. Après avoir apporté tous mes soins pour soulager le malade, il me dit qu'il se trouvoit mieux; je lui fis donner un lavement & lui fis appliquer un cataplasme émollient & résolutif.

Le lendemain 17<sup>e</sup>. on me dit que le malade étoit mort à une heure après minuit, qu'il avoit rejeté par la bouche le lavement qu'on lui avoit donné, & que quelques momens après la tumeur avoit reparu dans les bourses aussi grosse qu'auparavant la réduction des parties. Le même jour sur les sept heures du matin je fis l'ouverture du cadavre. Les parties du ventre étant à découvert, je remarquai premièrement, que les intestins grêles étoient enflammés, & beaucoup plus dilaté au dessus qu'au dessous de l'étranglement de l'intestin. Secondement, je trouvai proche les anneaux des muscles un *cæcum* long de deux à trois pouces; & d'un pouce ou environ de diamètre, il ressembloit par sa figure extérieure au pis d'une vache que l'on trait: sa cavité communiquoit avec celle de l'iléon, ses membra-

nes

nes étoient beaucoup plus épaisses que celles de cet intestin, ses vaisseaux plus gonflés, & sa couleur étoit d'un rouge fort brun ; ces trois derniers caractères sont des preuves évidentes que cet intestin aveugle avoit souffert un étranglement dans les anneaux des muscles, & vrai-semblablement il étoit rentré dans le ventre dans le temps que je comprimai la tumeur qui disparut dans ce même moment.

Troisièmement, je trouvai dans la bourse un repli de l'ileon, qui, étant déployé, avoit bien quatre à cinq pouces de long ; il étoit vuide de matieres, ses membranes étoient beaucoup plus épaisses qu'ailleurs, & sa couleur étoit d'un rouge très-foncé, signes manifestes de la mortification.

Quatrièmement, j'observai que l'épiploon accompagnoit dans la bourse ce repli de l'ileon ; que d'une part cette membrane lui étoit adhérente, & de l'autre au cul-de-sac du peritoine qui renfermoit ces deux parties, & que le peritoine étoit uni au dartos qui fait la seconde membrane commune des bourses. L'adhérence de ces parties les unes aux autres a été le seul obstacle qui se soit opposé à leur réduction ; ce qui paroît d'autant plus vrai-semblable que le cul-de-sac de l'ileon dont je viens de parler & qui étoit gangrené, n'a pû rentrer dans le ventre que parce qu'il ne s'étoit point uni de même à l'épiploon ni au peritoine.

Sur ces faits observez il y a deux réflexions à faire. La premiere est de savoir si le cul-de-sac qui avoit son ouverture dans la cavité de l'ileon est un vice de conformation, ou un effet des fréquentes rechutes de cet intestin dans  
les

les anneaux des muscles du ventre. La seconde est d'expliquer comment le Lavement qu'on donna au Malade huit heures avant sa mort, a pû sortir par la bouche.

Quant à la premiere réflexion, on peut bien supposer que le cul-de-sac de l'ileon est un vice de la premiere formation des parties : mais comme la capacité de cet intestin au-dessus & au-dessous du cul-de-sac qui communiqueoit avec lui étoit beaucoup plus étroite qu'ailleurs, on peut bien s'imaginer aussi que l'ileon s'étant présenté un grand nombre de fois à l'embouchure des anneaux des muscles du ventre, il n'y a eu qu'une portion de la circonference qui s'y soit engagée ce qui l'a retrécie, & il y a lieu de croire que les matieres qui y ont coulé, ayant fait effort sur cette partie, ont pû l'allonger peu à peu de deux à trois pouces, ce qui paroît fort conforme à la verité, puisqu'on ne peut nier que le cul-de-sac du peritoine qui se rencontre dans toutes les descentes qui arrivent sans la rupture de cette membrane, ne soit formé par la pesanteur de l'épiploon & des intestins, qui pressés par les muscles du ventre, la poussent insensiblement par les anneaux de ces muscles dans le Scrotum, d'où il est aisé de comprendre que le cul-de-sac de l'ileon a pû aussi être formé de la maniere que je viens de l'expliquer.

Quant à la seconde réflexion, il s'agit de rendre raison comment le Malade n'ayant vomé pendant cinq jours les matieres fecales, que parce que l'ileon étant trop reserré dans les anneaux des muscles du ventre, elles n'ont pu passer dans le colon, il a cependant

re-

jetté par la bouche le lavement qui lui fut donné huit heures avant que de mourir.

Pour rendre raison d'un fait si surprenant, il faut remarquer deux choses; la première que tous les gros intestins étoient dans leur état naturel, & qu'au contraire tous les greles étoient enflammés à l'exception de l'extrémité de l'ileon; la seconde, que lorsque le Malade reçut le lavement, les matieres qui remplissoient la partie de cet intestin adherente au cul-de-sac du peritoine, avoient été repoussées du Scrotum dans le ventre, & que le cul-de-sac que formoit l'ileon y étoit aussi rentré, de sorte que la partie de cet intestin adherente au peritoine se trouva dans ce moment beaucoup plus au large qu'auparavant dans les anneaux des muscles.

Ces deux choses présentes à l'esprit, il est aisé de comprendre que les intestins greles étant enflammés, & partant hors d'état de pouvoir résister à l'effort des gros boyaux, qui étoient dans une parfaite disposition, ceux-ci ont pu en commençant à se contracter du côté de l'anus, chasser avec d'autant plus de facilité dans l'estomach le lavement qu'avoit pris le Malade que la partie de l'ileon adherente dans le Scrotum étant vuide alors, & très-peu resserrée, la résistance des anneaux de muscles du ventre se trouva moindre que celle du sphincter de l'anus.

## II. OBSERVATION.

Le 20. Août 1701. il arriva à l'Hôtel-Dieu un Malade âgé d'environ soixante & dix ans. Il avoit dans l'aîne droite une tumeur de la grosseur d'un œuf.

grosſeur d'un œuf d'Oye , la peau qui la couvroit étoit livide & noire dans ſon milieu & d'un rouge pâle dans ſa circonférence , marques évidentes d'une gangrenne paſſant à une entière mortification. Cette tumeur étoit ſi molaffe qu'on reſſentoit au dedans une fluctuation de matiere pareille à celle qu'on remarque dans un abcès prêt à crever la peau.

Le Chirurgien qui le premier viſita ce Malade , prit ſa tumeur pour un bubon venerien. Comme il n'eſt point permis de traiter aucune eſpece de maladie venerienne à l'Hôtel-Dieu ; & que cependant le Malade paroifſoit mourant , on m'envoya chercher pour ſavoir ce qu'on en pourroit faire. J'examinai la tumeur , & trouvai une fluctuation dans toutes ſes parties , ce qui me fit croire d'abord que c'étoit un abcès ordinaire , & non pas un poulain ; celui-ci ne venant qu'à peine à maturité , & conſervant toujours beaucoup de dureté particulièrement dans ſa circonférence , malgré ſa ſupuration : mais ayant enſuite aſſis du Malade que je fis coucher , premièrement , qu'il étoit ſujet à une deſcente d'intestin du côté même qu'étoit la tumeur ; ſecondement , qu'il avoit reçu dans l'aîne un coup fort violent ; troiſièmement que depuis quatre jours il avoit vomi les matieres fecales , je changeai de ſentiment , & il me vint en penſée que l'intestin tout plein de matiere , s'étoit , dans le temps que le Malade reçut le coup , crevé comme une veſſie de Carpe trop preſſée , que la matiere qui en étoit ſortie étant liquide , cauſoit l'inondation que je reſſentis dans la tumeur , & que la gangrenne qui paroifſoit à la ſuperficie , étoit plutôt l'effet de la contuſion des parties qui avoient

été frappées , que de la corruption de la matiere qui y étoit renfermée.

La maladie étant un peu mieux reconnue , M. *Petit* qui, comme moi , fut appelé pour voir le Malade , fut d'avis d'en venir à l'operation pour le soulager : mon sentiment étoit au contraire qu'on le laissât mourir pour lui épargner la douleur de ce secours, que je jugeois inutile , la gangrenne , l'intestin crevé , l'enflure du ventre , une foible respiration, la langueur du poux , & les extrémités froides ne laissant aucune esperance de guerison. Son sentiment prévalut cependant & je fis l'operation. Je coupai seulement les tegumens avec le trenchant d'un Bistouri ; ils ne furent pas plutôt ouverts qu'il s'écoula de la tumeur une matiere fluide , noirâtre & fœtide qui laissa après sa sortie un grand vuide dans lequel je vis le testicule sain & tout à découvert. Ce fait me parut nouveau , parce que j'avois observé jusques-là que malgré la chute des intestins dans le Scrotum , les testicules se trouvent enveloppez de leurs membranes propres. On pourra peut-être m'objecter que ses membranes étant naturellement unies aux membranes communes des bourses, j'ai pû couper en même temps les unes & les autres : mais voici , ce me semble , une preuve du contraire. Dans les descentes ordinaires l'intestin n'entre point dans les membranes propres du testicule , il se glisse le plus souvent entre-elles & celles du Scrotum , l'intestin s'est trouvé renfermé dans la même cavité où étoit le testicule ; je n'ai donc pû couper ses membranes propres, en coupant les membranes communes des bourses ; ma surprise fut bien plus grande quand je vis un  
in-

intestin aveugle affaîlé dans cette tumeur ouverte , mais sain au lieu d'être gangrené comme je me l'étois imaginé ; il étoit percé d'un trou , mais si petit qu'à peine auroit-il pû admettre une épingle ; il étoit séparé depuis l'aîne jusque dans le fond de la tumeur, des membranes du Scrotum , mais il étoit si étroitement uni aux anneaux des muscles du ventre que desespérant de vaincre son adhérence sans le déchirer , je proposai à M. *Petit* de le laisser en sa place & de nous contenter de dilater les anneaux, ce qu'il n'approuva pas ; je séparai donc ce prétendu intestin de ces parties des muscles & le repoussai dans le ventre, il étoit encore adhérent au péritoine ; mais ne jugeant pas que cette union pût être un obstacle à l'écoulement des matieres vers l'anus , je me contentai de panser le Malade avec une tente faite de charpie fine, des bourdonnets, des plumaceaux & des compresses trempées dans l'eau de vie pour résister à la corruption des membranes des bourses, & j'appliquai sur le ventre un resrenant fait avec l'huile rosat , le jaune & le blanc d'œuf.

Le 21. je pansai le Malade de la même façon ; le 22 & le 23 , je me servis d'un digestif fait avec la theriebentine , le jaune d'œuf , la mire, l'aloye, & l'esprit de vin, & j'appliquai sur la playe , au lieu d'emplâtre , une compresse trempée dans l'eau de vie , afin de ranimer la chaleur naturelle qui parut toujours s'éteindre de plus en plus, quoique la gangrene n'eût fait aucun progrès depuis le jour de l'opération. Pendant ces quatre jours le Malade alla à la selle, & le vomissement cessa, mais les autres accidens subsisterent , il lui survint

364 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
même le troisième jour un delire avec un ho-  
quet , qui continuerent jusqu'à la fin du qua-  
trième que le Malade mourut.

Après sa mort je fis l'ouverture de son Ca-  
davre. Le ventre étant ouvert , j'aperçûs d'a-  
bord les marques d'une grande inflammation  
aux intestins greles , celle d'une mortification  
entiere dans la partie de l'ileon qui s'étoit enga-  
gée dans les anneaux des muscles , & ensuite  
une rupture des deux tiers de la circonference  
de cet intestin pourri , qui ne se trouva nulle-  
ment adherente à aucune partie.

Ces faits si differens de ceux qui me paru-  
rent dans le temps de l'operation m'engagerent  
à examiner une seconde fois la partie que M.  
*Petit* & moi avions , comme tous les assistans ,  
prise pour l'intestin , & d'où même sortoit en-  
core une matiere semblable à celle qui s'écou-  
la de la tumeur que j'avois ouverte quatre  
jours auparavant. Après l'avoir bien conside-  
rée tant du côté de l'aîne , où j'avois fait d'a-  
bord l'incision que du côté du ventre du Ca-  
davre que je venois d'ouvrir , je reconnus en-  
fin que je m'étois trompé , & que la partie que  
j'avois prise pour l'intestin aveugle n'étoit que  
le peritoine prolongé en forme de cul-de-sac  
dans le Scrotum , ce qui arrive dans toutes les  
Hernies complettes lorsqu'elles se font sans la  
rupture de cette membrane.

Après un raport si ingenu d'un fait si com-  
mun , on s'étonnera peut-être de ma méprise :  
mais si l'on fait attention que dans les descen-  
tes ordinaires , le peritoine prolongé se trou-  
ve toujours uni aux membranes du Scrotum  
d'un côté , & de l'autre à celles du testicule ,  
qu'au contraire dans celle-ci il étoit entiere-  
ment



ment séparé des unes & des autres, & que même la matière fecale sortoit du cul-de-sac de cette membrane percée, ce qu'on ne voit point arriver dans les autres Hernies, on doit avouer que ma méprise est bien digne d'excuse, & que les plus expérimentez Chirurgiens auroient peut-être pû, comme moi, y être trompez. Loin donc de me critiquer, on doit s'appliquer à rechercher, premièrement, des signes certains par lesquels on puisse discerner, en pareille rencontre, le cul-de-sac du peritoine d'avec l'intestin; secondement, à découvrir quelle a été la cause qui a pû separer le cul-de-sac du peritoine d'avec les membranes des bourses, & mettre le testicule à découvert dans la tumeur qui fut ouverte.

Ce que j'observai d'abord après avoir ouvert le Scrotum me fournit deux moiens ou signes pour distinguer le cul-de-sac du peritoine d'avec l'intestin. Le premier est l'adhérence naturelle du peritoine aux anneaux des muscles du ventre avec lesquels l'intestin ne peut s'unir que par une matière étrangere qui le colle pour ainsi dire à ces parties, delà vient qu'il est facile de rompre cette union sans quasi-blesser l'intestin; au lieu qu'il est impossible de separer le peritoine d'avec les anneaux des muscles sans déchirer cette membrane, parce qu'elle leur est naturellement unie. Le second moien plus sûr encore que le premier est la couleur differente de ces deux parties. Dans tout étranglement d'intestin sa couleur devient noire, celle du peritoine reste ordinairement la même; parce que les vaisseaux de celui-ci, étant en petit nombre & fort déliés, ils ne peuvent être assez pressés pour s'opposer à la cir-

culation du sang ; ceux de l'intestin étant au contraire fort gros & en grand nombre, ils sont beaucoup plus sujets à être comprimez ; delà vient que le sang y est facilement arrêté , ce qui donne toujours à l'intestin une couleur noire , quoique souvent il ne soit point corrompu. Pour découvrir la cause de la séparation du cul-de-sac du peritoine d'avec les membranes des bourses , il faut se ressouvenir que le Malade reçut un coup fort violent sur sa tumeur , dans le temps que l'intestin revêtu du cul-de-sac de cette membrane étoit plein de matiere , ce qui les fit crever l'un & l'autre : cela supposé , il est aisé d'expliquer la séparation du cul-de-sac du peritoine d'avec les membranes des bourses. L'adherence de ces parties étant peu forte , & la matiere de l'intestin sortant continuellement par le petit trou du cul-de-sac du peritoine , elle n'a pû se placer ailleurs qu'entre cette membrane & le Scrotum ; elle a donc séparé peu à peu ces parties l'une d'avec l'autre, parce que l'effort qu'elle a fait entre-elles , s'est trouvé plus puissant que leur résistance. C'est ce qu'on voit tous les jours arriver dans la formation des abcès , dont la matiere divise souvent tous les muscles d'une partie qui , avant la fluxion de l'humeur , étoient joints ensemble par leurs membranes. Il n'est pas si facile de rendre raison de la découverte du testicule : Ce que j'ai pû m'imaginer de plus vrai-semblable sur ce fait , est que les membranes propres à cette partie étant naturellement unies au Scrotum , celui-ci n'a pas pû tomber en gangrene sans leur mortification , ce qui a donné occasion à la matiere qui est sortie de l'intestin de rompre facilement les membranes

du

du testicule ; & si cette partie & le cul-de-sac du peritoine ne se sont pas corrompus , ce ne peut être que parce que l'impression du coup que reçut le Malade ne fut pas assez forte pour faire sur ces parties cachées la même contusion qu'elle fit sur les tegumens extérieurs ; & que d'ailleurs la circulation du sang ne fut point interceptée dans leurs vaisseaux comme elle le fut dans ceux de l'intestin resserré dans les anneaux des muscles ; ce qui causa à celui-ci une entière mortification , à laquelle il n'y a pas d'apparence que le coup ait eu part , puisque le cul-de-sac du peritoine qui renfermoit l'intestin s'est trouvé parfaitement sain après la mort du Malade.

### III. OBSERVATION.

Le 28. du même mois d'Août on me fit voir sur les quatre heures du soir un autre Malade qui avoit dans le côté droit du Scrotum une tumeur de la grosseur d'une boule de maille. Cette tumeur étoit suspendue par un cordon long de deux à trois pouces , & d'un pouce ou environ de diamètre ; de sorte qu'à considérer seulement la figure de cette tumeur , on auroit pu soupçonner qu'elle n'auroit été qu'un gonflement du testicule , & des vaisseaux spermaticques occasioné par la retenue de la matiere d'une gonorrhée violente arrêtée à contre-temps. Mais comme le Malade m'assura du contraire , & qu'il étoit sujet à une descente d'intestin qui lui causoit , depuis dix ou douze jours , un vomissement de matiere glaireuse , je ne doutai plus de l'étranglement de l'intestin dans les anneaux des muscles du ventre.

Quoi qu'il allât à la selle sur le champ je lui fis appliquer des fomentations émollientes sur la partie malade ; l'application en fut répétée plusieurs fois jusqu'au lendemain matin que je revis le Malade. Je le trouvai plus foible que le jour précédent , mais moins tourmenté de douleur , ce qui m'obligea à continuer les mêmes fomentations , résolu de faire l'opération l'après midi , au cas que je ne pus réduire les parties dans le ventre. A une heure j'allai revoir le Malade que je trouvai presque sans poux , le nez retreci , le brillant des yeux terni & la voix presque éteinte. Ces signes me firent juger que la mort étoit proche & qu'il n'étoit plus temps d'en faire l'opération , ni même de tenter la seule réduction des parties : En effet le Malade mourut sur les deux heures après midi. A cinq heures du soir je fis l'ouverture de son Corps. Les parties du ventre étant à découvert , je vis l'épiploon étendu en forme de pyramide sur les intestins enflammés. Sa base étoit attachée à l'estomach & à la partie supérieure du colon ; sa pointe passoit par les anneaux des muscles dans le Scrotum. Sans pousser plus avant l'examen de ces parties , j'ouvris ensuite le Scrotum. Ses membranes étant coupées , j'aperçûs aussi-tôt l'épiploon qui formoit la plus grande partie de la tumeur : il n'étoit point adhérent à ces membranes ni aux anneaux des muscles , mais il embrassoit exactement les vaisseaux spermatiques , & étoit si étroitement uni au testicule qu'il enveloppoit , que je ne pus les séparer sans le rompre. L'épiploon étant détaché des vaisseaux spermatiques & du testicule , j'aperçus l'intestin qui à peine passoit au delà des anneaux des muscles ,

cles , dans lesquels il étoit si resserré que le sang retenu dans les veines trop pressées , lui avoit donné une teinture fort noire.

L'union de l'épiploon aux vaisseaux seminaux & au testicule est un fait qu'il est difficile d'expliquer : Car comme dans les Hernies qui arrivent par la pesanteur des intestins , par celle de l'épiploon , & par le relâchement du mesentere & du peritoine ; celui-ci forme ordinairement un cul-de-sac dans lequel sont contenues les parties qui passent au delà des anneaux des muscles du ventre : il n'est pas aisé de comprendre comment l'épiploon a pu s'unir aux vaisseaux spermatiques , & au testicule renfermé dans ses membranes propres ; car quand on supposeroit que le peritoine se feroit rompu par quelque effort , & que par l'ouverture de cette membrane , l'épiploon auroit pu descendre dans les bourses , on ne sauroit expliquer par la rupture du peritoine , celle des membranes propres du testicule , sans laquelle il paroît cependant qu'il est quasi impossible de concevoir l'union de l'épiploon au testicule. Or comme ses membranes se sont trouvées saines & entieres , on ne peut , ce me semble , rendre raison de cette union si extraordinaire , qu'en supposant dans le sujet , dont il s'agit ici , une gaine naturelle au peritoine semblable à celle qui se rencontre dans les mâles de plusieurs especes d'animaux que j'ai disséqués. Cette gaine naturellement creusée communique dans la capacité du ventre , elle s'étend depuis les îles jusque dans le fond du Scrotum & renferme les vaisseaux spermatiques avec le testicule qui sont attachez à sa surface interieure par une membrane très-déliée large d'environ

370 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
ron deux lignes & de la longueur de la gaine  
même.

Cela supposé dans le sujet en question, il est  
aisé de s'imaginer que l'épiploon descendu dans  
cette gaine a pû s'unir facilement aux vaisseaux  
seminaires & au testicule par le long séjour  
qu'il a fait dans sa cavité ; ce qui paroît d'au-  
tant plus vrai-semblable que l'épiploon s'est  
trouvé parfaitement sain , & que la tumeur  
qu'il formoit autour du testicule n'a jamais pû  
rentrer dans le ventre.

#### IV. OBSERVATION.

Le 17. d'Octobre 1701. une Fille âgée de 27.  
à 28. ans fut reçûe à l'Hôtel-Dieu pour une  
Hernie formant une tumeur qui s'étendoit de-  
puis l'aîne gauche jusqu'au milieu de la cuisse.  
Son diamètre étoit d'environ sept à huit pou-  
ces , elle étoit dure dans sa partie supérieure ,  
molasse dans l'inférieure , la Malade vomis-  
soit les alimens qu'elle prenoit , & alloit ce-  
pendant assez librement à la selle.

On tenta en vain la réduction des parties que  
renfermoit cette tumeur , ce qui fit penser à en  
venir à l'Operation , mais je n'en fus pas d'a-  
vis pour deux raisons ; la première parce que  
la descente étant fort ancienne , j'avois lieu de  
croire que les parties qui étoient sorties hors  
de la capacité du ventre , devoient être adhe-  
rentes dans la tumeur ; la seconde parce que  
la Malade allant , comme je viens dire , assez  
librement à la selle , je ne jugeai pas l'opera-  
tion d'une nécessité absolue. Ne voulant pas  
néanmoins m'en arrêter à mon seul sentiment,  
j'appellai le 18. Messieurs *Debourgès* , *Morin* ,  
*Hé-*

*Hémérais & Afforti*, Medecins de l'Hôtel-Dieu pour voir la Malade, & prendre leurs avis sur ce qu'il y avoit à lui faire. Leurs sentimens furent partagez, les uns jugeant que l'operation étoit nécessaire pour mettre fin au vomissement, les autres ne trouvant pas à propos de la faire; parce qu'il leur paroissoit comme impossible de vaincre l'adherence de l'intestin sans faire perir la Malade. Le sentiment de ces derniers fut suivi; mais sur ce qu'un d'entr'eux crut qu'il y avoit de l'eau dans la tumeur outre les parties, je l'examinai avec plus d'attention que je n'avois fait auparavant, & sur le rapport que je leur fis que je sentois effectivement dans le bas de la tumeur une liqueur flotante, ils furent d'avis de l'ouvrir. Par la ponction que j'y fis avec le Troiscar j'en tirai environ une pinte de sérosité teinte de sang & fort fœtide, ce qui me fit juger que les parties qu'elle renfermoit étoient gangrenées.

Deux jours après je réitérai la ponction, parce que la tumeur s'étoit remplie; la liqueur qui en sortit cette seconde fois, étoit beaucoup plus puante que la première, plus trouble, & avoit moins de teinture de sang; d'où je tirai ce prognostique que la gangrenne de l'intestin étoit dégénérée en une entière mortification. Nonobstant le déplorable état où se trouvoit alors la Malade, son poux se soustenoit, son ventre étoit sans douleur & elle rendoit les matieres fécales par l'anus; mais elle vomissoit la plus grande partie des alimens qu'elle prenoit.

La sanie cadavreuse que je tirai la seconde fois que je piquai la tumeur de cette Fille a continué de couler pendant trois jours, par les

deux ouvertures que j'y fis, sans aucun mélange d'excremens. Ces jours écoulés la gangrene commença à attaquer les tegumens de la tumeur qui tomberent peu à peu dans une entière mortification, & alors la matiere qui sortit par les deux ouvertures que j'y avois faites parut mêlée d'excremens, signes évidents que l'intestin pourri s'étoit enfin crevé. La gangrene ne fit pas dans les tegumens un fort grand progrès, elle se borna, & ne décrivit qu'un cercle de trois à quatre pouces de diamètre que je coupai sitôt que la nature parut d'elle-même en faire la separation.

Cette partie corrompue des tegumens étant enlevée, j'aperçûs plusieurs circonvolutions d'intestins greles tout pourris; ils n'étoient point adherens dans les enveloppes que leur fournissoient les tegumens; mais deux circonvolutions de l'intestin colon qui y étoient aussi renfermez, y étoient naturellement unies par un côté de leur surface extérieure. Tout ce qui étoit passé de cet intestin dans la tumeur n'étoit nullement alteré, ce qui parut d'abord par sa couleur rouge & vermeille qui s'est toujours conservée la même dans toute la suite de la maladie.

Après avoir séparé ce qui étoit corrompu des tegumens, je coupai le même jour les circonvolutions pourries des intestins greles, j'en tirai encore le lendemain avec mes doigts la longueur d'environ un pied, de sorte que la Malade a bien perdu du moins quatre à cinq pieds de ses intestins.

Quoique du depuis il n'y ait plus eu de communication des intestins greles avec les gros, il est cependant sorti de temps en temps quelques



ques excremens par l'anús, qui vrai-semblablement ont été retenus dans le colon depuis l'opération, où ils ont séjourné pendant sept semaines; puisque le 11. Decembre la Malade en a encore rendu. Il se peut faire aussi que ces excremens viennent de la décharge des glandes, & qu'ils s'amassent dans le colon de cette Fille, comme ils font dans celui du fœtus renfermé dans le sein de sa mere.

Quoi que les alimens mal digerez, & les excremens mal conditionnez se soient, après l'opération, écoutez librement par l'ouverture de l'intestin grele qui s'est uni dans l'aîne, cependant le vomissement de la Malade a encore continué depuis pendant plusieurs jours, mais sans sentir nulle douleur dans le ventre.

Son estomach ne se rétablissant que peu à peu, il n'a retenu d'abord que les alimens que la Malade souhaitoit avec envie de manger, & rejettoit ceux pour lesquels elle avoit de l'aversion quoique meilleurs que les autres, aussi l'a-t-on vûe vomir du poulet qu'elle avoit mangé, & digerer du harang.

Son estomach devenu plus fort dans la suite, elle ne vomit plus rien aujourd'hui de tout ce qu'elle prend; il lui arrive seulement, quand elle mange des fruits crus, des poiréaux ou des navets cuits, de les rendre par l'intestin ouvert, à peu près tels qu'elle les a avalés.

Ce qu'il y a de fort remarquable dans cette Fille, qui a perdu quatre à cinq pieds d'intestins greles, c'est que lorsqu'elle ne charge point trop son estomach, & qu'elle ne prend que des alimens d'une facile digestion, elle

rend des excréments d'une consistance aussi solide qu'ils avoient coûtume d'avoir, quand ils passoient par l'intestin colon, & sortoient par l'anus; autrement il lui arrive un flux de ventre.

Enfin elle reprend de jour en jour son embonpoint, ce qui marque que ce n'est que les derniers quatre ou cinq pieds de l'ilicon qu'elle a perdus, de sorte que la plus grande partie des intestins greles étant restez dans le ventre, tout ce qu'elle prend de liquide trouve le temps & encore assez de conduits pour passer avec le chyle dans son reservoir.

Aujourd'hui 17. Decembre il reste encore à cette Fille au dessous de l'aîne une tumeur plus grosse qu'un œuf de poule d'Inde. Cette tumeur a une ouverture de trois à quatre lignes de large & plus de demi pouce de long. Comme la cicatrice qui la borde est fort enfoncée, il n'y a pas d'apparence que cette ouverture diminue davantage; & comme ce sont les gros intestins qui forment la plus grande partie du volume de cette tumeur, & qu'ils y sont naturellement unis aux tegumens, il y a lieu de croire qu'elle conservera toujours sa même grosseur; ainsi il est vrai de dire que la maladie de cette pauvre Fille ne peut recevoir une guérison plus parfaite.

Voici maintenant toute la conduite que j'ai tenue depuis deux mois que j'ai pris soin de panser cette Malade. Pendant les premiers jours j'ai appliqué sur sa tumeur des fomentations & des cataplasmes émolliens, dans l'espérance de pouvoir, en relâchant les anneaux des muscles, réduire dans le ventre les parties qui en étoient sorties & formoient cette

tu-

tumeur à quoi je n'ai pû réussir. Quand après je me suis apperçû que la couleur naturelle des tegumens pâlissoit, & qu'ils retenoient l'impression des doigts, je me suis servi de cataplasmes resolutifs & fortifiants pour réveiller la chaleur naturelle. Sitôt que la gangrenne a paru, j'ai appliqué l'onguent de Stirax pour m'opposer à son progrès, & l'ai continué jusqu'à la séparation de l'escare. Depuis la dernière ponction, jusqu'à cette separation, j'ai feringué dans la tumeur de l'eau vulneraire dont je me suis toujours servi du depuis, tant pour résister à la pourriture que pour mondifier l'ulcere. Pour cet effet, j'ai mis dans la cavité des plumaceaux imbibez de cette liqueur, que j'ai couverts ensuite d'une emplâtre de minio, & d'une compresse trempée dans le vin rouge. Ce que j'ai continué de faire jusqu'au point de guérison où se trouve aujourd'hui cette pauvre Fille, qui peu de temps après fût conduite à l'Hôpital général, d'où elle est ensuite sortie pour se mettre en service. Là étant obligée de se courber pour frotter un plancher, il lui est arrivé, le ventre étant resserré par cette posture gênante, que l'intestin ileon uni aux anneaux des muscles, a été peu à peu poussé dans la tumeur restante, qu'il a dilaté son ouverture d'un pouce & demi, & qu'il est enfin sorti au dehors de la longueur de demi pied, en se renversant comme fait le Rectum quand il tombe par l'anus. La fluxion, l'inflammation, & la gangrenne superficielle, qui sont survenues à cet intestin pendant les grandes chaleurs du mois d'Août, ont obligé cette pauvre Fille à rentrer à l'Hôtel-Dieu pour y recevoir le secours dont elle a besoin.

V. OB-

## V. OBSERVATION.

Cette cinquième Observation servira non-seulement à confirmer ce que j'ai avancé dans la première, qui est que dans les Hernies qui arrivent par la pesanteur de l'épiploon, ou celle des intestins, & par le relâchement du mesentere auquel ils sont attachez, le péritoine forme toujours en se prolongeant dans les bourses une poche ou cul-de-sac qui se trouve uni aux membranes communes & propres des testicules; mais encore à prouver que les Aponeuroses des muscles obliques & transverses du ventre peuvent faire la même chose.

Dans les premières années que je passai à l'Hôtel-Dieu pour y apprendre la Chirurgie, il y mourut un Vieillard qui avoit une descende monstrueusement grosse. Cette maladie ne fut pas néanmoins la cause de sa mort, puisqu'il ne lui arriva aucun des accidens qui l'accompagnaient, lorsque les intestins souffrent un étranglement dans les anneaux des muscles du ventre.

L'envie de m'instruire jointe à la curiosité de voir ce qui pouvoit être renfermé dans une tumeur si prodigieuse, me porta à faire l'ouverture du Cadavre de ce pauvre homme. D'abord je coupai les tegumens communs du corps, le péritoine & les muscles du ventre. Sa capacité étant ouverte, je fus extrêmement surpris de n'y trouver qu'environ demi pied d'intestins greles, tous étoient passez, à la reserve de cette petite portion, dans le côté gauche du Scrotum. Le *cæcum*, naturellement placé dans l'ile droite, y étoit même descen-

du

du avec le commencement du colon. Ces intestins, par leur chute avoient tellement tiré à eux l'estomach, qu'au lieu de former, comme à son ordinaire, une ligne courbe au travers de la partie supérieure du ventre, il en décrivait une droite tombant perpendiculairement du diaphragme dans la partie inférieure du ventre.

Pour découvrir les intestins renfermez dans les bourses, je coupai ensuite le Scrotum, sous lequel parut une membrane que je pris pour la poche du peritoine; mais après l'avoir coupée une seconde se présentant je m'arrêtai pour examiner quelles pouvoient être ces deux membranes. Pour mieux reconnoître ce que je souhaitois savoir, je les defunis l'une d'avec l'autre jusqu'à la partie charnue des muscles du ventre, où étant parvenu, je vis que la première étoit une continuité de l'aponeurose du muscle oblique externe, & la seconde une suite de celle de l'oblique interne. Après cela je fis une incision à cette seconde membrane. Une troisième parut aussi-tôt, je séparai encore celle-ci d'avec l'autre, & procédant comme j'avois déjà fait, je remarquai que cette troisième n'étoit autre chose que l'aponeurose prolongée du muscle transverse. Cette troisième membrane étant coupée, il s'en présenta enfin une quatrième formée par l'extension du peritoine dans la poche duquel étoient immédiatement renfermez tous les intestins greles.

Par ces Observations que je fis avec beaucoup de soin, & dans un temps où je connoissois déjà assez les parties du Corps humain, pour ne m'y pas méprendre, il est évident que les

les aponeuroses des muscles obliques & transverses du ventre peuvent fournir, de même que fait le peritoine des enveloppes aux intestins quand les Hernies arrivent par le seul relâchement des membranes.

## VI. OBSERVATION.

L'expérience m'ayant fait connoître il y a long-temps l'extrême danger que courent ceux qui sont attaquez de suppression d'urine, lorsque, pour les soulager, on se trouve obligé, faute de les pouvoir sonder, de faire une ouverture au perinée pour entrer dans la vessie, je me suis toujours imaginé qu'il seroit beaucoup plus sûr de faire au dessus des os pubis une ponction au corps de cette partie pour en tirer l'urine.

L'occasion de faire cette épreuve se présenta le mois d'Août dernier. Un pauvre Homme âgé de soixante ans, ou environ ne pouvant point uriner depuis vingt-huit heures, vint à l'Hôtel Dieu pour y chercher le secours dont il avoit besoin. On tenta plusieurs fois de le sonder, on n'en pût venir à bout. Je le fis baigner; il prit des émulsions faites avec les semences froides, le sirop de Limon & l'eau de Parietaire. Tous ces remedes lui ayant été inutiles, je pris enfin la résolution de faire au dessus des os pubis à côté de la partie externe inferieure du muscle droit du ventre, une ponction au corps de la vessie avec un Troiscar portant avec lui sa canulle.

Il en sortit du moins trois chopines d'urine; qui parut d'abord mêlée de pus & de glaires. Je ne laissai la canulle dans la vessie que jusqu'au

qu'au lendemain ; parce qu'étant d'acier , je craignis que les parties piquées n'en souffrissent. Ce jour-là se passa sans urine, ce qui m'engagea sur le soir de répéter la ponction par le même endroit en prenant la précaution de porter dans la vessie mon Troiscar garni de sa canulle d'argent, dont je crûs que les parties pourroient se mieux accommoder. Je laissai pendant deux jours cette canulle dans la vessie, à la fin desquels l'urine commença à couler peu à peu par la verge, ce qui me porta à retirer la Canulle. Le premier jour qui suivit le moment de la ponction que je fis au Malade, je laissai la Canulle ouverte pour donner lieu à l'urine de s'écouler librement, & par ce moyen occasion à la vessie de se rétablir. Le second & le troisième jour je fermai la Canulle, me contentant de l'ouvrir pendant ces deux jours, de huit en huit heures, afin de remettre les fibres charnues de la vessie en état de se contracter pour chasser l'urine par l'urethre, ou par la Canulle au cas que le col de la vessie ne pût céder à l'effort des fibres de son corps. Le Malade passa la nuit du trois au quatre fort tranquillement, & le lendemain matin, il jetta par la verge, à ce qu'il me dit, deux pintes d'urine.

Le dix il fut parfaitement guéri de sa ponction, sur laquelle je n'appliquai dans le commencement qu'une compresse trempée dans le vin rouge, & sur la fin une emplâtre de minio. Quoique j'aie fait la ponction à côté de la partie inférieure du muscle droit pour entrer dans la vessie, & éviter l'artere & la veine épigastrique, qui rempent sur la surface interne de ce muscle, je crois cependant qu'elle

380 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
 qu'elle se peut faire sans courir aucun risque,  
 immédiatement au dessus de la symphyse des  
 os pubis entre les deux muscles pyramidaux.  
 Ce que j'ai éprouvé du depuis avec un heu-  
 reux succès.

~~~~~

## E S S A I D'UNE METHODE

*Pour trouver les Rayons des Développées, les  
 Tangentes, les Quadratures, & les Rec-  
 tifications de plusieurs Courbes, sans y  
 supposer aucune grandeur infiniment petite.*

Par M. DE TSCHIRNHAUS.

\* **L**A Methode dont il s'agit ici, consiste  
 principalement à supposer que certai-  
 nes quantitez sont égales, ainsi qu'on le va  
 voir dans l'Exemple suivant, lequel suffira  
 pour l'intelligence de cette même Methode.

Soit  $AGH$  une Parabole ordinaire, dont  
 on veuille trouver la Développée, c'est-à-di-  
 re, la Courbe qui par son développement dé-  
 criroit cette Parabole.

Pour cela, il est visible qu'il ne s'agit que  
 de trouver en général le point de concours  $M$   
 de deux perpendiculaires  $GM$ ,  $HM$ , aux  
 Tangentes de la Courbe en question, en deux  
 points

\* 23. Decembre 1701.





1. Par la nature de la Parabole  $AGH$ , l'on aura  $2ax = yy$ , &  $2ar = zz$ .

2. Les Triangles rectangles semblables  $GCD$  &  $DKM$  donneront  $GC$  ( $y$ ).  $CD$  ( $a$ ) ::  $DK$  ( $t$ ).  $KM$  ( $u-x$ ). Et par conséquent aussi  $uy - xy = at$ , ou (en multipliant le tout par  $2a$ )  $2a uy - 2axy = 2aat$ . Donc en substituant ici la valeur de  $2ax$ , trouvée dans l'article 1. l'on aura  $2a uy - y^3 = 2aat$ .

3. Les Triangles rectangles semblables  $HEF$  &  $FLM$  donneront de même  $2auz - z^3 = 2aat$ . donc en retranchant cette égalité de la précédente, l'on aura  $2a uy - y^3 - 2auz + z^3 = 0$ , ou (en divisant par  $z - y$ )  $2au = zz + yz + yy$ . Donc en substituant cette valeur de  $2au$  dans l'équation  $2a uy - y^3 = 2aat$  de l'article 2. l'on aura  $2aat = yzz + yyz$ .

4. Ce sont là des Theorèmes généraux, dans lesquels si l'on suppose  $y = z$ , l'on aura  $2au = 3yy$  &  $aat = y^3$ . De sorte qu'en élevant le tout à  $y^6$ , l'on aura  $\frac{8a^3 u^3}{27} = y^6 = a^4 tt$ , ou  $8u^3 = 27att$  pour l'équation de la Courbe cherchée  $BM$ , laquelle on voit devoir être ici une seconde Parabole cubique.

5. Delà il est aisé de trouver la longueur du rayon  $GM$  de cette Développée. Car en supposant  $GD = p$  &  $GM = q$ , l'on aura non seulement  $aa + yy = pp$ ; mais encore  $CG$  ( $y$ ).  $GD$  ( $p$ ) ::  $CG + DK$  ( $y + t$ ).  $GM$  ( $q$ ). ou  $qy = py + pt$ . de sorte qu'ayant déjà (art. 4.)  $t = \frac{y^3}{aa}$ , l'on aura aussi  $aaqy =$   
 $apy$

$aa py + py^3$ , ou  $aaq = aap + ppy$ . Donc ayant de plus  $aa + yy = pp$ , l'on aura enfin  $aaq = p^3$ , ou  $q (GM) = \frac{p^3}{aa}$ . Ce qu'il falloit trouver.

Cette Méthode pourroit encore donner tout cela en d'autres manieres. On peut trouver de même par la seule Analyse ordinaire, les Tangentes & les Rectifications de plusieurs Courbes, avec les Quadratures de leurs espaces.

~~~~~

## OBSERVATIONS

*Sur le Corps d'une Femme grosse de huit mois de son premier Enfant, morte subitement d'une chute.*

Par M. LITTRE.

### PREMIERE OBSERVATION.

L'OVAIRE gauche de cette femme étoit fort flétri, il ne contenoit que peu de vésicules & qui étoient très-petites.

### II. OBSERVATION.

La trompe du même côté immédiatement au dessous du pavillon, étoit colée à l'ovaire, & son embouchure étoit tournée en devant du côté du fond de la matrice.

### III. OB-

## III. OBSERVATION.

On remarquoit à la superficie de l'ovaire droit, un trou rond & large de deux lignes, par lequel il sortoit un corps rond, gros comme un petit pois, percé en son milieu d'un trou aussi rond d'une ligne de diametre, & dont le bord étoit froncé. Ce corps faisoit partie d'une caroncule, grosse & à peu près de la figure d'une moyenne cerise; elle étoit creuse, & sa cavité qui avoit deux lignes & demie de largeur, répondoit au trou que j'y avois remarqué; elle étoit composée de deux différentes substances: l'interieure étoit glanduleuse, de couleur jaunâtre & épaisse d'une demi-ligne; l'exterieure étoit musculieuse & avoit environ un tiers de ligne d'épaisseur.

C'est apparemment par le trou de cet ovaire, qu'étoit sortie la vesicule qui avoit contenu le Fœtus, dont cette Femme étoit grosse. D'autant plus qu'il ne paroissoit aucune autre caroncule ni aucune cicatrice dans cet ovaire non plus que dans le gauche; & que le pavillon de la trompe gauche étant fortement colé à l'ovaire du même côté comme je l'ai déjà dit, n'en pouvoit rien recevoir pour passer de là dans la matrice.

## IV. OBSERVATION.

La cavité de la trompe droite paroissoit avoir été un peu dilatée & élargie; elle contenoit une humeur glaireuse; la disposition de son pavillon étoit tout à fait naturelle, & celle de la trompe gauche ne l'étoit point du tout.

V. OB-

## V. OBSERVATION.

Les deux ligamens ronds de la matrice qui (hors du temps de la grossesse) ont leur commencement aux côtes de son fond, commençoient dans cette Femme deux pouces au dessous.

Le changement de situation des ligamens ronds venoit vrai-semblablement de ce qu'étant d'un tissu plus ferré que le corps de la matrice, ils avoient résisté aux efforts que le Fœtus en croissant avoit faits pour les allonger; pendant que le fond de la matrice y avoit cédé & s'étoit laissé étendre.

## VI. OBSERVATION.

Les parois de la matrice (principalement aux endroits, où le placenta étoit attaché,) avoient huit lignes d'épaisseur; elles étoient toutes charnues & le dedans de leur substance aussi-bien que leur face intérieure, étoit plein de trous qui avoient une figure ronde ou ovale, larges depuis une demi ligne jusqu'à deux & qui communiquoient tous ensemble; parce qu'en soufflant dans quelqu'un de ces trous, le vent passoit dans les autres & soulevoit tout le corps de la matrice. Peut-être que ces trous tiennent lieu de veines dans cette partie, de même que les cellules dans la rate; aussi ne remarquai-je presque rien dans la matrice qui eût la forme de tuyau de veine, que vers sa surface extérieure.

Une telle structure de la matrice nous peut aisément faire comprendre 1. Qu'elle est un

muscle reticulaire ou fait en forme de rezeau ;  
 2. Comment pendant la grosseſſe elle s'étend  
 & s'épaiſſit en même temps autant qu'elle le  
 fait ; 3. Comment peu de jours après l'accou-  
 chement elle se réduit presque à la même gran-  
 deur qu'elle avoit avant la grosseſſe. Et enfin  
 que le sang qui fait les regles des femmes, tom-  
 be tous les mois dans la cavité de la matrice  
 par lès trous dont je viens de parler.

## VII. OBSERVATION.

Le cou de la matrice avoit 5. lignes de lon-  
 gueur ; ses parois en avoit trois d'épaiſſeur ; sa  
 ſurface interieure étoit parsemée de quantité  
 de petits trous & de plusieurs petites vesicules  
 pleines d'une liqueur fort claire ; sa cavité,  
 qui avoit 9. lignes de diametre, étoit terminée  
 du côté du corps de la matrice par un rebord  
 membraneux de figure circulaire & qui avoit  
 plus d'une demi-ligne d'épaiſſeur sur trois de  
 largeur ; le chorion du Fœtus étoit attaché  
 tout autour de ce rebord, & bouchoit entie-  
 rement l'ouverture du cou de la matrice, &  
 la cavité de ce cou étoit pleine d'une humeur  
 glaireuse.

## VIII. OBSERVATION.

Le placenta, ou le chorion du Fœtus cou-  
 vroit la superficie interieure de tout le corps  
 de la matrice, & l'un & l'autre y étoient étro-  
 tement attachez, mais principalement le pre-  
 mier. On remarquoit dans le placenta quan-  
 tité de grains glanduleux avec leurs conduits  
 particuliers ; il y avoit beaucoup plus de sang  
 dans

dans ses arteres que dans les veines, & il étoit plus noir & plus épais dans celles-là que dans celles-ci. Ce qui semble prouver, que le sang de la veine ombilicale est plus tenu, plus subtil & plus propre à nourrir, que celui des arteres du même nom.

On peut inferer des deux dernieres Observations, que si la même chose arrive dans toutes les femmes grosses, la superfoetation est impossible du moins après que le placenta & le chorion se sont attachez à la surface interieure de tout le corps de la matrice.

1. Parce qu'alors rien ne peut descendre de la cavité des trompes dans celle de la matrice; à cause de l'application exacte du placenta à la superficie interieure du fond de la matrice.

2. Parce que dans ce temps-là la semence du mâle ne peut pas entrer dans la cavité de la matrice; à cause que son cou est bouché par une humeur glaireuse comme j'ai dit.

#### IX. OBSERVATION.

Le Fœtus étoit envelopé de trois membranes qui étoient fort distinctes & telles que je les ai décrites dans un autre Mémoire.

#### X. OBSERVATION.

Les parois de la vessie de cette Femme étoient trois fois plus épaisses que dans l'état naturel. Sa grandeur n'excedoit pas celle d'un œuf de Cane; parce qu'apparemment la matrice par son poids & par son volume extraordinaire, ôtoit à la vessie la liberté de se dilater assez pour recevoir & contenir tout à la

388 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
fois beaucoup d'urine, & pressant sans cesse la  
vessie elle l'obligeoit de se contracter à tous  
momens pour chasser hors de sa cavité l'urine  
à mesure qu'elle y tomboit. Enfin le cou de  
la vessie étoit entouré de fibres charnues pres-  
que circulaires fort sensibles qui faisoient sans  
doute la fonction de Sphincter à son égard.

~~~~~

## OBSERVATION DE L'ECLIPSE

*De l'Etoile Aldebaram ou Oeil du Taureau  
par la Lune à l'Observatoire le 23. Sep-  
tembre au matin 1701.*

Par M. DE LA HIRE.

**L**E 19. Août 1699. j'observai une Occulta-  
tion ou Eclipsé de l'Etoile Aldebaram,  
comme elle est rapportée dans les Mémoires  
de cette année-là ; & j'étois attentif à cette  
Observation pour savoir par moi-même ce  
qu'on avoit avancé de ces Eclipses d'Etoiles  
par la Lune. Le R. P. Feuillée Minime avoit  
observé une Etoile qui paroissoit sur le corps  
éclairé de la Lune avant son occultation ou  
immersion. Ce Phenomène avoit fait penser  
à quelques Physiciens qu'il y avoit autour de  
la Lune une Atmosphere plus rare que le res-  
te de la matiere étherée qui en est plus éloi-  
gnée. Je verifiai l'Observation de ce Pheno-  
mène,



mene, & j'en rendis raison par une cause toute naturelle & connue. Voici encore une semblable Observation de la même Etoile que j'ai faite le 23. Septembre au matin de cette année 1701. qui servira de confirmation à la précédente.

L'Etoile Aldebaram fut entièrement cachée derrière la partie éclairée de la Lune au matin à 6<sup>h</sup>. 7'. 0". & elle sortit de la partie obscure à 6<sup>h</sup>. 53'. 18". On voyoit l'Etoile sur le disque éclairé de la Lune, qui y étoit avancée de la quantité de un-&-demi de son diamètre avant qu'elle s'éclipsât, & l'Eclipse de l'Etoile n'arriva que 2". de temps après que l'Etoile fut entrée sur le disque de la Lune.

La raison que j'ai donnée de cette apparence, servira pour toutes les autres Eclipses semblables. Elle fera aussi connoître que l'on observe toujours les diamètres de la Lune un peu plus grands qu'ils ne devroient être, & beaucoup plus grands qu'ils ne paroissent dans les Eclipses de Soleil; puisque la lumière du Soleil fait paroître le vrai diamètre de la Lune plus petit qu'il n'est en effet, lequel par la même raison on estime plus grand qu'il n'est en observant son disque éclairé.



# S Y S T E M E G E N E R A L

*Des Intervalles des Sons, & son Application à tous les Systèmes & à tous les Instrumens de Musique.*

Par M. SAUVÉUR.

## P R E F A C E.

L'OCCASION dans laquelle je me suis trouvé d'expliquer la Theorie de la Musique à des Princes fort éclairés, & à des personnes d'un esprit profond, m'a donné lieu de remarquer que ceux qui se sont attachez à la Musique speculative n'ont eu en vûe que quelques proprietés des Sons, & sur tout la pratique du chant qui étoit en usage de leur temps. Ils se sont contentez de faire par rapport à cela, des Systèmes de Musique, que d'autres ont peu à peu changez, à proportion que le goût de la Musique changeoit; personne que je sache, n'a pris cette matiere plus haut, & ne l'a regardée comme l'objet d'une Science supérieure à la Musique pour en détacher ensuite une partie qui lui convînt en particulier, & qui eût une liaison naturelle & simple avec  
les

les autres parties renfermées dans la même Science.

J'ai donc crû qu'il y avoit une Science supérieure à la Musique, que j'ai appelée Acoustique, qui a pour objet le Son en général, au lieu que la Musique a pour objet le Son entant qu'il est agréable à l'ouïe.

Pour traiter cette Science à la maniere des autres, & sur tout de l'Optique, avec laquelle elle a beaucoup de rapport, il auroit fallu expliquer la nature du Son, l'organe de l'ouïe, & en détail toutes les propriétés du Son, pour en conclurre les causes de l'agrément & du desagrement des Sons qui servent d'objet à la Musique & à la sympathie des Sons; & enfin les machines non seulement de la Musique en particulier, mais encore de l'Acoustique en général.

Comme le Son est formé par les vibrations des parties du corps sonore, & que la principale propriété de ces vibrations consiste dans le rapport du nombre des vibrations d'un Son avec celui des vibrations d'un autre Son; ce qui forme les differens degrez ou intervalles du Son selon l'aigu & le grave; je pris le parti en 1696. de chercher une mesure commune de tous les intervalles des Sons, capable de les mesurer dans leurs differences les moins sensibles, de donner des noms & des caracteres à tous ces Sons, qui fussent tels qu'on en pût prendre ceux qui seroient necessaires pour la

Musique ordinaire, & qui renfermassent d'une maniere simple & aisée toutes les proprietéz qui regardent cet art, sans néanmoins avoir dessein d'exclurre les notes ausquelles les Musiciens sont accoutumez depuis si long-tems.

Ensuite je donnai un essai d'Aoustique dans un Traité de Musique speculative, que je dictai au College Royal en 1697. On auroit souhaité que je l'eusse fait imprimer; mais les raisons suivantes m'en empêcherent. 1. Les noms & les caractères que je donnois aux Sons étant nouveaux, je ne doutois pas que je ne trouvasse sur tout parmi les Musiciens, des personnes qui seroient d'un sentiment opposé; & j'esperois par les objections qu'ils me feroient, de trouver occasion à quelque correction; mais comme ils n'en faisoient que par raport à l'usage reçu, & qu'ils ne regardoient les Sons que pour leurs besoins, je fus obligé de faire par moi-même quelques petits changemens. 2. En travaillant au Traité de Musique speculative, je reconnus la necessité d'un Son fixe pour servir de terme auquel l'on pût comparer tous les autres Sons aigus & graves: en 1700. je donnai une maniere que j'avois imaginée pour le trouver; & comme dans l'Histoire de l'Academie on n'en a montré que la necessité & les avantages qu'on en tireroit, je donne ici la maniere de le trouver \*. 3. En méditant sur les Phénomènes des Sons, on me fit remarquer, que

\* Voyez la Section XII.

que sur tout la nuit, \* on entendoit dans les longues cordes, outre le Son principal, d'autres petits Sons qui étoient à la douzième & à la dix-septième de ce Son; que les Trompettes outre ces Sons-là en avoient d'autres, dont le nombre des vibrations étoit multiple du nombre de celles du Son fondamental. Je ne trouvai rien dans les explications des Trompettes marines qui me satisfît là-dessus. Mais en cherchant moi-même la cause de ce Phénomène, je conclus que la corde outre les ondulations qu'elle faisoit dans toute sa longueur pour former le Son fondamental, se partageoit en deux, en trois, en quatre &c. ondulations égales qui formoient l'octave, la douzième, la quinzième de ce Son: je conclus ensuite la nécessité des nœuds & des ventres de ces ondulations, & la manière de les apercevoir au toucher & à la vue comme je l'explique dans les Sons harmoniques. 4. Ce Phénomène m'a donné lieu à la recherche de quelques autres pour la sympathie des Sons, pour les instrumens à vent, & pour les instrumens d'Aoustique, qu'on peut perfectionner jusqu'à un même degré que ceux d'Optique; & j'attens que ces choses soient dans leur perfection, pour donner enfin lien à un Corps parfait d'Aoustique.

Comme la partie de l'Aoustique qui a pour objet les intervalles des Sons, sert de principe à toutes les autres; qu'elle a eu le temps d'être

R 5 di

\* Voyez les Sections ix & x.

digerée ; que j'ai donné à mon *Système* toute l'étendue qu'on peut souhaiter, & que j'en fais une application générale à toutes sortes de *Systèmes* & d'instrumens de *Musique*, & qu'enfin on commence à citer les intervalles de mon *Système*, j'ai crû qu'il étoit temps de le donner au public ; ce que je fais avec le plus de brièveté & de netteté qu'il m'est possible. Je me donne la liberté d'introduire des mots nouveaux, qui sont nécessaires à l'étendue de mon *Système*. Je ne donne point ici de démonstration des choses que j'avance, parce qu'ontre que plusieurs l'ont fait à l'égard d'une partie, la démonstration du reste regarde un *Traité* complet d'*Acoustique*.

## SECTION I.

### *Du Rapport des Sons, & des Intervalles.*

L'*ACOUSTIQUE* nous apprend, que si deux corps sonores font autant de vibrations l'un que l'autre dans le même temps, ils font à l'unisson ; & que si l'un en fait plus que l'autre dans un même temps, celui qui en fait moins rend un Son grave, & que celui qui en fait plus, rend un Son aigu ; & qu'ainsi le Rapport des Sons graves & aigus consiste dans le rapport des nombres des vibrations que l'un & l'autre font en même temps : c'est pourquoi le rapport de deux Sons qui sont à la quinte, consiste dans celui de 2 à 3 ; ce qui signifie, que pendant que le Son le plus grave fait

fait 2 vibrations, celui qui est à la quinte en fait 3.

Nous venons de comparer les Sons par le rapport du nombre des vibrations de l'un de ces Sons au nombre des vibrations de l'autre, ce que nous appellerons simplement dans la suite *Rapport des Sons*. Il y a une autre manière de comparer les Sons qui est par leurs *Intervalles*.

Pour concevoir ce que c'est que l'Intervalle de deux Sons, imaginez d'abord deux Sons égaux ou à l'unisson, & qu'ensuite l'un monte en devenant successivement aigu de plus en plus à l'infini; celui ci s'éloignera de l'autre de plus en plus; & c'est cet éloignement ou la distance de ces deux Sons qu'on appelle en général *Intervalle*. La même chose arrivera, si ce Son descend en devenant grave de plus en plus.

Ces Intervalles se partagent d'abord par *Diapason* ou *Octaves*, ce qui arrive lorsque le Son le plus aigu fait deux vibrations contre une du plus grave; ainsi le Son qui monte, passe par les Intervalles d'une première, seconde, troisième, quatrième, &c. Octave, lorsqu'il fait 2, 4, 8, 16, &c. vibrations contre une du premier; & ce Son passe par de semblables Octaves en descendant, lorsqu'il ne fait que  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{16}$  des vibrations du premier son.

Comme ces Sons sont indéfinis en montant aussi-bien qu'en descendant, on ne peut point commencer ces Sons ni par le plus aigu ni par le plus grave; il faut donc commencer par un des moyens pour servir de *Son fondamental*, auquel on puisse comparer les Sons plus aigus, aussi-bien que les Sons plus graves.

Les Musiciens prennent pour Son fondamental le C S O L U T, qui est le ton de Chapelle ou le ton d'Opera: ce Son est le milieu du Clavecin, ou est celui d'un tuyau d'Orgue de quatre pieds ouvert; mais comme ce Son n'est pas assez déterminé, nous prenons pour Son fondamental le *Son fixe*, \* qui fait cent vibrations dans une seconde de temps, dont j'ai parlé ci-dessus.

A commencer par le Son fondamental, les Sons aigus sont divisez par Octaves, aussi bien que les graves; j'appellerai celles-là simplement *Octaves* ou *Octaves aigues*, & celles-ci *Sous-octaves*, ou *Octaves graves*.

Le Diapason ou l'Octave étant un Intervalle trop grand, il est nécessaire de le partager en d'autres Intervalles plus petits. Les Musiciens dans le Système Diatonique, qui est le plus en usage, ont partagé l'Octave en sept Intervalles par des Sons qui sont dans les rapports des nombres 24. 27. 30. 32. 36. 40. 45. 48. Dans ce Système il y a deux choses à remarquer: 1°, le nom de ces différens Intervalles: 2°, le Rapport de chaque Intervalle.

I. L'Intervalle d'un Son au suivant s'appelle *Seconde*; l'Intervalle d'un Son au troisième s'appelle *Tierce*, & ainsi de suite; de sorte que l'Intervalle du premier au dernier s'appelle *Octave*, comme l'on peut voir dans la première colonne de la Table générale. Si l'on continue ces nombres au delà de l'Octave en les multipliant par 2, ensuite par 4, par 8, par 16, &c. ces Intervalles iront jusqu'aux *neuvièmes*, *dixièmes*, & ainsi à l'infini.

II. En

\* Voyez la Section XII.



II. En comparant un Son avec le suivant, l'on aura de trois sortes de Secondes. 1°. 24, 27. & 32, 36. & 40, 45. dont les rapports sont égaux à celui de 8 à 9. & cet Intervalle s'appelle *Ton majeur*. 2°. 27, 30. & 36, 40. qui sont les mêmes que le rapport de 9 à 10. Cet Intervalle s'appelle *Ton mineur*. 3°. 30, 32. & 45, 48. qui sont égaux au rapport 15, à 16. & cet Intervalle s'appelle *Semiton majeur*. Les Tons majeur & mineur s'appellent *Secondes Majeures*, & le demiton *Seconde Mineure*. Et ces trois sortes de Secondes sont les Elemens du Systême Diatonique.

Selon le different mélange des Tons & des Demitons, l'on aura des Tierces, Quartes, Quintes, &c. majeures & mineures; & selon les differens mélanges des Tons majeurs & mineurs; l'on aura des Intervalles justes ou alterez. Mais il n'y a qu'une sorte d'Octave. La Quarte majeure s'appelle *Triton*, & la mineure s'appelle simplement *Quarte*. La Quinte majeure s'appelle simplement *Quinte*; & la mineure, *fausse Quinte*. L'on aura les rapports de ces Intervalles dans la Table générale, comme nous marquerons ci-après.

Entre les Intervalles du Systême Diatonique nous appellerons la Seconde, la Tierce, & la Quarte, *petits Intervalles*; & la Quinte, la Sixte, & la Septième, *grands Intervalles*. De plus un Intervalle est le *Complement* de l'autre à l'Octave, lorsqu'il acheve l'Octave; ainsi la Quarte est le complement de la Quinte à l'Octave; la Tierce l'est de la Sixte; & la Seconde de la Septième & reciproquement. Mais les complemens des Intervalles majeurs sont mineurs & reciproquement; ainsi la Sixte

398 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
majeure est complement de la Tierce mineure.

Enfin l'Unisson, l'Octave, la Quinte, la Quarte, les Tierces & les Sixtes majeures & mineures sont appelez *Consonances*, & les autres Intervalles *Dissonances*.

Outre ces Intervalles du Système Diatonique, les Musiciens reconnoissent le *Semiton mineur*, qui est la difference du Semiton majeur au Ton mineur, & le *Comma* qui est la difference du Ton majeur au Ton mineur.

En comparant les Sons aigus au Son fondamental, nous appellerons leurs Intervalles simplement *Secondes*, *Tierces*, *Quartes*, *Quintes*, *Sixtes*; & ainsi en montant à l'infini; mais en comparant les Sons graves au Son fondamental, nous appellerons leurs Intervalles, *Sous-secondes*, *Sous-tierces*, &c. Voyez la Table suivante.

La VIII<sup>e</sup>. la XV<sup>e</sup>. la XXII<sup>e</sup>. la XXIX. la XXXVI<sup>e</sup>. &c. du Son fondamental sont appellées la premiere, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup> Octave ou Octave aigue. De même la Sous-VIII<sup>e</sup>, la Sous-XV<sup>e</sup>, la Sous-XXII<sup>e</sup>, &c. sont appellées la premiere, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, &c. Sous-Octave, ou Octave grave.

Les Sons & les Intervalles compris entre le Son fondamental & son Octave aigue seront appelez les Sons & les Intervalles de l'*Octave moyenne*. Ceux qui sont entre la VIII<sup>e</sup>, & la XV<sup>e</sup> seront de la *premiere Octave aigue*: ceux qui sont entre la XV<sup>e</sup> & la XXII<sup>e</sup> seront de la *seconde Octave aigue*, & ainsi de suite en montant. De même ceux qui sont entre le Son fondamental & la Sous-Octave seront appelez Sons & Intervalles de la *premiere Sous-Octave*; ceux qui sont entre la Sous-VIII<sup>e</sup> & la Sous-XV<sup>e</sup>,

372

INTERVALLES AIGUS.

|       |
|-------|
| XXII. |
| XXI.  |
| XX.   |
| XIX.  |
| 18.   |
| XVII. |
| XVI.  |
| XV.   |
| XIV.  |
| XIII. |
| XII.  |
| 11.   |
| X.    |
| IX.   |
| VIII. |
| VII.  |
| VI.   |
| V.    |
| 4.    |
| III.  |
| II.   |
| I.    |

I. Son fondamental

Intervalles des Octaves aigues.

Repliques. Tripliques.

|      |
|------|
| VII. |
| VI.  |
| V.   |
| 4.   |
| III. |
| II.  |
| I.   |
| VII. |
| VI.  |
| V.   |
| 4.   |
| III. |
| II.  |
| I.   |

Oct. moyenne. 1. Octave.

2<sup>e</sup>. Octave.

3<sup>e</sup>.

Sous-INTERVALLES,  
ou Intervalles graves.

|                       |
|-----------------------|
| Sous-2 <sup>e</sup> . |
| 3.                    |
| 4.                    |
| V.                    |
| 6.                    |
| 7.                    |
| VIII.                 |
| 9.                    |
| 10.                   |
| 11.                   |
| XII.                  |
| 13.                   |
| 14.                   |
| XV.                   |

Intervalles des Octaves graves.

Sous-repliques. Sous-tripliques

|      |
|------|
| VII. |
| VI.  |
| V.   |
| 4.   |
| III. |
| II.  |
| I.   |
| VII. |
| VI.  |
| V.   |
| 4.   |
| III. |
| II.  |
| I.   |

1. Sous-Octav. 2. Sous-Octav.

400 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
xv<sup>e</sup>, sont appelez de la seconde Sous-Octave; & ainsi de suite en descendant.

Les Intervalles de la premiere, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> Octave, sont appelez les *Repliques*, *Tripliques*, *Quadrupliques*, de ceux de l'Octave moienne, ou bien leurs premieres, 2<sup>es</sup>, 3<sup>es</sup>, &c. Octaves; ainsi la xii<sup>e</sup> est la repliche ou l'Octave de la Quinte, la xvii est la triplique ou la seconde Octave de la Tierce. De même les Intervalles de la premiere, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, &c. Sous-Octave sont les *Sous-repliques*, *Sous-tripliques*, *Sous-quadrupliques* de ceux de l'Octave moienne, ou leurs premieres, 2<sup>es</sup>, 3<sup>es</sup>, &c. Sous-Octaves.

Remarquez, que les Octaves ou Sous-Octaves des Consonances sont des Consonances, & celles des Dissonances sont des Dissonances.

Les Intervalles dont nous venons de parler, sont reçûs de ceux qui suivent les Systèmes Diatonique, Chromatique, & Enharmonique; & ainsi nous sommes obligez d'en retenir les noms: mais ils ne sont pas propres à expliquer toutes les proprietéz des Sons & de leurs Intervalles. Car 1. chaque Intervalle est équivoque; par exemple, une Tierce signifie une majeure & une mineure, une superflue & une diminuée, une maxime & une minime; une juste, une alterée, & une tempérée, comme nous l'expliquerons dans les Systèmes Chromatique & Enharmonique. 2. Le double d'un Intervalle ne marque pas le double du nombre qui le designe; ainsi deux iii<sup>es</sup>. ne font pas une vi<sup>e</sup>. mais une v<sup>e</sup>. & encore la Quinte, est la somme de deux tierces différentes. 3. Le multiple d'un Element des Intervalles, par  
ex-

exemple du Ton majeur, ne forme aucun Intervalle reçu dans le Système Diatonique, mais il faut pour cela prendre la somme de différens Elemens. 4. Le Comma n'est point aliquote d'aucun Intervalle, quoique les Musiciens le regardent comme tel.

Il est donc nécessaire pour connoître exactement ces Intervalles, de trouver une commune mesure, au moins de tous les Intervalles qui sont les Elemens des autres; c'est-à-dire du Ton majeur, du Ton mineur, & du Semiton majeur. Et comme il est impossible de les avoir exactement, il suffit de les avoir dans une précision suffisante pour la pratique de l'Acoustique. C'est pourquoi nous avons divisé l'Octave en 43. Intervalles égaux, que nous appellons *Merides*, & chaque Meride en 7. *Epimerides* égales; c'est avec ces parties que nous exprimerons non seulement les Intervalles ordinaires de Musique, mais encore tous les Intervalles qu'on peut imaginer dans l'Acoustique.

## SECTION II.

*Explication de la premiere partie des Tables du Système général des Intervalles, & des Rapports des Sons.*

LA Planche I, qui met devant les yeux tout nôtre Système général, a deux parties. La premiere contient le *Système Diatonique*, & la seconde contient les *Tables du Système général*. Ces deux Systèmes sont joints ensemble

ble pour montrer le raport de l'un à l'autre.

Dans le Systême Diatonique il y a 4. colonnes. La I. colonne marque les *Intervalles* du Systême Diatonique dans l'Octave moienne. Les Consonances sont en lettres majuscules, & les Dissonances sont en Romaines : les autres Intervalles, savoir le Comma & Semiton mineur, qui ne sont pas du Systême Diatonique, sont en Italique.

Ces Intervalles sont aussi marquez à la marge par des chiffres; savoir les majeurs en chiffres Romains, & les mineurs en chiffres Arabes: de sorte que vi, signifie Sixte majeure, & 6, Sixte mineure.

Après ces Intervalles nous avons mis les marques ( ) & [ ] pour servir de renvoi aux endroits des Tables du Systême général qui marquent ces Intervalles justes.

Pour avoir le nom des Octaves aigues de ces Intervalles, aux nombres vii. xiv. xxi. xxviii. xxxv. xxxii. ajoutez ces Intervalles : ainsi l'Octave de la v. est une xiii. La troisième Octave d'une iv. est une xxv. Et pour avoir les sous-Octaves ou les Octaves graves de ces mêmes Intervalles, des nombres ix. xvi. xxviii. xxx, ôtez ces Intervalles, mais les Majeurs deviennent Sous-mineurs, & les Mineurs Sous-majeurs : ainsi la sous-Octave de la v. est une sous-4<sup>e</sup>. La triple sous-Octave de la 6e. est une sous-xvii.

La II. colonne marque les *Elemens* ou les petits Intervalles dont les autres Intervalles de l'Octave moienne sont composez. T. signifie Ton majeur. t. Ton mineur. S. Semiton majeur. s. Semiton mineur : c. Comma. Par-là l'on voit que la Quinte 2 T. t. S. est composée de

de 2. Tons majeurs, d'un Ton mineur, & d'un Semiton majeur.

Pour avoir les Elemens des Octaves aigues de ces Intervalles, multipliez l'Octave 3 T. 2 t. 2 S. par 1. 2. 3. 4. 5. 6. & au produit ajoutez l'Intervalle donné : ainsi pour avoir les Elemens de l'Octave de la Quinte, ou les Elemens de la XII<sup>e</sup>. à 3 T. 2 t. 2 S. ajoutez 2 T. t. S. vous aurez 5 T. 3 t. 3 S. De même pour avoir les Elemens de la 25<sup>e</sup>. ou de la 3<sup>e</sup>. Octave de la Quarte, à 9 T. 6 t. 6 S. ajoutez T. t. S. vous aurez 10 T. 7 t. 7 S.

Pour avoir les Elemens des sous-Octaves ou des octaves graves de ces Intervalles, de ces mêmes produits ôtez ces Intervalles ; ainsi pour avoir les Elemens de la sous-18<sup>e</sup>. ou de la 3<sup>e</sup>. Sous-octave de la Quinte, de 9 T. 6 t. 6 S. ôtez 2 T. t. S. il restera 7 T. 5 t. 5 S. qui sont les Elemens de la Sous-18<sup>e</sup>.

La III. colonne contient *les rapports des Sons* de chaque Intervalle au Son fondamental marqué UNISSON. Ainsi la Quinte 2. 3. signifie que pendant que le Son fondamental fait 2 vibrations, le Son qui est à la Quinte en fait 3.

Pour trouver les rapports des Octaves aigues des Intervalles de la III. colonne, multipliez le second nombre de leurs rapports par 2. 4. 8. 16. 32. 64. Et pour avoir leurs Octaves graves, multipliez le premier nombre de ces rapports par ces mêmes. Ainsi pour avoir la 2<sup>e</sup>. Octave de la Quinte 2. 3. multipliez 3. par 4. vous aurez 2. 12. ou 1. 12. ou 1. 6. Et pour avoir sa 2<sup>e</sup>. sous-Octave, multipliez 2. par 4. vous aurez 8. 3.

La IV. colonne marque *les noms anciens* que  
Guy

*Guy Aretin* Moine. Benedictin a donné aux Sons du Systême Diatonique vers l'année 1024. auxquels l'usage a ajoûté Si vers l'année 1670.

Nous avons marqué en majuscules les Noms principaux, qui sont les Touches noires des Orgues ou des Clavecins, & en Romaines leurs *b* mols & leurs Dieses, qui sont d'usage dans le Systême Chromatique des Musiciens, & qui sont les Touches blanches des Orgues ou des Clavecins : enfin les autres *b* mols & Dieses sont en Italique, & représentent le Systême Enharmonique, ou le transposé des Musiciens. (Les Systêmes Chromatique & Enharmonique des Anciens, sont differens de ceux des Musiciens dont nous parlons.) On sait que le *b* mol baisse le Son d'un Semiton mineur, & le Die-se le hausse de la même quantité.

Les Sons des autres Octaves ont les mêmes Noms. Mais, pour distinguer les Notes \* qui expriment ces mêmes Noms, l'on se sert de trois clefs. La 1<sup>re</sup>. appelée C SOL, UT. marque le son fondamental ou l'Unisson ou simplement l'UT. La 2<sup>e</sup>. G, RE, SOL. marque la Quinte ou le SOL. La 3<sup>e</sup>. F, UT, FA. marque la sous-Quinte ou le FA de la 1<sup>re</sup>. Sous-octave. Par ces 3. Clefs l'on connoît les autres Notes qui sont éloignées au plus de 2. Octaves du Son fondamental.

\* Voyez dans la Planche III. la 5 & 6. ligne.



## SECTION III.

*Explication des Tables du Système général  
des Intervalles & des Rapports des Sons.*

\* **L** A I. Table générale est celle des *Merides* avec les *Eptamerides*.

Pour comprendre cette Table & les suivantes, il faut savoir que je divise l'Octave en 43. Intervalles égaux que j'appelle *Merides*; & je divise chaque Meride en 7. petits Intervalles égaux, que j'appelle *Eptamerides*.

Les *Merides* sont d'ordre dans la colonne du milieu, à commencer par le Son fondamental ou par *Ur*, qui contient 0. Meride, en continuant de suite jusqu'à l'Octave qui contient 43. Merides.

A gauche de cette colonne sont trois colonnes, qui marquent par des traits mis sous les nombres, les mêmes *Merides* moins 1, 2 & 3 *Eptamerides*; & à droite sont 3 autres colonnes qui marquent par de semblables traits mis sur les nombres, les mêmes *Merides* plus 1, 2 & 3 *Eptamerides*.

Pour trouver les *Merides* & les *Eptamerides* que contient chaque Intervalle du Système Diatonique exact, prenez ses *Elemens* dans la colonne II. dans laquelle le Ton majeur *T.* contient 7". c'est-à-dire 7 *Merides* plus 2 *Eptamerides*. Le Ton mineur *t.* contient 7<sup>'''</sup>. ou 7 *Merides* moins 3 *Eptamerides*, & le *Semiton* majeur *S.* contient 4 *Merides*. De sorte que  
pour

\* Planche L.

pour avoir un Intervalle comme la Quinte , dont les Elemens sont 2 T. t. S. prenez leurs valeurs 7". 7'. 7<sub>'''</sub>. 4. dont la somme est 25'.

Dans cette Table & dans les suivantes les Intervalles exacts sont renfermez dans les marques ( ) ou [ ].

Pour avoir les Intervalles temperez du Systeme Diatonique , il ne faut prendre que les Merides en negligean les Eptamerides marquez au dessus ou au dessous des Merides ; ainsi la Quinte temperée est de 25. Merides. Ces Intervalles temperez se trouvent tous dans la colonne du milieu.

Pour avoir les Merides des Octaves aigues des Intervalles de la Table, à 43. 86. 129. 172. 215. ajoutez les Merides de l'Intervalle proposé ; ainsi la XIX<sup>e</sup>. ou la 2<sup>e</sup>. Octave de la Quinte contient 111'. Merides ; & pour avoir leurs Sous-octaves, de ces mêmes nombres ôtez les Merides de l'Intervalle proposé ; ainsi la sous-11<sup>e</sup>. ou la 2<sup>e</sup>. Sous-octave de la Quinte contiennent 61. Merides.

Pour éviter l'embarras des grands nombres, on designera les Octaves aigues par 1 +. 2 +. 3 +. &c. & les graves par 1 —. 2 —. 3 —. ainsi 2 + 25'. marquera la double Octave aigue de la Quinte, & 2 — 25'. la double Octave grave de la même Quinte.

La II. Table générale est celle des *Eptamerides*. La colonne du milieu contient les Merides réduites en Eptamerides ; les 7 colonnes répondent aux 7 colonnes de la Table précédente.

Pour trouver les Eptamerides que contient cha-

chaque Intervalle du Systême Diatonique, suivez l'une de ces Methodes.

1. Par les Elemens faites comme dans la I. Table; en suposant T. de 51. Eptamerides, t. de 46. & S. de 28.

2. Par les rapports des Sons pris dans la colonne III. du Systême Diatonique, aiez une Table des Logarithmes de *Vlacq*, & y cherchez les Log. des deux nombres qui marquent les rapports des Sons, ôtez le petit Log. du grand, & du Log. restant retranchez les 4 derniers chiffres, les premiers chiffres marqueront les Eptamerides de cet Intervalle. Ainsi pour avoir les Eptamerides de la Quinte dont le raport est 2. 3. prenez leurs Log. 3010300 & 4771213. ôtez l'un de l'autre, le reste sera 1760913. retranchez 0913. restera 176 Eptamerides pour la Quinte. Remarquez que si le premier chiffre des quatre qui sont retranchez étoit 5 ou un plus grand, il faudroit ajoûter 1. aux Eptamerides.

3. Pour trouver les Eptamerides sans les Tables des Logarithmes, 1. Prenez la somme des nombres de la colonne III. du Systême Diatonique qui marque le raport des Sons. 2. Prenez leur difference (il faut que la difference soit au plus  $\frac{1}{2}$  de la somme, autrement il faut suivre la regle ci-après) 3. Multipliez 875 par la difference (si la difference est 1. il n'y a point de multiplication à faire.) 4. Divisez 875 ou le produit de la multiplication par la somme, le quotient donnera les Eptamerides. Exemple, la Quarte a pour raport 3. 4. 1°. la somme est 7. 2°. la difference est 1 = 3°. le produit 875 par 1. est encore 875. 4°. 875 divisé par 7 donne 125. Eptamerides pour la Quarte. Si

Si la difference est plus de  $\frac{1}{2}$  de la somme, partagez l'Intervalle en deux ou trois &c. autres Intervalles ; cherchez les Eptamerides de chaque Intervalle , la somme donnera les Eptamerides de l'Intervalle proposé. Pour avoir, par exemple, les Eptamerides d'une Sixte majeure dont le raport des Sons est 3. 5. divisez ce raport en 3. 4. 5. cherchez comme ci-dessus les Eptamerides du raport 3. 4. qui sont 125. & celles de 4. 5. qui sont 97. la somme 222 sera le nombre des Eptamerides de la Sixte majeure.

Autrement multipliez le plus petit nombre par 2. 4. 8. 16. 32. &c. en sorte que la difference de ce produit au plus grand, soit plus petit que  $\frac{1}{2}$  de leur somme, & cherchez par la premiere regle les Eptamerides, qu'il faut ajoûter ou ôter de 301. 602. 903. 1204 &c. la somme ou le reste donnera les Eptamerides de l'Intervalle de ces deux Sons. Exemple, soit le raport des Sons 2. 15. je multiplie le plus petit 2 par 8. le produit est 16. Je cherche par la premiere regle les Eptamerides de 15. 16. qui sont 28 que j'ôte de 903. reste 875. Eptamerides pour le raport des sons de 2. 15.

Pour trouver les Eptamerides des Octaves aigues & graves des Intervalles marquez dans la Table, il faut faire à proportion comme dans la I. Table, en ajoûtant ou ôtant les Eptamerides des nombres 301. 602. 903. &c.

Remarquez que quoique les Eptamerides ne marquent pas dans la derniere exactitude les Intervalles, l'erreur n'en est pas sensible dans la pratique, puisqu'elle ne peut être au plus que d'une demi-Eptameride, qui n'est que 1 vibration sur 870 vibrations d'un Son, ou d'une

ne

ne ligne sur une corde d'instrument de  $7\frac{1}{4}$  pieds. Et pour contenter les plus scrupuleux, nous subdiviserons les Eptamerides en 10 parties, que nous appellerons *Decamerides*, que nous séparerons des Eptamerides par un Point; ainsi nous dirons que le Comma contient 5. 4. Eptamerides, c'est-à-dire 5 Eptamerides, & 4 Decamerides, ou simplement 54 Decamerides.

Pour trouver les Decamerides d'un Intervalle, servez-vous de la 2<sup>e</sup>. Methode ci-dessus: mais ne retranchez que les 3 derniers chiffres. L'erreur, en se servant des Decamerides, ne peut être au plus que de 1 vibration sur 8686 vibrations, ou de  $\frac{1}{12}$  ligne sur une corde de 5 pieds.

La III. Table générale est celle des *Rapports des Sons* avec le Son fondamental, c'est-à-dire celle qui marque combien les Sons éloignent les uns des autres d'une Eptameride, font de vibrations pendant que le Son fondamental, c'est-à-dire l'UNISSON, ou l'UT, fait 10000 vibrations.

Cette Table est aussi divisée en 7. colonnes, qui répondent aux colonnes des Tables précédentes. On peut trouver les Nombres de cette Table par l'une de ces Methodes.

1. Aiez la Table des Logarithmes de *Ulacq*, & cherchez successivement dans les Logarithmes 0010000. 002000 &c. vous trouverez tous les nombres de la III. Table générale.

2. Les Nombres de cette Table ont 5 chiffres; mais si on n'en veut supposer que 4. comme il suffit pour la pratique, vous les trouverez de cette maniere par les Eptamerides, pour-

vû qu'elles ne passent pas 150. ou la moitié de l'Octave. 1. de 875 ôtez les Eptamerides proposées pour avoir la difference. 2. à 875 ajoutez les mêmes Eptamerides pour avoir la somme. 3. à la somme ajoutez 000. & la divisez par la difference, vous aurez le raport de l'Intervalle proposé.

Si les Eptamerides sont plus grands que 150. & moindres que 301. 1. ôtez ces Eptamerides de 301. 2. cherchez le raport du reste comme ci-dessus. 3. divisez 2000000 par ce raport trouvé, le quotient donnera le raport des Eptamerides proposées.

3. Pour réduire les Nombres de la III. colonne du Système Diatonique en ceux de la III. Table, 1. au plus grand nombre ajoutez 0000. 2. divisez ce nombre par le plus petit, le quotient donnera le nombre juste ou approchant qui lui répond dans la III. Table; ainsi le raport de la Quinte étant 2. 3. divisez 30000 par 2. le quotient 15000. répond à 14997. qui en est fort approchant; car la difference n'est que 3 sur 15000. ou 1 sur 5000 vibrations ou  $\frac{1}{5000}$  d'Eptameride, ce qui est absolument insensible.

Pour avoir les Octaves aigues des nombres qui sont dans la III. Table, il faut multiplier les nombres de cette Table par 2. 4. 8. 16. 32. 64. & pour avoir les Octaves graves, il les faut diviser par ces mêmes Nombres.

Si quelqu'un veut avoir les Nombres de la III. Table, qui conviennent aux Decamerides, qu'il prenne la difference de deux Nombres voisins; qu'il multiplie cette difference par les Decamerides, & qu'il retranche le dernier chiffre; qu'il ajoute enfin le reste au plus

pe-

petit des 2 Nombres voisins ; ainsi le Nombre qui convient au Comma , qui est de 5. 4, ou de 5 Eptamerides plus 4 Decamerides , est 10125.

La IV. Table générale est celle des *Noms des Sons* ; qui sont éloignez les uns des autres d'une Eptameride.

Pour comprendre aisément l'artifice de ces noms , il faut remarquer , 1. que les Sons des 7 Intervalles ordinaires du Système Diatonique sont designez par les 7 Consonnes P. R. G. S. B. L. D. qu'on a préferéz à d'autres , parce que ces lettres en Italique ont plus de raport avec les Notes de la V. Table. Aux 3 premières Consonnes on ajoute la voielle A , & aux 4 dernières la voielle O. enforte que les noms des Notes du Système Diatonique sont PA, RA, GA, SO, BO, LO, DO, PA, qui répondent aux anciens UT, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, UT, avec cette différence , \* que le changement de Voielles , dans les Noms de nôtre Système, marque le Semiton majeur, comme GA, SO, & DO, PA.

2. Pour marquer les 7 Sons éloignez de Merides en Merides , & qui sont compris entre-deux des Sons précédens , je me sers des 7 Voielles, a, e, ε, i, o, u, ɤ, que je mets d'ordre ; mais les Consonnes ne s'éloignent du principal Son que de 3. merides. Dans ces Voielles, e se prononce comme é, & ε se prononce comme eu ; ɤ se prononce comme ou ; afin de distinguer plus aisément ces 7. Voielles. Les Etrangers pourront donner à ces deux

S 2

voiel-

\* Voyez la Section VII.

412 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
voielles des Sons qui conviennent à la pronon-  
ciation de leur Langue.

L'on voit par là que les Sons compris dans  
les Semitons GA, so, & DO, PA, ont double  
nom.

3. Pour marquer les autres noms éloignez  
de ceux-ci de 1, 2, ou 3 Eptamerides, je me  
fers des consonnes suivantes *c. l. n. r. f. t.* écrites  
en petits caractères Italiques, & qui répon-  
dent aux Eptamerides de la I. Table.

Les noms des Octaves aiguës de la Table,  
sont les mêmes précédés des mots \* *sem. bis*,  
*ter, quater, quin. sex*, &c. & ceux des Octa-  
ves graves sont précédés par les mots *sub, sub-*  
*bis, subter, subquat.* &c.

Si l'on veut marquer les noms des Sons jus-  
qu'aux Decamerides, il faut ajouter les voiel-  
les *a, e, i, o, u*, lorsqu'on veut ajouter 1, 2,  
3, 4, 5, Decamerides, & *ü, ë, ï, ö, ù*, lorf-  
qu'on les veut ôter.

De sorte que par nôtre Systême général, il  
n'y a point de Son qui n'ait son nom propre,  
qu'on connoitra, si on en fait le rapport au  
Son fondamental PA.

Par les noms de nôtre Systême général, on  
ôte les équivoques qui se trouvent dans les au-  
tres Systêmes; car la Quinte qui est marquée  
par SOL, signifie tantôt la Quinte tempérée &  
tantôt l'exacte; & dans nôtre Systême l'une est  
bo & l'autre bor.

La V. Table est celle des *Notes* ou des ca-  
ractères de tous les Sons, d'Eptameride en Ep-  
tameride.

Pour

\* Voyez la Planche III. & la Table de la Sec-  
tion IX.



Pour comprendre aisément toutes ces Notes, il faut y distinguer 1°, le corps qui est un O<sup>r</sup> 2°, la queue, qui est en bas dans les Notes PA, RA, GA. & en haut dans les autres Notes. De plus ces queues sont tantôt devant & tantôt après le corps. 3°, les têtes qui sont des continuations de la queue, & qui en sont au plus le tiers. Ces têtes sont dans les Notes des Intervalles pairs II. IV. VI.

Les Notes des sept principaux Sons ont la queue droite ; les 3 Merides au dessous de ces Sons ont la queue courbée à gauche, & les 3 Merides au dessus de ces mêmes Sons l'ont courbée à droite.

La Note la plus proche de la principale a trois crochets : la 2<sup>e</sup> en a deux ; & la 3<sup>e</sup> en a un. Les Notes qui ont un crochet, répondent aux Diesis & aux *b mols* des noms du Système Diatonique. Voyez la Table des Notes pour la Musique. Planche II.

Pour exprimer 1, 2, ou 3 Éptamerides qu'il faut ôter des Merides, mettez 1, 2, ou 3 petits points à gauche de la queue ; & pour celles qu'il faut ajouter, mettez ces petits points à droite de la queue.

Il y a plusieurs manieres d'exprimer les Octaves des Notes de cette Table.

\* 1: On peut marquer 4 Octaves de cette maniere. L'Octave moienne par les Notes simples ; la premiere Octave aigue par un trait sous le corps de la Note ; la premiere Octave grave par un trait au travers du corps ; & la 2<sup>e</sup> Octave grave par un trait au dessus du corps. Voyez les Notes sans clefs.

S 3

2. En

\* Voyez dans la Planche II. la Table des Clefs.

2. En mettant les marques des Octaves que nous appellerons Clefs, la clef de l'Octave moienne est O. Pour marquer la 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup>, &c. Octaves aigues, nous mettons ces chiffres 1, 2, 3, 4, &c. dans la Clef O. La clef des Sous-Octaves ou des Octaves graves est D, dans laquelle on met 1, 2, 3, &c. pour marquer la premiere, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, &c. Sous-octave. D sans chiffre, est la même chose qu'avec 1. Voiez la *Table des Clefs des Octaves*. Planche II.

3. Si l'on met des Notes sur une ou plusieurs lignes paralleles, en mettant une des précédentes Clefs sur une des lignes, par cette Clef l'on connoitra l'Octave des Notes de la ligne sur laquelle elle est; & par raport à cette Octave l'on connoitra les autres.

4. Quelque clef que l'on marque, elle est toujours par rapport au Son fondamental: ainsi O est la clef de l'Octave dont PA est le c, SOL, UT, ou le ton de Chapelle ou d'Opera. Mais ce Son est éloigné du Ton fixe d'une certaine quantité, que nous marquerons par une seconde Clef, mise sur la précédente. O marque que le Son fondamental est au dessus du Son fixe; & D au dessous. De plus dans cette Clef sera marqué en Merides & Eptamerides l'Intervalle du Son fondamental au Son fixe. Voiez l'exemple pour la Musique dans la Section VIII.

## SECTION IV.

*Division & usage de l'Echometre général.*

\* **L'**ECHOMETRE est une regle sur laquelle sont plusieurs lignes divisées, qui servent d'Echelles pour mesurer la durée des Sons, & pour trouver leurs Intervalles & leurs Rapports: nous allons marquer leur division; & ensuite nous donnerons leurs usages.

La 1<sup>re</sup> Echelle *AB* est le *Chronometre* de *M. Loulié*. Pour le diviser, soit *A* l'extrémité de la regle; prenez *AC* de 3 pieds 8 $\frac{1}{2}$  lignes de *Paris*, qui est la longueur du Pendule simple à secondes (l'on pourroit prendre 3 pieds justes sans erreur sensible) divisez *AC* en 36 parties égales; continuez les divisions en *CB*, vous aurez le *Chronometre* de *M. Loulié* divisé en pouces universels.

La 2<sup>e</sup> Echelle *DE*, est nôtre *Chronometre*. Prenez sur la 1<sup>re</sup> Echelle *AB*, 1. 4. 9. 16. 25. 36. 49. 64. &c. pouces, & portez ces Intervalles de l'extrémité *D* de la regle vers *E*. Marquez sur ces divisions les nombres pairs, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, &c.

2. Divisez le premier pouce de la ligne *AB* en quarts, & portez les Intervalles  $\frac{1}{4}$ ,  $1\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $3\frac{1}{4}$ ,  $4\frac{1}{4}$ ,  $5\frac{1}{4}$ ,  $6\frac{1}{4}$ ,  $7\frac{1}{4}$ , &c. après les divisions des nombres pairs à commencer par l'extrémité *D*, marquez sur ces nouvelles divisions, les nombres impairs, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, &c. vous aurez nôtre premier *Chronometre* di-

S 4

vi-

\* Planche II.

416 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
visé en *douzièmes parties de seconde de temps.*

3. Dans chacune de ces parties précédentes prenez à droite  $\varepsilon \gamma$  de  $\frac{1}{4}$  de pouce, & divisez le reste  $\delta \varepsilon$  en 5 parties égales aux points 1, 2, 3, 4. Divisez  $\frac{1}{4}$  pouce en 25 petites parties égales : prenez 1 petite partie, & la portez après 1, & marquez  $\kappa$  : prenez 4 petites parties & les portez après 2, & marquez  $\lambda$  : prenez 9 petites parties & les portez après 3, & marquez  $\mu$  : enfin prenez 16 petites parties, & les portez après 4, & marquez  $\nu$ . Ces quatre points  $\kappa$ ,  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ , diviseront  $\delta \gamma$  en 5 parties ; \* faisant la même chose dans les autres intervalles, nous aurons les divisions de nôtre second Chronometre en *tierces de temps.*

La 3<sup>e</sup> Echelle  $GH$  est nôtre *Monochorde général.* Pour la diviser, 1. Prenez  $GK$  égal à  $AC$ , ou de 36 pouces universels, divisez  $GK$  également en  $L$ ,  $GL$  en  $M$ ,  $GM$  en  $N$ , &  $GN$  en  $O$ .

2. Faites une échelle égale à  $KL$ , divisée en 1000 parties.

3. Prenez dans la III. Table *du Rapport des Sons*, les 43 nombres de la colonne du milieu (desquels retranchez le premier chiffre 1, & le dernier) vous aurez les Nombres qui serviront à diviser le Monochorde en Merides.

4. Sur l'échelle prenez avec un compas les parties marquées par ces Nombres & les portez de suite de  $L$  vers  $K$ .

5. Doublez chacune de ces parties, & les portez de  $K$  vers  $H$ .

6. Prenez la moitié de ces 43 nombres, vous aurez une seconde Table, avec laquelle & la  
pré-

\* Voyez la Demonstration pag. 419.

précédente échelle vous diviserez  $ML$  aussi en 43 parties.

7. Prenez la moitié des nombres de cette seconde Table, vous diviserez de même  $NM$  en 43 parties.

8. Enfin vous continuerez de même pour diviser  $ON$  en 43 parties. Alors vous aurez le Monochorde général divisé en Merides.

9. Ecrivez de suite les nombres 0. 1. 2. 3. 4. &c. Merides sur les divisions à commencer par la première qui se trouvera vers  $H$ .

10. Enfin divisez chaque Meride en 7 parties égales, vous aurez notre Monochorde général divisé en Merides & Eptamerides, & chaque Eptameride pourra être supposée divisée en 10 Decamerides.

La 4<sup>e</sup> Echelle  $PQ$  est le Pendule qui sert à trouver le Son fixe.

Prenez  $PR$  égale à  $GK$  du Monochorde, ensuite portez les divisions de  $KH$  en  $RQ$ , & de  $KO$  en  $RS$ ; mais de deux divisions il n'en faut prendre qu'une; marquez 0 au point  $R$ , & 1, 2, 3, 4, &c. Merides à droite vers  $Q$  pour les Sons plus graves que le Son fixe; & à gauche vers  $P$  pour les Sons plus aigus, vous aurez le Pendule divisé par Merides & Eptamerides dont nous donnerons l'usage dans la Section XII.

La 5<sup>e</sup> Echelle  $TV$  marque les Intervalles des Sons en Merides & Eptamerides, & en Intervalles du Système Diatonique.

Prenez  $TV$  à discretion que vous diviserez également en 100 Merides, & chaque Meride en 7 Eptamerides, que l'on peut supposer divisées en 10 Decamerides.

S 5

Vous

Vous marquerez 1, 2, 3, 4 &c. aux divisions des Merides ; & de l'autre côté vous marquerez les Intervalles Diatoniques f. S. t. T. 3. III. 4. IV. 5. V. 6. VI. 7. VII. VIII. &c. aux divisions des Merides & Eptamerides prises dans les marques ( ) ou [ ] de la Table I. des Merides & Eptamerides.

La 6<sup>e</sup> Echelle *XY* marque le *Raport des Sons*.  
 1. Prenez 100 petites parties de la ligne *TV*. Portez-les autant de fois que vous pourrez de *X* en *T*. 2. Faites une échelle de ces 100 parties divisée en 1000 ou 10000. 3. Prenez dans la Table des Logarithmes de *Ulacq*, les Logarithmes depuis le nombre 100 jusqu'au nombre 500. en retranchant les 2 premiers chiffres & les 2 derniers des Logarithmes. 4. Avec cette Table & cette échelle divisez la ligne *XY*, comme nous avons fait *LK*. de l'Echelle III.

## U S A G E S.

I. Pour regler la durée d'un Son ou d'une mesure de Musique, l'on se sert du mouvement de la main ; mais pour marquer exactement le temps que l'on employe à faire ce mouvement, il faut avoir un Pendule simple qu'il faut allonger ou raccourcir jusqu'à ce que chacune de ses vibrations soit isochrone, ou d'une durée égale au mouvement de la main ; ensuite mesurez la longueur de ce Pendule depuis le point de suspension jusqu'au centre de la bale. Si vous vous servez de la I. Echelle, vous aurez la longueur de ce Pendule en pouces universels du Chronometre de M. Louldé. Si vous vous servez d'un côté de l'Echelle II, vous aurez cette longueur en douzièmes parties

ties d'une seconde; & de l'autre côté vous l'aurez en tierces de temps. Enfin si vous vous servez de l'Echelle V, vous aurez sa longueur en Merides & Eptamerides qui seront d'usage pour trouver le Son fixe. \*

† Pour démontrer la manière dont nous avons divisé les Echelles  $AB$  &  $DE$ , il faut savoir que les longueurs  $AC$ ,  $DF$  qui sont de 3 pieds  $8\frac{1}{2}$  lignes marquent celle d'un Pendule simple à secondes; que les longueurs des Pendules étant comme les quarrés des temps qu'ils emploient dans chaque vibration, pour avoir un Pendule de  $\frac{1}{2}$  de seconde, il faut prendre  $\frac{1}{4}$  de  $AB$ , c'est-à-dire, un pouce, & par conséquent prenant 0. 1. 4. 9, &c. pouces, l'on aura les longueurs des Pendules de 0. 1, 2, 3, &c. sixièmes de secondes, ou de 0. 2, 4, 6, &c. douzièmes de seconde. A ces nombres ajoutez d'ordre ceux-ci  $\frac{1}{4}$ ,  $1\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{4}$ ,  $3\frac{1}{4}$ , &c. les sommes sont encore des quarrés; car par exemple  $9 + 3\frac{1}{4} = 12\frac{1}{4} = \frac{49}{4}$  est quarré, dont la racine est  $\frac{7}{2}$  sixième de seconde ou 7 douzièmes. Enfin appellant  $aa$  la longueur  $D\delta$  d'un Pendule déjà marquée, la différence  $\delta\gamma$  sera  $2a + 1$ , ôtant 1 (c'est-à-dire  $\frac{1}{4}$  pouce) le reste  $2a$ , étant divisé par 5 & multiplié par  $n$ , donnera  $\frac{2an}{5}$ ,

or  $aa + \frac{2an}{5} + \frac{nn}{25}$  qui donne les divisions des tierces est un quarré dont la racine est  $a + \frac{n}{5}$  Tierces. Au lieu de  $n$  l'on mettra 1, 2, 3, 4; & au lieu de  $nn$ , on mettra 1. 4. 9. 16.

‡ II. Pour diviser un Monochorde en Merides  
S 6. des

\* Voyez la Section XII. † Echelle II. ‡ Echelle III.

des & Eptamerides , mettez le bout *G* contre le Chevalet immobile qui est vers la touche , & voyez sur quelle Meride ou Eptameride de la ligne *GH* tombe l'autre Chevalet immobile ; alors marquez successivement sur le Monochorde les Eptamerides , & de 7 en 7. vous aurez les Merides sur vôtre Monochorde que vous cetterez jusqu'à l'Octave 43 , ou jusqu'à la double Octave 86. Enfin vous écrirez sur les divisions convenables les noms des Intervalles du Systême que vous aurez en vûc.

Si vous ne voulez un Monochorde que pour un Systême particulier, comme pour celui des Grecs , ou pour un Instrument comme le Clavecin, ayez une Table en Merides & Eptamerides des Intervalles de ce Systême , ou des Touches de cet Instrument, & marquez sur le Monochorde, des points aux nombres des Merides & Eptamerides qui conviennent.

Par la même Methode vous diviserez avec l'Echelle III. le manche d'une Basse de Viole, d'un Theorbe , d'une Guitarre , de la Trompette marine, pour regler la situation de leurs touches. On divisera aussi de même les Instrumens à vent pour regler les intervalles de leurs trous.

III. Pour comparer les rapports des Sons avec leurs Intervalles , servez-vous des Echelles V. & VI.

Si vous connoissez le rapport de deux Sons, mettez les 2. pointes d'un compas sur les 2. nombres (pris dans l'Echelle VI.) qui marquent ce rapport ; mettez une pointe du compas sur le bout *T* de l'Echelle V. l'autre pointe marquera l'Intervalle de ces deux Sons , d'un côté en Merides , en Eptamerides , & si l'on veut



veut en Decamerides; & de l'autre côté en Intervalles du Systême Diatonique.

Si les nombres qui marquent le raport de ces Sons, étant entre 50 & 100, ne sont pas dans l'Echelle VI. prenez leur moitié ou leur double, alors vous les trouverez dans cette Echelle.

Si vous connoissez l'Intervalle des deux Sons en Merides & Eptamerides, ou un Intervalle du Systême Diatonique, pour connoître le raport de ces Sons, prenez avec le compas cet Intervalle sur la ligne V. portez une pointe du compas sur tel nombre qu'il vous plaira, l'autre pointe donnera le second nombre de ce raport.

Si l'on veut avoir ce Raport en nombres entiers les plus petits, mettez d'abord la pointe sur 10, & voyez si l'autre pointe tombe sur une dixaine; si elle n'y tombe pas, mettez la premiere pointe successivement sur 20, 30, &c. jusqu'à ce que la 2<sup>e</sup> pointe tombe sur une dixaine; si elle n'y tombe pas, parcourez de suite 11. 12. 13. 14. &c. jusqu'à ce que la seconde pointe tombe sur cette division, ou sur une demie juste. Les 2 premiers nombres sur lesquels les pointes du compas tomberont juste, marqueront le raport des deux Sons dans les plus petits nombres; mais si elle tomboit sur une demie ou un tiers ou un quart, il faudroit doubler, tripler, ou quadrupler les deux nombres.

\* Remarquez que le Chronometre de M. *Loulié* ne marque point la durée des Notes par un raport connu avec le temps d'une seconde,

S 7

par-

\* Echelle I.

422 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
parce que les temps des vibrations de son Pendule sont la plupart incommensurables avec une Seconde.

Le Sieur *Chapotot*, un des plus habiles Ingenieurs pour les Instrumens des Mathematiques à *Paris*, a des *Echometres* divisez dans toutes les circonstances ci-dessus. Il en a fait un de cuivre pour S. A. R. Mr. le Duc d'*Orleans*.

## SECTION V.

*Application du Systême & de l'Echometre général à tous les Systêmes de Musique.*

DANS tous les Systêmes de Musique, les Sons sont exprimez ou par les rapports de leurs vibrations, ou par les différentes longueurs de la corde d'un Monochorde qui rendent les Sons du Systême proposé; ou enfin par les rapports des Intervalles d'un Son aux autres; il s'agit de réduire les expressions de tous ces Systêmes dans les Intervalles du Systême général; afin 1. de connoître si les Intervalles selon le Systême proposé, forment des consonances ou des dissonances justes, & si elles n'en forment pas de justes, en connoître les différences. 2. Trouver le rapport de chaque Son de ce Systême au Son fondamental. 3. Marquer les noms ou les notes tant du Systême Diatonique ordinaire, que du Systême général, qui conviennent aux Sons du Systême proposé. 4. Chercher les Rapports ou les Intervalles reciproques d'un Son de ce Systême à tous les autres Sons de ce même Systême.

\* I. Soit proposé le Systême Diatonique exact exprimé par les nombres de la colonne *A*, qui marquent le raport des Sons de ce Systême au Son fondamental. 1. Ajoûtez 0000. à chacun de ces nombres, & les divisez par le plus petit 24, les quotiens donneront les nombres de la colonne *B*. Par exemple à 27 ajoûtez 0000, vous aurez 270000 qu'il faut diviser par 24, le quotient sera 11250 qu'il faut mettre dans la colonne *B*, & ainsi des autres, qui sont tous dans les mêmes rapports que ceux de la colonne *A*. 2. Cherchez dans la Table III. † du Systême général les nombres de la Colonne *B*, ou ceux qui en approchent le plus, comme 11246 au lieu de 11250, vous aurez les nombres de la colonne *C*. Remarquez que les différences des nombres *C* aux nombres *B* sont insensibles pour les Sons; car la plus grande difference est 4 sur 11250, ou 1 sur 2812 vibrations, ce qui fait environ  $\frac{1}{4}$  d'Eptameride; ce qui est absolument insensible. 3. Cherchez dans la IV. Table les noms *D* de notre Systême qui répondent aux nombres *C*. 4. Cherchez dans le Systême Diatonique les noms *E*, où vous remarquerez que ces noms n'expriment pas exactement les Sons du Systême proposé *A*; & qu'ainsi le Systême ordinaire n'est pas exact: dans la colonne I. de la Planche I. vous trouverez aussi les Intervalles Diatoniques *F*. 4. Dans la Table I. vous trouverez les Merides & les Eptamerides *G*. 5. Dans la Table II. les Eptamerides *H*. 6. Et dans la Table V. les Notes du Systême général.

Si

\* Voyez la Table suivante. † Planche I.

Si l'on veut examiner en détail toutes les proprieté de ce Systéme Diatonique exact , vous trouverez 1°. que les Elemens ou les Intervalles d'un Son au suivant sont *T, t, S*, marquez dans la colonne *L* ; ce que vous connoîtrez en prenant la difference des nombres de la colonne *H* pour former la colonne *K*. 2°. Que les Intervalles de chaque Son au Son fondamental *PA* ou *UT* sont des Consonances ou Dissonances justes ; car ils sont compris dans les marques ( ) [ ] des Tables générales. 3°. Pour juger si les Intervalles reciproques de quelque Son que ce soit à tout autre Son de ce Systéme , sont des Consonances ou Dissonances justes , suivez les regles marquées dans la Section XI. 4°. On réduira ce Systéme exact en Systéme temperé , en prenant la somme des 5 Elemens *T T T t t* , de la colonne *K* qui sont 245 ; divisez 245 par 5 vous aurez 49 Eptamerides ou 7 Merides pour Ton moyen qu'il faut mettre en la place des Tons majeur & mineur ; alors vous aurez les Intervalles *M* en Merides seules , & les noms *N*. Ces expressions sont les mêmes que celles des colonnes *G* & *D* en ôtant les Eptamerides qui marquent les differences des Intervalles temperés aux Intervalles justes.

\* Par l'Echometre général l'on peut appliquer nôtre Systéme général au même Systéme Diatonique. Car 1. prenez avec un compas sur l'Echelle VI. l'intervalle de 24 à chacun des autres nombres de la colonne *A*, par exemple de 24 à 32 †. Portez les ouvertures du compas sur l'Echelle V. en mettant toujours une

\* Voyez la Planche II. † Ou de 2400 à 3200.

| A                             | B                                         | C                                 | D                             | E                               | F                                     | G                                 | H                               | K                            | L             | M  | N  |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|----|----|
| Système<br>proportion-<br>né. | Nombres<br>dans les<br>mêmes<br>Rapports. | Rapports<br>de la Ta-<br>ble III. | Noms<br>de la<br>Table<br>IV. | Noms<br>de la<br>Colonne<br>IV. | Inter-<br>valles<br>Diatoni-<br>ques. | Mé-<br>des de<br>la Ta-<br>ble I. | Eptam.<br>de la<br>Table<br>II. | Diffé-<br>des<br>Ep-<br>tam. | Ele-<br>mens. |    |    |
| 48                            | 20000                                     | 20000                             | PA                            | UT                              | VIII                                  | 43                                | 301                             | 28                           | S             | 43 | PA |
| 45                            | 18750                                     | 18750                             | DO                            | SI                              | VII                                   | 39                                | 273                             | 51                           | T             | 39 | DO |
| 40                            | 16667                                     | 16672                             | LOI                           | LA                              | VI                                    | 32                                | 222                             | 46                           | t             | 32 | LO |
| 36                            | 15000                                     | 14997                             | BOR                           | SOL                             | V                                     | 25                                | 176                             | 51                           | T             | 25 | BO |
| 32                            | 13333                                     | 13325                             | SON                           | FA                              | 4                                     | 18                                | 125                             | 28                           | S             | 18 | SO |
| 30                            | 12500                                     | 12503                             | GAN                           | MI                              | III                                   | 14                                | 97                              | 46                           | t             | 14 | GA |
| 27                            | 11250                                     | 11246                             | RAS                           | RE                              | II                                    | 7                                 | 51                              | 51                           | T             | 7  | RA |
| 24                            | 10000                                     | 10000                             | PA                            | UT                              | I                                     | 0                                 | 0                               |                              |               | 0  | PA |

pointe sur 0, l'autre pointe donnera les Intervalles en Merides & Eptamerides (18) de la colonne G, aussi-bien que l'Intervalle (4) du Système Diatonique de la colonne F, l'on peut ensuite trouver toutes les propriétés de ce Système, comme nous avons fait dans l'article

ticle précédent. Par cette Méthode l'on peut appliquer le Systême général aux Systêmes d'*Archytas*, d'*Aristoxene*, d'*Eratoſthene*, de *Didyme*, & de *Ptolémée*, &c.

II. Soit proposé un Systême par les différentes longueurs de la corde d'un Monochorde, par exemple, un Systême temperé du Clavecin, exprimé par les nombres *A*. Trouvez les nombres *B* & *C* & les Intervalles en Eptamerides *H* ou en Merides *G*, comme dans l'article I. Prenez leur complément à l'Octave en ôtant de 301 Eptamerides les nombres *H*, vous aurez les nombres *h*, ou ôtant de 43 Merides, les nombres *G*, vous aurez les nombres *g* : avec les nombres *g*, *h*, vous trouverez les autres propriétés du Systême proposé, comme nous avons fait dans la Table précédente.

| A<br>Systême<br>proposé. | B<br>Nombres<br>dans les<br>mêmes<br>Rapports | C<br>Rapports<br>de la<br>Table<br>III. | G<br>Complément<br>en<br>Meri. | H<br>Complément<br>en Eptamerides. | g<br>Intervalles<br>en Merides. | h<br>Intervalles<br>en Eptamerides. |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 810                      | 10000                                         | 10000                                   | 0                              | 0                                  | 43                              | 301                                 |
| 863                      | 10654                                         | 10666                                   | 4                              | 28                                 | 39                              | 273                                 |
| 904                      | 11160                                         | 11169                                   | 7                              | 48                                 | 36                              | 253                                 |
| 967                      | 11938                                         | 11940                                   | 11                             | 77                                 | 32                              | 224                                 |
| 1016                     | 12543                                         | 12531                                   | 14                             | 98                                 | 29                              | 203                                 |
| 1083                     | 13370                                         | 13366                                   | 18                             | 126                                | 25                              | 175                                 |
| 1154                     | 14247                                         | 14191                                   | 22                             | 154                                | 21                              | 147                                 |
| 1212                     | 14963                                         | 14962                                   | 25                             | 175                                | 18                              | 126                                 |
| 1289                     | 15913                                         | 15922                                   | 29                             | 202                                | 14                              | 99                                  |
| 1353                     | 16704                                         | 16711                                   | 32                             | 223                                | 11                              | 78                                  |
| 1448                     | 17877                                         | 17865                                   | 36                             | 252                                | 7                               | 49                                  |
| 1542                     | 19037                                         | 19055                                   | 40                             | 280                                | 3                               | 21                                  |
| 1620                     | 20000                                         | 20000                                   | 43                             | 301                                | 0                               | 0                                   |

III. Soit proposé un Systême par les rapports des Intervalles, par exemple, le Systême Chromatique temperé par les Comma, qui suppose l'Octave divisée en 55 parties ou Comma, dont le Semiton majeur en a 5, le mineur 4, & le Ton 9. Marquez 1°. dans la colonne *A*, les Consonances & Dissonances du Systême Diatonique. \* 2°. Cherchez dans la colonne II. du Systême Diatonique ses Elemens, & prenez 5 Comma pour *S*, & 9 pour *T* & *t*, vous au-

| A.<br>Interval-<br>les Diato-<br>niques. | B<br>Interval-<br>les en<br>Comma. | C<br>Interval-<br>les en Ep-<br>tamerides. | D<br>Interval-<br>les en<br>Merides. |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| VIII                                     | 55                                 | 301                                        | 43                                   |
| VII                                      | 50                                 | 274                                        | 39                                   |
| 7                                        | 46                                 | 252                                        | 36                                   |
| VI                                       | 41                                 | 224                                        | 32                                   |
| 6                                        | 37                                 | 203                                        | 29                                   |
| V                                        | 32                                 | 175                                        | 25                                   |
| IV ou 5                                  | 28                                 | 153                                        | 22                                   |
| 4                                        | 23                                 | 126                                        | 18                                   |
| III                                      | 18                                 | 99                                         | 14                                   |
| 3                                        | 14                                 | 77                                         | 11                                   |
| II                                       | 9                                  | 49                                         | 7                                    |
| 2                                        | 5                                  | 27                                         | 4                                    |
| I                                        | 0                                  | 0                                          | 0                                    |

rez dans la colonne *B* le nombre des Comma qui composent chaque Intervalle. 3°. Divisez 301 Eptamerides qui composent l'Octave en 55 parties égales, le quotient donnera  $5\frac{2}{11}$  pour la valeur d'une de ces parties, par laquelle multipliez les nombres *B*, vous aurez les

\* Planche I.

nombres *C*, qui marqueront les valeurs de ces Intervalles en Eptamerides en negligéant les fractions ; vous les réduirez ensuite en Merides *D*, & enfin vous en conclurrez avec les Tables du Systéme général toutes les autres propriétés comme nous avons fait dans l'article I.

Par une semblable methode on appliquera nôtre Systéme général , 1° au Systéme des *Semitons moyens*, qui suppose l'Octave divisée en 12 Semitons moyens, dont 2 font le Ton : 2°, au Systéme qui divise l'Octave en 19 parties égales, dont 2 font le Semiton majeur & 3 le Ton : 3°, au Systéme qui divise l'Octave en 31 dont 3 font le Semiton majeur & 5 le Ton.

IV. Pour appliquer nôtre Systéme général aux *Systémes des Grecs*, il faut savoir, 1 qu'ils divisoient les Sons en 4 *Tetrachordes* ou *Quartes*, dont les deux du milieu étoient séparés d'un ton majeur ; & pour achever les deux Octaves, ils ajoûtoient un Ton majeur au dessous du Son le plus grave. C'est pourquoi comme dans nôtre Systéme une Quarte contient 18 Merides, les 4 *Tetrachordes* des *Grecs* étoient selon la Table qui est à la page suivante.

Cette Table marque dans la 1<sup>re</sup> ligne l'ordre des *Tetrachordes* : dans la 2<sup>e</sup>, leurs Noms : dans la 3<sup>e</sup>, les Intervalles en Merides & Eptamerides en commençant par le premier *Tetrachorde*. Dans la 4<sup>e</sup>, en ajoûtant 39 Merides, & retranchant autant qu'on a pû l'Octave 43 ; nous avons baissé les Octaves pour les accommoder à l'usage ordinaire. La 5<sup>e</sup>, sont les noms du Systéme nouveau qui conviennent aux Merides précédentes, dans lesquels les  
noms



## TETRACHORDES.

|               | TETRACHORDES.                                     |          |          |          |
|---------------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|               | I.                                                | II.      | III.     | IV.      |
|               | des                                               | des      | des      | des      |
|               | graves                                            | moyennes | separées | aigües   |
| Ton ajouté    |                                                   |          |          |          |
| Merides       | — 7"                                              | 0 . 18,  | 36,, 43  | 61, 79,, |
| ou            | 1—32,, . 1—39 . 14, . 32,, : 39 . 1—14, 1—32,     |          |          |          |
| Noms nouveaux | SubLOl . subDO . GAN . LOl : DO . semGAN . semLOl |          |          |          |
| Noms anciens  | LA . SI . MI . LA : SI . MI . LA                  |          |          |          |

noms sans clefs marquent les sons de l'Octave moyenne, & les noms avec les Clefs *Sub* & *Sem*, marquent ceux de la 1<sup>re</sup> Octave & de la 1<sup>re</sup> Sous-Octave. Enfin la 6<sup>e</sup> contient les noms anciens. 2. A ces Tétrachordes on en a ajouté un après le second, appelé

430 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
 pellé des *Conjointes* qui répond au *b mol* &  
 qui est

TETRACHORDE  
 des *Conjointes*.

$\overset{32''}{\text{LOI}}$      $\overset{7''}{\text{semRAc}}$   
 LA            RE

3. Chaque Tetrachorde est divisé en 3 principales manieres, qui forment les Systèmes Diatonique, Chromatique & Enharmonique. Chacun de ces Systèmes a été divisé différemment par différens Auteurs. Voici une maniere.

*Division de chaque Tetrachorde.*

|                             |   |   |     |            |
|-----------------------------|---|---|-----|------------|
| <i>Système Diatonique</i>   | ○ | 4 | 11" | 18,        |
| <i>Système Chromatique</i>  | ○ | 4 | 7"  | 18,        |
| <i>Système Enharmonique</i> | ○ | 2 | 4   | 18,        |
| <i>Système composé</i>      | ○ | 2 | 4   | 7" 11" 18, |

Ajoutez les Merides & Eptamerides à celles qui marquent les Tetrachordes, vous aurez les Intervalles des 3 Systèmes des *Grecs* selon le P. *Merfenne*\*; à ces Intervalles vous pouvez ajouter les noms & notes anciennes; mais sur tout nos nouvelles qui les expriment exactement. On peut de même appliquer notre Système général à ceux des *Grecs*, selon tel Auteur qu'on voudra.

V.

\* Livre III. des Genres de la Musique, Prop. XIII.

V. *Le Système des Orientaux* qui est suivi par les *Turcs* & par les *Persans*, selon l'Auteur Arabe du Livre *Edouar*, traduit par M. *Petit de la Croix*, Professeur au Collège Royal & Interprete du Roi dans les Langues Orientales, suppose l'Octave divisée d'abord en quinte, & ensuite † par Tons majeurs de cette maniere. *S* est le Son fondamental, auquel il faut ajoûter successivement les Tons majeurs de 51 Eptamerides *ssss*. *R* est son Octave, duquel il faut ôter successivement les Tons majeurs *rrrrr*. *T* est la Quinte, auquel il faut ajoûter les Tons majeurs *tt*, & en ôter *ττττ*, de sorte que l'Octave est divisée en 17 Intervalles, dont les Elemens sont le *Comma* de 5 Eptamerides, & le *Baqya*, ou moitié du Ton mineur de 23 Eptamerides. Nous avons marqué dans la 4<sup>e</sup> colonne le *Baqya* & le *Comma* par b, c.

Pour avoir le Système temperé des *Orientaux*, il faut diviser l'Octave 301 en 17 parties égales, & alors l'on n'aura qu'un Element de  $17\frac{13}{17}$  Eptamerides, dont se forment par addition les Intervalles de ce Système temperé, en négligeant les fractions.

Après avoir trouvé ces Intervalles en Eptamerides, l'on peut avoir par la Table générale les Merides, les Rapports des Sons, leurs noms & leurs notes, selon le Système Diatonique; mais il seroit alors plus à propos de mettre *PA* sur l'une des Notes *d, g, ya, yd, yg*, afin qu'elles s'accordassent plus exactement au Système Diatonique.

Quoi-

† Voyez la Table suivante.

| Noms Arabes<br>des<br>Intervalles. | Gamme<br>des<br>Arabes. | Intervalles<br>en Epra-<br>merides. | Ele-<br>mens. | Système<br>tem-<br>peré. |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| Zylcoul<br>Diapason oc-<br>tave.   | <i>yb</i>               | R 301                               | b             | 301                      |
|                                    | <i>yg</i>               | <i>t</i> 278                        | c             | 283                      |
|                                    | <i>yf</i>               | $\tau$ 273                          | b             | 266                      |
|                                    | <i>ye</i>               | <i>r</i> 250                        | b             | 248                      |
|                                    | <i>yd</i>               | <i>t</i> 227                        | b             | 230                      |
|                                    | <i>yc</i>               | <i>s</i> 204                        | c             | 212                      |
|                                    | <i>yb</i>               | <i>r</i> 199                        | b             | 195                      |
| Zylcoms<br>Diapente<br>quinte.     | <i>ya</i>               | T 176                               | b             | 176                      |
|                                    | <i>y</i>                | <i>s</i> 153                        | c             | 159                      |
|                                    | <i>t</i>                | <i>r</i> 148                        | b             | 142                      |
| Zylarba<br>Diatessaron<br>quarte.  | <i>b</i>                | $\tau$ 125                          | b             | 125                      |
|                                    | <i>g</i>                | <i>s</i> 102                        | c             | 106                      |
|                                    | <i>f</i>                | <i>r</i> 97                         | b             | 89                       |
|                                    | <i>e</i>                | $\tau$ 74                           | b             | 71                       |
| Tanini<br>Ton majeur<br>Baqya      | <i>d</i>                | <i>s</i> 51                         | comma         | 53                       |
|                                    | <i>c</i>                | <i>r</i> 46                         | b             | 35                       |
|                                    | <i>b</i>                | $\tau$ 23                           | baqya         | 18                       |
|                                    | <i>A</i>                | S 0                                 |               | 0                        |

Quoique les *Orientaux* ayent pour Elemens de leur Système le *comma* & le *baqya*, ils ne reconnoissent dans leur Intonation que le *Baqya*, le Ton mineur, & le majeur qu'ils appellent *Tanini*: ils marquent ces 3 Intervalles par *b*, *c*, *d*, suivant lesquels ils divisent les deux quarts & le ton qui forment l'Octave; car à la maniere des *Grecs* ils rapportent leurs Intervalles à la quarte, & partagent la quinte en quarte & ton majeur, & selon les combinaisons de *b*, *c*, *d*, dans la quarte, ils en forment différentes classes dont il y en a 7 de

de Quartes Consonantes, & 9 classes de Quintes aussi Consonantes, les autres classes de Quartes & de Quintes étant dissonantes; & par la combinaison de ces classes Consonantes de Quartes avec celles des Quintes, ils forment 37 principaux modes simples qui ont chacun leur *Mihast* ou corde principale. Ils ont enfin leur maniere de battre la mesure sur deux *Nacarat* ou petites timbales, ou sur le *Dayré* qui est semblable au tambour de basse, par 3 coups de différentes mesures, combinez différemment; mais leur Musique demande un Traité particulier.

VI. Après avoir rapporté quelque Système que ce soit aux Merides & Eptamerides de notre Système général, il est ensuite aisé de diviser un Monochorde selon ce Système, en se servant de notre Echometre général, avec lequel l'on peut aussi trouver les Rapports des Sons, lorsqu'on connoît les Intervalles en Merides & Eptamerides; ou bien l'on peut trouver ces sortes d'Intervalles lorsqu'on fait les Rapports des Sons, comme nous avons expliqué dans la Section III. & dans l'article I, ci-dessus,

## SECTION VI.

*Application du Système & de l'Echometre général aux Voix & aux Instrumens de Musique.*

- I. **P**OUR regler les Sons des Voix & de tous les Instrumens de Musique, on les compare aux Sons d'un Orgue ou d'un
- MEM. 1701. T Cla-

Clavecin, qu'on a tellement réglé, que le Son fondamental UT qui répond à la Clef *C SOL UT*, se trouve moyen entre toutes les Voix possibles, lequel néanmoins est sujet à changer, parce que les Compositeurs de Musique se reglent sur l'étendue des Voix, dont ils ont dessein de se servir pour executer leurs pieces; dans la suite ces voix ayant changé, ils ont mieux aimé hausser ou baisser les Instrumens, que de changer les notes de ces pieces en les transposant.

\* Dans la premiere Ligne sont marquées les Octaves dans l'étendue desquelles sont renfermez les Sons de tous les Instrumens de Musique, savoir depuis la 3<sup>e</sup> Sous-octave jusqu'à la 3<sup>e</sup> Octave.

Dans la seconde sont représentées les Touches du Clavecin, dont les noires marquent les Sons du Système Diatonique, & les blanches leurs dièses ou leurs *b mols*, & elles forment toutes ensemble le Système Chromatique des Musiciens.

Dans la troisieme nous avons mis sous chaque touche noire les noms ordinaires que les Musiciens leur donnent; ainsi la touche du Son fondamental, qui est la premiere de l'Octave moyenne s'appelle *C SOL UT*. Dans ces trois expressions les Musiciens, & sur tout les Facteurs marquent les touches, ou les cordes, ou les Sons qu'elles forment, par ces Lettres C, D, E, &c. dans lesquelles B ou *B quarre* sert pour la derniere touche de chaque Octave, & *b*, ou *b mol* pour la blanche qui precede.

Pour

\* Planche III.

Pour distinguer les Octaves on a écrit les Lettres de la premiere sous-Octave en Majuscule, celles de la seconde sous-Octave en Majuscule double, la troisiéme, triple. L'Octave moyenne en Lettre Minuscule, la seconde Octave en Minuscule double, &c.

Les premiers noms SOL, LA, SI &c. de chaque Octave servent lors qu'on se sert du *b mol*, & les seconds noms UT, RE, MI, &c. servent lors qu'on se sert de B *quarre*. Ainsi la premiere touche de chaque Octave C SOL UT, signifie que les Facteurs apellent cette touche C, les Musiciens lors qu'ils chantent ou jouient en *b mol*, l'appellent SOL; & lors qu'ils chantent ou jouient en B *quarre*, ils l'appellent UT.

Dans la quatrième ligne nous avons mis une portée qui contient toutes les Notes qui marquent les touches noires & blanches du Clavecin ou du Système Chromatique des Musiciens; on a ajouté des Notes pour une partie de la troisiéme sous-Octave & de la seconde Octave. Les Clefs vers le milieu de la portée ont été mises par rapport aux parties des Voix chantantes, A, D, H, T, C, B. vis-à-vis le point qui marque le milieu.

Dans la cinquième ligne sont les trois Clefs de la Musique ordinaire; savoir de F UT FA, de C SOL UT, & de G RE SOL. L'on voit que ces Clefs n'ont pas assez d'étendue, puisque dans les portées on est obligé d'ajouter de nouvelles lignes vers les Octaves les plus graves & vers les plus aigues.

La sixième ligne contient en détail les noms anciens du Système Chromatique des Musiciens, c'est-à-dire les noms des Notes en B

*quarre* avec leurs dièses ou leurs *b mols*.

Dans la septième sont les Clefs des noms nouveaux de notre Système\*, c'est-à-dire les syllabes qu'il faut ajouter aux noms nouveaux des Sons, pour distinguer leurs Octaves. L'Octave moyenne n'a point de Clef; ainsi PA signifie le P-A de l'Octave moyenne ou le Son fondamental: Sem BO, signifie le BO de la première Octave, ou l'Octave de BO: Subter-*de*, le *de* de la 3<sup>e</sup>. sous-Octave, ou la 3<sup>e</sup>. sous-Octave de *de*.

La huitième contient les noms nouveaux de notre Système †.

Dans la neuvième ligne sont les Clefs des Notes nouvelles, expliquées dans la Section III, Table V.

Dans la dixième sont les Notes nouvelles dont les Octaves sont distinguées par les clefs qui sont dessus, ou par les manières exprimées dans la Section VIII. & dans la Table des Clefs, Planche II. Ces Notes sont tirées de la Table V. Planche I.

Dans la onzième sont les Clefs des Intervalles en Merides. Voyez la Section III, Table I.

Dans la douzième sont les Merides qui marquent les Intervalles des Sons de chaque Octave au 1<sup>er</sup>. Son de la même Octave.

Pour avoir les Intervalles de tous les Sons au Son fondamental, qui est le premier de l'Octave moyenne, multipliez la Clef par 43; ainsi l'Intervalle 2 + 18 au Son fondamental, est 86 + 18 ou 104 Merides, le Sous-In-

\* Voyez la Section III. Table IV.

† Table IV. de la Planche I.



intervalle 3 — 36 est 129 — 36 ou 93.

Les parties de toutes ces Lignes se répondent tellement les unes aux autres, que l'on peut avoir l'expression de tous les Sons du Système Chromatique des Musiciens dans l'étendue de cinq ou six Octaves, selon telle maniere que l'on voudra; & ainsi l'on peut appliquer aux trois expressions de notre Système tous les Sons du Clavecin, & par conséquent tous les Sons qui s'y rapportent, comme nous allons montrer. On auroit pu encore y appliquer les mêmes Intervalles en Eptamerides, & par le rapport des vibrations; mais ce que nous avons mis suffit, & les \* Tables générales peuvent suppléer au reste.

II. Pour exprimer tous les Sons sur un Monochorde, ayez un Monochorde monté de plusieurs cordes, dont la plus longue soit égale à celle d'un Archiluth, & la plus courte à la chanterelle des Dessus de Violons. L'on peut mettre une corde pour une ou pour deux Octaves, mais il faut qu'une des cordes rende le Son fondamental PA ou UT de la Clef C SOL UT. Ensuite avec l'Echometre divisez votre Monochorde le long de chaque corde en Merides & Eptamerides, vous aurez un Monochorde général propre pour accorder tous les Instrumens de Musique. Au lieu de diviser le Monochorde, l'on peut avoir une regle divisée en Merides ou Eptamerides, qu'on peut appliquer aux cordes de toutes sortes d'Instrumens à cordes, qui serviront alors de Monochorde.

III. La Table de la Planche III. exprimée  
T 3 dans

\* Planche I.

dans les douze premieres Lignes, sert à marquer aux yeux l'étendue des Voix & des Instrumens pour les différentes parties de Musique, sur les notes de l'ancien & du nouveau Système, & le Monochorde général sert à les faire sentir à l'oreille.

Le reste de la Planche marque les termes & les étendues des Voix & des Instrumens en les comparant aux Sons de la Table précédente. Ces Voix & ces Instrumens sont partagez en deux classes. La premiere comprend les Voix & les Instrumens à vent, & la seconde les Instrumens à cordes.

IV. Les Voix sont en général divisées en 6 parties, savoir 1°. le 1<sup>er</sup>. Dessus ou le haut Dessus, marqué *A. A. a a.* 2°. le 2<sup>e</sup>. Dessus ou le bas Dessus *D. D. d. d.* 3°. la Haute-contre *H. H. h. b.* 4°. la Taille ou la Haute-taille *T. T. t. t.* 5°. la Basse-taille sous laquelle quelques-uns comprennent le Concordant *C. C. c. c.* 6°. la Basse-contre ou simplement la Basse *B. B. b. b.* Outre ces Lettres nous avons mis des points pour marquer la Note du milieu de chaque Partie.

Comme les Musiciens ne sont pas d'accord des termes & de l'étendue précise de chaque partie, puisque ceux qui chantent ont chacun leur étendue particuliere, après avoir eu le sentiment de plusieurs des plus habiles, nous avons marqué chaque partie par quatre lettres, dont les Majuscules comme *A, A*, marquent les termes où cette partie peut descendre, savoir au moins en *A*, au plus & en passant en *A*, car tous les Auteurs les font descendre les uns plus les autres moins entre ces termes *A, A*. Les lettres Minuscules *a, a*, marquent les

les termes où cette partie peut monter dans les mêmes circonstances : à l'égard des Compositeurs de Musique ils donnent souvent une étendue moindre, afin qu'une partie ne se confonde pas avec sa voisine : Ils distinguent ces parties par les positions des Clefs, qui sont dans la portée de la 4<sup>e</sup>. ligne \* *des Notes anciennes*, vis-à-vis les points qui marquent les milieux *des Voix*. Dans notre Système nous distinguons les parties comme nous le marquons dans *l'exemple pour la Musique* Section VIII. ou comme dans l'Addition à la Section VI.

† Nous avons ajoûté des exemples de Voix de la Musique du Roi qui sont d'une étendue extraordinaire, nous les avons marquées par chiffres répétez quatre fois : les deux chiffres du milieu marquent l'étendue où ces Voix peuvent faire des tenues, & les deux chiffres extrêmes marquent où elles peuvent aller en passant ; nous les avons marquées dans les circonstances où elles se trouvent à présent.

V. On est plus maître des Instrumens à vent que de la Voix humaine ; c'est pourquoi on leur donne des termes & des étendues plus fixes, qui se divisent généralement dans les cinq parties suivantes. 1°. Le Dessus exprimé par D. d. d. 2°. La Haute-contre H. h. b. 3°. La Taille T. t. z. 4°. La Quinte Q. q. q. 5°. La Basse B. b. b. La premiere lettre Majuscule marque le Son le plus bas de l'Instrument ; la 2<sup>e</sup>. lettre qui est Romaine marque le Son le plus haut, où l'on peut encore faire des tenues ; & la 3<sup>e</sup>. lettre qui est Italique

T 4

mar-

\* Planche III. † Planche II.

marque où l'Instrument peut monter en passant. Comme les Sons ne sont marquez en détail que jusqu'à RA (RE) de la 2<sup>e</sup>. Octave, on a marqué le nombre des Merides sur les lettres des Instrumens qui montent plus haut, pour désigner les Sons auxquels ces nombres se rapportent. Remarquez que comme un Instrument a une étendue beaucoup plus grande que la Voix, on fait souvent servir une étendue d'Instrument à deux ou trois parties, en prenant quelquefois un plus gros Instrument pour la partie la plus basse, & un plus petit pour la plus haute; il y a néanmoins des Instrumens qui n'ont qu'une partie.

Nous avons réglé les termes & l'étendue de la plupart des Instrumens à vent selon la pratique du Sieur *Ripert*, & du Sieur *Jean Hantetaire* le jeune qui sont des plus habiles Facteurs de *Paris*: Ces termes changent quelquefois selon la volonté de ceux qui en jouent.

VI. Les cordes des Instrumens à cordes & à manche rendent à vuide les Sons marquez dans la Table. Les nombres 1, 2, 3, 4, &c. marquent les cordes à vuide en commençant par la plus aigüe. Les nombres ou les lettres répétées marquent l'étendue ordinaire de la corde la plus aigüe.

Quelques Instrumens comme la Guitarre ont leurs cordes doubles, & même triples, qui sont ordinairement à l'Unisson & quelquefois à l'Octave, nous les avons marquées par le même nombre répété deux fois.

Enfin tous les Instrumens à cordes & à manche, ont le Manche divisé par 7, 8, 9 ou 10 *Touchez*, excepté le Violon, qui n'en a point.

Nous

Nous avons marqué 1. L'ordre des Touches par les nombres 1, 2, 3, 4, &c. 2. Les lettres *a, b, c, d*, &c. par lesquelles on les désigne dans les Livres de Tablature. La lettre *a* marque la corde à vuide. *b* la première touche, &c. 3. Les Intervalles Diatoniques du Son que forme la corde à chaque touche, par rapport au Son de toute la corde à vuide. 4. Ces mêmes Intervalles par Merides.

Nous avons marqué les Sons des cordes à vuide des Instrumens de Musique, la plupart selon la pratique du Sr. *Hurel* qui passe pour un des plus habiles Facteurs d'Instrumens à Cordes & à Manche. L'on peut néanmoins les accorder différemment, comme en effet plusieurs le font, & sur tout les Etrangers. C'est pourquoi nous avons laissé un espace pour y ajouter les Instrumens qu'on jugera à propos.

VII. En comparant ensemble les Intervalles reciproques de tous les Sons d'un Instrument comme nous le marquons dans la Section XI. nous en connoissons les défauts, ce qui servira de principe pour trouver la maniere de les rendre plus parfaits, & pour les accommoder aux Pieces qu'on veut jouer sur ces Instrumens.

Nous ajouterons à la fin de ce Traité † notre pensée sur la division des parties dans les Voix & dans les Instrumens.

† Addition à la Section VI.

## SECTION VII.

*Application du Système général au Plainchant.*

**J'**ENTENDS par le *Plainchant*, cette sorte de chant qui n'emploie que les Sons du Système Diatonique sans autres modifications dans les Notes que d'être longues ou brèves, enforte que si l'on emploie des Dièses, des *b mols* ou d'autres modifications, je dirai que le Plainchant les emprunte de la Musique.

Pour entendre entierement le Plainchant par nôtre Système, représentez-vous \* *la Table des Notes pour le Plainchant.*

Dans cette Table la premiere Ligne marque une portée des notes & des clefs du Plainchant ordinaire. Nous y avons ajouté nos clefs O & D qui représentent C SOL UT & sa Sous-Octave. La 2<sup>e</sup>, les noms anciens de ces notes; ces deux lignes n'ont d'étendue que les deux Octaves ordinaires du Plainchant. La 3<sup>e</sup>, les Intervalles Diatoniques dans l'étendue de 3 Octaves. La 4<sup>e</sup>, ces mêmes Intervalles en Merides (elles sont prises dans le Système temperé sans Eptamerides). La 5<sup>e</sup>, les noms des sons ou des notes selon le Système général: les noms anciens & les nouveaux sont de trois sortes de caractères pour distinguer les 3 Octaves. Et la 5<sup>e</sup>, les notes de nôtre Système, dont les blanches marquent les longues, & les noires les breves.

Les

\* Planche II.

Les Intervalles, les Notes, & les Noms de ces six Lignes se répondent les uns aux autres.

I. Nous retenons les noms des Intervalles ordinaires du Système Diatonique, Seconde, Tierce, Quarte, &c. parce qu'ils sont trop en usage chez les anciens Auteurs aussi-bien que chez les Modernes : mais pour entendre exactement les rapports de ces Intervalles, il faut avoir recours à nos Merides, par lesquels nous connoissons que le Semiton majeur, ou la Seconde mineure contient 4 Merides, le Ton ou la Seconde majeure 7, &c. Voyez la Table suivante qui marque les Intervalles temperez comme il le faut supposer pour la pratique du Plainchant : cette Table est prise dans les Tables de la I. Planche.

*Intervalles Diatoniques.*

I. 2. II. 3. III. 4. IV. 5. V. 6. VI. 7. VII. VIII.

*Intervalles en Merides.*

0. 4. 7. 11. 14. 18. 21. 22. 25. 29. 32. 36. 39. 43.

Pour avoir les Intervalles reciproques des Notes du Plainchant par exemple de D o, f o, ôtez 39 de 61 (qui répondent à D o f o) le reste est 22, & par la Table précédente nous trouvons que cet Intervalle est une fausse Quinte. On trouvera de même tous les autres Intervalles reciproques.

II. Nous rejettons les Noms ordinaires UT, RE, MI, &c. parce qu'ils ont été pris au hazard sans aucune attention aux proprietes des Intervalles qu'on ne peut connoître avec ces noms que par un long usage.

III. Les noms nouveaux PA, RA, GA, SO, BO, LO, DO, marquent d'une maniere aisée toutes les proprietés du Systême Diatonique temperé, & par conséquent ils sont très-propres pour apprendre à entonner les Notes du Plainchant.

Car 1°. les Consones P. R. G. S. B. L. D. servent à distinguer les Intervalles Diatoniques des Sons ou des Notes; car l'Intervalle d'une Consonne à la suivante, marque toujours une seconde, comme P, R, ou G, S, ou D, P. L'Intervalle d'une Consonne à la 3<sup>e</sup>. (en y comprenant la premiere) s'appelle Tierce comme P, G, ou R, S, &c.

2°. Les Voyelles A, o, servent à faire connoître si les Intervalles précédens sont majeurs ou mineurs selon les deux regles suivantes.

La premiere est que si les deux Notes ne changent point de voyelles, les petits Intervalles, c'est-à-dire la Seconde, la Tierce & la Quarte, sont majeurs, parce qu'ils ne contiennent que des tons sans aucun Semi-ton: & les grands Intervalles, c'est-à-dire la Quinte, la Sixte & la Septième sont mineurs, parce qu'ils contiennent deux Semi-tons: ainsi PA, RA, est une Seconde majeure ou un Ton; PA, GA, Tierce maj. So, do, Quarte maj. ou un Triton; au contraire Do, so est une Quinte mineure ou une fausse Quinte; Do, bo, Sixte mineure. Enfin Do, lo, est une Septième mineure. Leurs repliques suivent la même règle.

La Seconde est que si deux Notes changent de Voyelles, le contraire arrive, c'est-à-dire que les petits Intervalles sont mineurs, parce qu'ils



qu'ils contiennent un Semi-ton , & les grands sont majeurs, parce qu'ils ne contiennent qu'un Semi-ton. Ainsi GA, so , ou Do , pa , sont des Secondes mineures ou des Semitons majeurs. GA, bo Tierce mineure. PA, so Quarte mineure ou simplement Quarte. Au contraire PA , bo est une Quinte majeure ou simplement Quinte. PA , lo Sixte majeure , & PA , do Septième majeure ; leurs repliques suivent les mêmes regles.

IV. On peut se servir des Notes ordinaires du Plainchant ; mais au lieu des deux Clefs qu'on appelle de F UT FA & de C SOL UT , il seroit plus simple de se servir de nos Clefs, D, & O, pour marquer, pa, *pa* (ut, *ut.*)

V. Je suis néanmoins persuadé que les Notes nouvelles sont plus commodés.

Car 1°. nos Notes marquent immédiatement le Nom & le Son qui leur convient , & dans la Tablature ordinaire du Plainchant , il faut un long usage pour connoître par les Clefs, par les Lignes & par les Espaces, les Noms & les Sons de ces Notes.

2°. \* Par les Notes nouvelles on connoît avec la même facilité les Intervalles majeurs & mineurs, que par les Noms nouveaux ; car les Noms qui ont la voyelle A, répondent aux Notes qui ont la queue en bas , & les Noms en O ont dans leurs Notes la queue en haut. Dans la Tablature ordinaire il faut plus de temps & d'application pour distinguer & entonner les Intervalles majeurs & mineurs que par la nôtre.

3°. Les Notes nouvelles ont quelque rapport

T 7

avec

\* Planche II.

avec les consonnes des noms sur tout avec les 4 lettres *p, q, b, d*; desorte que si l'on vouloit écrire un Plainchant usuel, au lieu des notes, on pourroit se servir des consonnes *P. R. G. S. B. L. D. p. r. g. f. b. l. d. p. r. g. f. b. l. d.* Si l'on veut marquer des brèves, on les tranchera, ou l'on mettra des virgules après; & pour des longues, on mettra après un point ou deux. Les Notes anciennes n'ont aucun rapport avec leurs noms pour faire une Musique usuelle qui soit commode.

4°. Nous avons un petit avantage par les têtes de nos notes, en ce qu'elles nous font distinguer les Intervalles impairs *I. III. V. VII.* d'avec les pairs *II. IV. VI.* Car dans une même Octave deux notes qui ont ensemble une tête, ou qui sont sans tête, sont dans un Intervalle impair; & deux notes, dont l'une a une tête & l'autre n'en a point, sont dans un Intervalle pair. Le contraire arrive à deux notes qui sont dans deux Octaves différentes & voisines.

VI. Les objections que l'on fait contre nos Notes & nos Noms sont 1°. Que l'usage a établi généralement les anciennes notes & les anciens noms, tout le monde en est prevenu, & il faut un travail nouveau pour apprendre & s'accoutumer à une nouvelle maniere. 2°. Les noms *UT, RE, MI, &c.* sont plus doux, & plus énergiques pour exprimer les Sons du Système Diatonique que les noms *PA, RA, GA, &c.* 3°. En tout cas les noms sont d'eux-mêmes indifférens, car un habile Musicien chante les notes sans prononcer ni faire attention aux noms. 4°. Enfin les notes mises sur 4 ou 5 lignes parallèles aident l'imagination; car quand les

notes montent ou descendent, elles nous avertissent que la voix doit monter ou descendre.

Je répons 1°. que l'Histoire de la Musique nous apprend que l'usage n'a établi les notes & les noms que peu à peu en se perfectionnant. Pour les noms on s'est servi d'abord des lettres A. B. C. D. E. F. G. comme on fait encore en *Allemagne*, en *Turquie* & en *Perse*. Ensuite *Aretin* les a changez en UT, (ou DO par les *Italiens*) RE, MI, FA, SOL, LA; & l'usage après avoir essuié beaucoup de difficultez par les nuances, a ajoûté si depuis 30 ans. Pour les notes, elles ont d'abord été inconnues, comme elles le sont encore chez les Peuples qui sont hors de l'*Europe*, & on se servoit de lettres; ensuite on s'est servi de points, après lesquels on a inventé les Notes du Plainchant, & enfin de celles de la Musique. Ce n'est donc pas une chose extraordinaire que le Plainchant & la Musique après avoir passé par tous ces états, arrive à un plus parfait que les precedens. 2°. On trouvera nos Notes PA, RA, &c. plus douces & plus énergiques que les ordinaires UT, RE, &c. si on fait tant que de s'y accoutumer, parce que les voyelles avertissent de monter ou descendre d'un Ton ou d'un Semiton. 3°. J'avoue que les Noms sont inutiles aux habiles Musiciens, mais les Commencans ont besoin des Noms les plus simples & les plus significatifs, qui sont aussi les plus commodes aux habiles pour s'expliquer au moins par écrit. 4°. Je suis persuadé que l'usage rendra nos Notes aussi sensibles de loin, que sont les ordinaires avec les lignes paralleles, parce que si l'on veut se servir d'une seule ligne comme nous faisons dans

la Musique, les Octaves seront aussi facilement distinguées l'une de l'autre que les notes le sont dans les parties ordinaires. Ensuite dans chaque Octave \*, les 3 premières notes qui ont la queue en bas sont fort aisées à distinguer des 4 dernières qui ont la queue en haut; de plus les notes qui ont la queue devant le corps du caractère, se distinguent aisément des semblables qui ont la queue après; enfin les têtes se feront encore bien distinguer, si on a soin de les bien marquer. Ajoutez que nos Dièses & *b* mols sont plus aisez à reconnoître que les ordinaires. Nos notes se connoissent immédiatement par elles-mêmes, on évite par leur moien les difficultez que forment les clefs & les transpositions des notes ordinaires; enfin le langage est uniforme pour les Voix & pour les Instrumens.

VII. † Nous donnons un Exemple du Plainchant dans lequel la Clef D signifie que les Notes qui sont sans traits horizontaux sont de la 1<sup>re</sup>. Octave grave; on s'en peut passer parce que cela arrive toujours dans le Plainchant, les Notes blanches sont longues & les noires sont brèves. Les traits entre les notes marquent les separations des mots.

On peut représenter le Plainchant par les 3 manieres marquées dans l'exemple de la Musique, de laquelle on peut emprunter les Dièses & *b* mols, les mesures, &c.

\* Planche II. † Planche II.

## SECTION VIII.

*Application du Système général à la Musique.*

**P**AR la *Musique* nous entendons cette sorte de Chant qui emploie les Sons du Système Diatonique avec toutes les modifications dont ils sont capables, c'est-à-dire avec leurs Diesés, & *b* mols, leurs différentes mesures, leurs valeurs, leurs durées, les pauses & les agrémens.

Pour avoir une idée entière de toutes ces circonstances de la Musique, voyez la Table \* des Notes de la Musique & les Tables qui suivent.

Vous remarquerez dans la *Table des Notes* 1. une Oétave des *Notes naturelles*, c'est-à-dire du Système Diatonique temperé, exprimée par Merides, par les Noms & les Notes nouvelles, & même par les Notes & les Noms anciens afin de voir leurs rapports. 2. Toutes les *Notes diésées*, ce qui se fait par les Merides en ajoutant 3 au nombre des Merides des Notes naturelles; par les Noms, en changeant A en i & O en a; Par les Notes en courbant la queue à droite. Aux Notes & aux Noms anciens nous y avons mis les marques ordinaires de Diesés. 3. Comme il arrive quelquefois que les Compositeurs aiant mis des Diesés après la Clef, ils en mettent de nouveaux sur la même Note qui se trouve alors doublement dié-

\* Planche II.

diésée, nous en avons mis une dans cette circonstance à so, qui a 18 Merides, son Diése 21, & son double Diése 24. A l'égard du nom, le Diése de so est sa, & son double Diése est bi, que l'on a en prenant la consone b qui suit f, & la voyelle i qui precede o; ce qu'on peut voir dans la \* Table générale des Noms & des Sons; & à l'égard de la Note, le Diése recourbe la queue droite, & dans le double Diése la queue a une double courbure. Les Instrumens à touches réglées pour un double Diése prennent le Son suivant Bo qui est alors alteré d'une Meride. 4°. Vous remarquerez toutes les *Notes en b mol*, ce qui se fait aux Merides en ôtant 3, du nombre des Merides des Notes naturelles; aux Noms en changeant A en o, & O en e, & aux Notes en courbant la queue à gauche. Aux Notes & aux Noms anciens nous avons marqué le *b mol* à l'ordinaire. 5°. Il arrive aussi quelquefois des *b mols* doubles, alors il faut faire à proportion comme au double Diése.

Si l'on compare nôtre Système de Musique avec l'ancien, on trouvera dans le nôtre les avantages suivans. 1°. Les Merides marquent exactement les Intervalles des Sons necessaires à la Musique, comme au Plainchant.

2°. Les noms des Sons naturels ont les proprieté que nous avons marquées au Plainchant, leurs Diéses & leurs *b mols* ne changent point de consones, mais seulement de voyelles en prenant la 3°. suivante pour les Diéses, & la 3°. précédente pour les *b mols*, comme on peut voir dans la † Table générale des Noms.

Les

\* Planche II. † Planche I.

Les nouvelles voyelles servent aussi à distinguer les différentes especes d'Intervalles Diatoniques ; savoir les Intervalles superflus & maximes, qui sont plus grands que les Intervalles majeurs de 3 & de 6 Merides ; les Intervalles diminuez & minimas\*, qui sont plus petits que les Intervalles mineurs de 3 & de 6 Merides. Ces sortes d'Intervalles peuvent passer pour les Intervalles Diatoniques suivans ou précédens, mais alterez d'une Meride.

Pour distinguer ces especes d'Intervalles par les Noms nouveaux, il faut supposer trois choses, 1°. Que deux Sons s'approchent l'un de l'autre d'un degré, lors que le plus bas est diésé ou que le plus haut est en *b mol* ; & qu'ils s'approchent de deux degrez, lorsque ces deux cas arrivent en même temps. Au contraire deux Sons s'éloignent l'un de l'autre d'un degré, lorsque le plus bas est en *b mol*, ou que le plus haut est diésé, & qu'ils s'éloignent de deux degrez, lorsque ces deux cas arrivent en même temps. 2°. que ces Notes ne sont éloignées ni approchées, lors qu'elles sont toutes deux ou diésées ou en *b mol*. 3°. que les Voyelles voisines sont les équivalentes l'une de l'autre ; ainsi e est l'équivalente de A, & i de O. Cela supposé nous donnerons les deux regles suivantes.

La 1<sup>re</sup>. est que dans les petits Intervalles, si deux noms ont les mêmes Voyelles, ou bien si l'un a une voyelle, & l'autre son équivalente,

\* Dans la Planche I. colonne I. il y a septième *minime* opposée à septième *mineure*, qu'il ne faut pas confondre avec septième *minime* opposée à septième *maxime*.

te, 1°. leurs Intervalles sont *majeurs* si les Sons sont naturels, ou ne sont éloignez que d'un degré; 2°. Ils sont *maximes* s'ils sont éloignez de deux degrez; 3°. Ils sont *diminuez*, s'ils se sont aprochez d'un ou de deux degrez.

La seconde regle est que dans les petits Intervalles, si les deux Noms ont des Voyelles différentes ou leurs équivalentes, 1°, leurs Intervalles Diatoniques sont *mineurs*, si les Sons sont naturels, ou s'ils se sont aprochez d'un degré; 2°. Ils sont *minimes*, s'ils se sont aprochez de deux degrez; 3°. Ils sont *superflus*, s'ils se sont éloignez d'un ou de deux degrez; dans les grands Intervalles le contraire de ces deux regles arrive.

Nous donnons un exemple \* de toutes les especes de *Quartes* dans cette Table, dans laquelle nous mettons, 1°. Les noms d'une *Quarte* dans toutes ses especes. 2°. Les mêmes en *Merides*. 3°. Deux *exemples* de noms des Sons qui forment toutes ces especes de *Quartes*, dans lesquelles les noms naturels sont en lettre Capitale, les diéses en Romaine, & ceux en *b* mols sont en Italique. 4°. Les regles auxquelles ces especes d'Intervalles se rapportent. 5°. Les *Intervalles alterez* auxquels les especes de *Quarte* se raportent, & que les Instrumens à touches réglées leur substituent. 6°. Les *Merides* que devoient avoir ces *Intervalles*-ci pour être *justes*.

3°. Les Notes font connoître même avec plus de facilité ces especes d'Intervalles, car l'on connoît (comme nous avons dit au Plainchant) les Intervalles naturels majeurs & mineurs

\* Table suivante.



| 1.<br><i>Quartes</i>                                      | 2.<br><i>Mé-<br/>rides</i> | 3.<br><i>Exemples.</i>                                                                                                          | 4.<br><i>Re-<br/>gles.</i> | 5.<br><i>Inter-<br/>valles<br/>alterez.</i> | 6.<br><i>In-<br/>terv.<br/>just.</i> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Maxi-<br/>mes.</i>                                     | 27                         | < <i>se</i> , <i>da</i> . . . . >                                                                                               | 1 <sup>re</sup> .          | V. su-<br>perfluë                           | 28                                   |
| <i>Super-<br/>flues.</i>                                  | 24                         | { <i>se</i> , <i>DO</i><br><i>SO</i> , <i>da</i> } <i>po</i> , <i>fa</i>                                                        | 2 <sup>re</sup> .          | V.                                          | 25                                   |
| <i>Majeu-<br/>res ou<br/>Tritons.</i>                     | 21                         | { <i>fa</i> , <i>da</i> <i>PA</i> , <i>fa</i><br><i>SO</i> , <i>DO</i> <i>po</i> , <i>SO</i><br><i>se</i> , <i>de</i> . . . . } | 1 <sup>re</sup> .          |                                             |                                      |
| <i>Minew-<br/>res ou<br/>simple-<br/>ment<br/>Quartes</i> | 18                         | { <i>fa</i> , <i>DO</i> <i>pi</i> , <i>fa</i><br><i>SO</i> , <i>de</i> <i>PA</i> , <i>SO</i><br>. . . . <i>po</i> , <i>se</i> } | 2 <sup>re</sup> .          |                                             |                                      |
| <i>Dimi-<br/>nuées.</i>                                   | 15                         | { <i>fa</i> , <i>de</i> <i>pi</i> , <i>fo</i><br>. . . . <i>PA</i> , <i>se</i> }                                                | 1 <sup>re</sup> .          | III.                                        | 14                                   |
| <i>Mini-<br/>mes.</i>                                     | 12                         | < . . . . <i>pi</i> , <i>se</i> >                                                                                               | 2 <sup>re</sup> .          | 3.                                          | 11                                   |

neurs avec les Notes simples qui ont la queue droite. Ensuite 1°. si l'Intervalle naturel est majeur, & que l'une des Notes s'éloigne de l'autre par la courbure de sa queue, l'Intervalle devient superflu, & si les deux Notes s'éloignent, il devient maxime; au contraire si une Note s'approche, l'Intervalle devient mineur; si toutes les deux s'approchent, il devient diminué. 2°. Si l'Intervalle naturel est mineur, par un semblable raisonnement on conclura les

les changemens qu'aportera la courbure des queues des Notes.

4°. J'avoue qu'on peut apliquer le même raisonnement aux Notes & aux Noms anciens, mais les marques pour connoître ces especes d'Intervalles ne sont pas si simples.

II. La Table \* *de la valeur des Notes & des pauses* marque 1°. le raport des valeurs de ces Notes qui suivent la progression double. 2°. Une Note nouvelle selon toutes ces valeurs. 3°. La semblable Note ancienne selon les mêmes valeurs. 4°. Les silences ou les pauses nouvelles, qui sont des 0, ou des notes sans queue & sans tête. 5°. Les anciennes pauses dans toutes les mêmes valeurs.

L'on voit par cette Table que, supposé qu'une noire vaille un temps, une noire avec un trait ne vaudra que  $\frac{1}{2}$  de temps ou une croche: avec deux traits,  $\frac{1}{4}$  de temps ou une double croche: avec un trait courbé,  $\frac{1}{8}$  ou une croche triple, &c. Au contraire une blanche vaut 2 temps; un trait sur une blanche vaut 4 temps ou une ronde, & ainsi de suite; de sorte que les traits divisent les noires, & multiplient les blanches, ce qui est commun aux Notes & aux pauses.

Un point mis après une Note augmente la valeur de cette Note d'une moitié, comme dans la Musique ordinaire.

III. La Table *des Clefs des Octaves* du nouveau Système marque 1°. Les Clefs nouvelles, dans lesquelles O marque l'Octave moienne, & 1, 2, 3, 4, &c. dans O marquent la 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup>, Octave aigue. D seul ou avec 1 marque

\* Planche II.

que la 1<sup>re</sup>. sous-Octave ou Octave grave, & avec 2, 3, &c. marque la 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, sous-Octave. 2°. La Clef O mise dessus une ligne est affectée aux parties de dessus pour les Voix & les Instrumens, & signifie que les Notes qui sont dans cette ligne sont de l'Octave moienne, celles qui sont au-dessous de la ligne sont de la 1<sup>re</sup>. Octave grave, & celles qui sont au-dessus sont de la 1<sup>re</sup>. Octave aigue; si l'on veut monter plus haut, on ajoute une seconde ligne. 3°. La Clef D mise sur une ligne est pour les parties basses, & signifie que les Notes qui sont sur la ligne sont de la 1<sup>re</sup> Octave grave, les autres à proportion; & si l'on veut descendre plus bas, on ajoute aussi une seconde ligne. 4°. Les Notes sans Clef marquent les différentes Octaves par des traits sous leur corps, dans leur corps & au-dessus; celles qui n'ont point de traits appartiennent à l'Octave moienne; & ces 4 Octaves suffisent pour la Musique ordinaire. Que si l'on veut monter plus haut, ou descendre plus bas, on doublera le trait. On peut mettre une Clef au commencement de ces Notes, & alors elle signifie que les Notes sans trait appartiennent à l'Octave de cette Clef. 5°. Nous avons ajouté les Notes anciennes avec toutes leurs positions selon les différentes parties, afin de montrer les rapports des Notes & des Octaves nouvelles dans toutes les précédentes manières avec les Notes anciennes.

IV. Nous avons donné un *exemple pour la Musique* à deux parties, que nous avons mis de 3 manières. *La première manière*, sur une ligne & alors la Clef O marque le dessus, & D la basse. *La seconde manière*, sans Clef en met-  
tant

tant les corps des Notes sur une ligne. *La troisième maniere*, aussi sans Clef en mettant toutes les Notes de même hauteur. L'usage montrera ce qui convient le mieux.

Voici les remarques particulieres qu'il faut faire sur cette piece de Musique.

1°. Au commencement de chaque portée sont les Clefs O pour les dessus, & D pour les basses.

2°. Sur la premiere Clef O nous en mettons une seconde avec un nombre de Merides dedans, pour marquer que le Son fondamental ou le C SOL UT de l'Orgue ou du Clavecin, sur lequel on chante, ou l'on joue cette piece, est éloigné du Son fixe de cette quantité. Quand le Son fixe aura été bien déterminé, l'on connoitra par là les differences des Tons de la Chapelle, de l'Opera & des Concerts particuliers, pour toute sorte de temps.

3°. Devant la Clef sont deux Notes, l'une la plus basse de la partie qu'on chante, & l'autre la plus haute. Ces deux Notes servent 1°. à faire prendre le ton à celui qui chante seul cette partie en préludant depuis la Note la plus basse jusqu'à la plus haute. 2°. A voir à quelle personne une partie convient en considerant si sa belle voix a cette portée. 3°. Lorsque sur une feuille il y a plusieurs parties ces deux Notes font reconnoître à chacun des Musiciens la portée qu'il doit chanter, parce qu'il n'y a pas assez de varieté dans nos Clefs pour les distinguer.

4°. Dans le corps de la piece les mesures sont marquées à l'ordinaire, aussi-bien que les guidons, les reprises, & les differens agrémens du chant; les liaisons des croches sont marquées

quées au-dessus des Notes, & les liaisons des autres Notes au-dessous.

5°. Devant la Clef au-dessus de la ligne est marquée la mesure par une pause & un chiffre, le chiffre marque si c'est une mesure à 2, ou à 3, ou à 4 temps, la pause marque la valeur d'un temps de cette mesure.

6°. Devant la Clef au-dessous de la ligne est marquée la durée d'un temps, ou d'une mesure. Pour marquer ces durées, il y a trois choses; 1°. une pause qui est égale à celle qui marque au-dessus de la ligne un temps de la mesure, ou qui est égale à tous les temps de la mesure, lorsque la mesure se bat vite. 2°. une lettre. 3°. un nombre.

Pour comprendre ce nombre & cette lettre, il faut savoir que nous marquons la durée d'une Note ou d'une pause par une vibration d'un Pendule simple dont la longueur est déterminée. Ce Pendule est fait d'une balle de plomb ou de cuivre attachée au bout d'un fil long environ de 8 pieds, à l'autre bout il y a un contrepoids; on attache deux clouds ou épingles à la hauteur de 5 à 6 pieds, & éloignées l'une de l'autre de 2 ou 3 pieds; enfin l'on fait passer ce fil par-dessus ces deux épingles.

Lors qu'en chantant ou jouant une piece de Musique, l'on bat la mesure avec la main, il faut faire faire des vibrations à ce Pendule, & considerer si chaque vibration est isochrone à chaque temps de la mesure, ou à toute la mesure, c'est-à-dire la mesure étant à 3, si à chaque mesure le pendule fait justement 3 vibrations, ou la mesure étant trop vite, si à chaque mesure le pendule en fait une; car si le pendule va trop vite, il faut l'allonger en hauf-

fant le Contrepoids, & s'il va trop lentement il faut le racourcir en baissant le contrepoids.

\* Le Pendule étant précisément isochrone avec un temps ou une mesure, prenez la regle sur laquelle est marqué le Chronometre, avec lequel mesurez la distance du point de suspension, jusqu'au centre de la balle, vous aurez la longueur du pendule qui marquera la durée. Mais comme il y a de 3 sortes de Chronometre, il les faut marquer différemment.

1<sup>o</sup>. Si vous vous servez du Chronometre de M. Loulié pour marquer la durée, il faut mettre la lettre P. ainsi o. P. 42. signifie qu'une blanche o. dure autant qu'une vibration d'un pendule qui a 42. *Pouces* de long.

2<sup>o</sup>. Si vous vous servez de nôtre premier Chronometre, mettez S. ainsi o. S. 14. signifie qu'une blanche dure autant qu'une vibration de 14. *douzièmes de Secondes*.

3<sup>o</sup>. Si vous vous servez de nôtre second Chronometre, mettez T. ainsi o. T. 70. signifie qu'une blanche dure autant qu'une vibration de 70 *Tierces*.

Le Chronometre de M. Loulié est le plus simple pour sa construction, puisqu'il est divisé en parties égales, mais les durées des Notes ne sont marquées par aucun temps exact, puisqu'elles sont la plus-part incommensurables avec le temps d'une Seconde. Nôtre Chronometre qui divise la Seconde en 12 parties égales est suffisant pour la pratique, & commode en ce qu'il marque exactement les rapports des temps de la durée des Notes; ces rapports sont marquez plus en détail par les Tierces.

II

\* Planché II. Echelles I. II.

Il est certain que pour rendre la Musique parfaite , il faut marquer la durée absolue des temps ou des mesures ; car il est impossible d'instruire les absens & la posterité de la véritable mesure d'un air selon le sentiment de l'Auteur , si on ne marque sa durée par l'une des trois manieres precedentes. Au reste si dans la suite d'un air l'on change de mesure ou de durée , on marquera la nouvelle mesure ou la nouvelle durée dans une parenthese de cette maniere (3) ou (o. 3.) & (S. 8.) ou (o. S. 8.) ces durées sont plus précises que les mots ordinaires de *vite*, *lentement* &c. qui sont équivoques.

## SECTION IX.

*Des Sons harmoniques.*

J'APPELLE *Son harmonique* d'un Son fondamental , celui qui fait plusieurs vibrations pendant que le Son fondamental n'en fait qu'une , ainsi un Son à la douzième du Son fondamental est harmonique , parce qu'il fait 3 vibrations pendant que le Son fondamental n'en fait qu'une. Voici la Table des Sons harmoniques qui est divisée en 5 Octaves & en 7 Colomnes.

\* La 1<sup>re</sup>. Colonne marque le nombre des vibrations que fait un Son harmonique , pendant que le Son fondamental n'en fait qu'une , elle marque aussi l'ordre des Sons harmoniques.

La 2<sup>e</sup>. Colonne suppose que chaque Octave

V 2 du

\* Voyez la Table suivante.

# 460 MEMOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

| 1.<br>Rap.<br>des<br>vibra-<br>tions<br>au<br>1. <sup>er</sup><br>Son<br>de<br>cha-<br>que<br>Oc-<br>tave. | 2.<br>Rap.<br>des<br>vibra-<br>tions<br>au<br>1. <sup>er</sup><br>Son<br>de<br>cha-<br>que<br>Oc-<br>tave. | 3.<br>Inter-<br>valles en<br>Octaves,<br>Merides<br>& Epta-<br>merides. | 4.<br>Inter-<br>valles<br>Diatoni-<br>ques<br>au pre-<br>mier<br>Son de<br>chaque<br>Octave. | 5.<br>Intervalles<br>Diatoni-<br>ques au<br>Son fonda-<br>mental. | 6.<br>Noms nou-<br>veaux. | 7.<br>Noms an-<br>ciens. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                          | 10000                                                                                                      | 0                                                                       | I                                                                                            | I                                                                 | PA                        | UT                       |
| 2                                                                                                          | 10000                                                                                                      | 1 + 0                                                                   | I                                                                                            | VIII                                                              | sem-PA                    | UT                       |
| 3                                                                                                          | 15000                                                                                                      | 1 + 25'                                                                 | V                                                                                            | XII                                                               | sem-BOr                   | SOL                      |
| 4                                                                                                          | 10000                                                                                                      | 2 + 0                                                                   | I                                                                                            | XV                                                                | bis-PA                    | UT                       |
| 5                                                                                                          | 12500                                                                                                      | 2 + 14"                                                                 | III                                                                                          | XVII                                                              | bis-GAn                   | MI                       |
| 6                                                                                                          | 15000                                                                                                      | 2 + 25'                                                                 | V                                                                                            | XIX                                                               | bis-BOr                   | SOL                      |
| 7                                                                                                          | 17500                                                                                                      | 2 + 35"                                                                 | 7 7                                                                                          | 21                                                                | bis-lal                   | la . d                   |
| 8                                                                                                          | 10000                                                                                                      | 3 + 0                                                                   | I                                                                                            | XXII                                                              | ter-PA                    | UT                       |
| 9                                                                                                          | 11250                                                                                                      | 3 + 7"                                                                  | II                                                                                           | XXIII                                                             | ter-RA <sub>s</sub>       | RE                       |
| 10                                                                                                         | 12500                                                                                                      | 3 + 14"                                                                 | III                                                                                          | XXIV                                                              | ter-GAn                   | MI                       |
| 11                                                                                                         | 13750                                                                                                      | 3 + 20"                                                                 | 10 IV                                                                                        | 10 XXV                                                            | ter-fsl                   | fa 1/2 d                 |
| 12                                                                                                         | 15000                                                                                                      | 3 + 25'                                                                 | V                                                                                            | XXVI                                                              | ter-Bor                   | SOL                      |
| 13                                                                                                         | 16250                                                                                                      | 3 + 30'                                                                 | 6 7                                                                                          | 27                                                                | ter-lr                    | la 2/3 b                 |
| 14                                                                                                         | 17500                                                                                                      | 3 + 35"                                                                 | 7 7                                                                                          | 28                                                                | ter-lal                   | la . d                   |
| 15                                                                                                         | 18750                                                                                                      | 3 + 39"                                                                 | VII                                                                                          | XXVIII                                                            | ter-DO                    | SI                       |
| 16                                                                                                         | 10000                                                                                                      | 4 + 0                                                                   | I                                                                                            | XXIX                                                              | quat-PA                   | UT                       |
| 17                                                                                                         | 10625                                                                                                      | 4 + 4"                                                                  | 2 2                                                                                          | 30                                                                | quat-rol                  | re . b                   |
| 18                                                                                                         | 11250                                                                                                      | 4 + 7"                                                                  | II                                                                                           | XXX                                                               | quat-RA <sub>s</sub>      | RE                       |
| 19                                                                                                         | 11875                                                                                                      | 4 + 11"                                                                 | 4 3                                                                                          | 31                                                                | quat-gol                  | mi b                     |
| 20                                                                                                         | 12500                                                                                                      | 4 + 14"                                                                 | III                                                                                          | XXXI                                                              | quat-GAn                  | MI                       |
| 21                                                                                                         | 13125                                                                                                      | 4 + 17"                                                                 | 7 4                                                                                          | 32                                                                | q.-Sin ou gin             | fa 1/3 b                 |
| 22                                                                                                         | 13750                                                                                                      | 4 + 20"                                                                 | 10 IV                                                                                        | 10 XXXII                                                          | quat-fsl                  | fa 1/2 d                 |
| 23                                                                                                         | 14375                                                                                                      | 4 + 23"                                                                 | 5 5                                                                                          | 33                                                                | quat-bis                  | sol . b                  |
| 24                                                                                                         | 15000                                                                                                      | 4 + 25'                                                                 | V                                                                                            | XXXIII                                                            | quat-BOr                  | SOL                      |
| 25                                                                                                         | 15625                                                                                                      | 4 + 28"                                                                 | 10 6                                                                                         | 34                                                                | quat-bal                  | sol . d                  |
| 26                                                                                                         | 16250                                                                                                      | 4 + 30'                                                                 | 6 7                                                                                          | 34                                                                | quat-lr                   | la 2/3 b                 |
| 27                                                                                                         | 16875                                                                                                      | 4 + 32"                                                                 | VI 5                                                                                         | XXXIV                                                             | quat-LOr                  | LA                       |
| 28                                                                                                         | 17500                                                                                                      | 4 + 35"                                                                 | 7 7                                                                                          | 35                                                                | quat-lal                  | la . d                   |
| 29                                                                                                         | 18125                                                                                                      | 4 + 37"                                                                 | 7 7                                                                                          | 35                                                                | quat-din                  | fi 2/3 b                 |
| 30                                                                                                         | 18750                                                                                                      | 4 + 39"                                                                 | VII                                                                                          | XXXV                                                              | quat-DO                   | SI                       |
| 31                                                                                                         | 19375                                                                                                      | 4 + 41"                                                                 | VII. 14                                                                                      | XXXV 14                                                           | quat-pu oud               | fi 2/3 d                 |
| 32                                                                                                         | 10000                                                                                                      | 5 + 0                                                                   | VIII                                                                                         | XXXVI                                                             | quin-PA                   | UT                       |



du Son fondamental fait 10000 vibrations , & marque ensuite combien de vibrations fait le Son harmonique par rapport au premier Son de chaque Octave. L'on trouve ces nombres en ajoutant 0000 , aux nombres de la 1<sup>re</sup>. Colonne , & les divisant par le 1<sup>er</sup>. nombre de l'Octave ; ainsi l'on trouve 13750. en divisant 110000. par 8. Les nombres de cette 2<sup>e</sup>. Colonne sont en même rapport que ceux de la même Octave dans la 1<sup>re</sup>. Colonne. Et les nombres d'une Octave sont renfermez dans la suivante.

La 3<sup>e</sup>. Colonne marque les Octaves plus les Merides avec les Eptamerides des Intervalles des Sons harmoniques de cette Octave. En cherchant \* dans la III. Table générale les nombres de la colonne précédente , l'on trouvera aux lieux qui leur répondent dans la II. Table générale , les Merides avec les Eptamerides de cette 3<sup>e</sup> colonne.

La 4<sup>e</sup> Colonne marque les Intervalles Diatoniques de chaque Son harmonique au premier Son de chaque Octave ; & comme la plupart de ces Intervalles ne sont pas justes , nous avons ajouté à gauche les Eptamerides qui manquent , & à droite les Eptamerides qui sont de trop.

La 5<sup>e</sup> Colonne marque les mêmes Intervalles diatoniques au Son fondamental , avec les mêmes différences.

La 6<sup>e</sup> contient les noms des Sons harmoniques selon notre Système général.

La 7<sup>e</sup> , les noms ordinaires des mêmes Sons harmoniques ; *b* signifie *b mol* , & *d* , *dieſe*. L'on

V 3


voit

\* Planche I.

voit que ces noms ne sont pas justes dans plusieurs Sons. Nous avons marqué les parties des dieses & des *b* mols que ces Sons expriment.

Après avoir défini & déterminé les Sons harmoniques, il reste à les faire sentir à l'oreille & même à la vûe, & à en marquer les proprietéz.

Divisez la corde d'un Monochorde en parties égales, par exemple en 5, (l'on peut diviser une regle de la même longueur & l'appliquer le long de cette corde): pincez cette corde à vuide, elle rendra un Son que j'appelle le Fondamental de cette corde: met-



tez aussi-tôt un obstacle leger *C* sur une de ces Divisions *D*, comme le bout d'une plume si la corde est menue; enforte que le mouvement de cette corde se communique de part & d'autre de l'obstacle; elle rendra le 5<sup>e</sup> Son harmonique, c'est-à-dire, une XVIII.

Pour comprendre la raison de cet effet,  
re-

remarquez que lorsqu'on pince la corde  $AB$  à vuide, elle fait ses ondulations dans toute sa longueur; mais lorsqu'on met un obstacle  $C$  sur la premiere division  $D$  de la corde, que je suppose divisée en cinq parties égales, l'ondulation \* totale  $AB$  se partage d'abord dans les deux  $AD$ ,  $DB$ , & comme  $AD$  est  $\frac{1}{5}$  de  $AB$  ou  $\frac{1}{4}$  de  $DB$ , elle fait ses ondulations 5 fois plus vite que la totale  $AB$ , ou 4 fois plus vite que l'autre partie  $DB$ ; de sorte que la partie  $AD$  entraîne sa partie voisine  $DE$ , & l'oblige à suivre son mouvement, elle lui doit être par conséquent égale; car une plus grande partie iroit plus lentement, & une plus petite iroit plus vite; ensuite la partie  $DE$  oblige la suivante  $EF$  à suivre le même mouvement, & ainsi de suite jusqu'à la dernière; de sorte que toutes les parties feront des ondulations qui se croiseront dans les divisions  $D$ ,  $E$ ,  $F$ ,  $G$ ; & par conséquent la corde rendra le 5<sup>e</sup> Son harmonique, ou une XVIII.


J'appellerai ces points  $A$ ,  $D$ ,  $E$ ,  $F$ ,  $G$ ,  $B$ , les *Nœuds* de ces ondulations, & les milieux de ces ondulations seront appelez les *Ventres* de ces ondulations.

Si l'obstacle  $C$  est à la 2<sup>e</sup> division  $E$  de la corde, elle rendra le même son harmonique; car 1<sup>o</sup>, l'obstacle  $C$  obligera d'abord la corde à faire les deux ondulations  $AE$ ,  $EB$ . 2<sup>o</sup>. L'ondulation  $AE$  allant plus vite que l'autre, elle obligera la partie  $EG$  qui lui est égale, à suivre son mouvement. 3<sup>o</sup>. La partie restante  $GB$  qui en est la moitié, allant deux fois  

V. 4

plus

\* Une ondulation d'une corde est la figure en fuseau que font les vibrations de cette corde.



plus vite, obligera son égale  $GF$  à suivre son mouvement, & celle-ci entraînera la suivante  $FE$ , & ainsi de suite jusqu'à la dernière; enforte que toute la corde sera divisée par les ondulations en parties égales à la plus grande commune mesure des parties  $AC$ ,  $CB$  divisées par l'obstacle léger  $C$ .

On sera convaincu de ces ondulations, 1°. par l'ouïe; car ceux qui ont l'oreille fine, distingueront un Son harmonique proportionnel aux parties qui forment ces ondulations, ou bien on pourra s'en assurer en mettant le Monochorde à l'Unisson de ce Son harmonique. 2°. Par les yeux; car si l'on divise la corde en parties égales, par exemple en 5, si on met un chevalet mobile  $C$  en  $D$  ou en  $E$ , & des petits morceaux de papier noir dans les divisions  $E$ ,  $F$ , & des morceaux de papier blanc sur les milieux de ces parties, en frappant la partie  $AC$ , l'on apercevra que les morceaux de papier blanc qui sont sur les ventres des ondulations sauteront.

ront, & que les noirs qui sont sur les nœuds, resteront. On nous a fait remarquer que cet effet avoit déjà été observé en 1673 à l'égard de deux cordes qui sont dans les circonstances de l'Article III. ci dessous, voyez *Joannis Wallis Operum in fol. Tom. II. pag. 466. Cap. CVII.*

De ce que nous venons d'établir nous en tirerons les conséquences & les remarques suivantes.

I. Si l'on a formé un Son harmonique en mettant un obstacle léger en *D*, on continuera à avoir le même, en ôtant cet obstacle, ou en mettant un autre dans quelqu'autre nœud, ou dans tous les nœuds.

II. Après avoir formé un Son harmonique, par exemple le 5<sup>e</sup>, si l'on met l'obstacle léger sur le ventre d'une ondulation qui la divise par exemple en 3, il se formera un 3<sup>e</sup> Son harmonique, c'est-à-dire, le 15<sup>e</sup> Son harmonique du Son fondamental.

III. Sans mettre d'obstacle léger sur une corde, on lui donnera un Son harmonique, 1<sup>o</sup>, si à côté de cette corde on en touche une autre à l'unisson de quelqu'un de ses Sons harmoniques; 2<sup>o</sup>, si la première corde n'est pas à l'unisson avec un des Sons harmoniques de l'autre, elles se partageront par leurs ondulations en Sons harmoniques, qui seront les plus grandes communes mesures des Sons fondamentaux des deux cordes, comme si l'une est à la quarte de l'autre dont le rapport est de 3 à 4, la plus petite formera le 3<sup>e</sup> Son harmonique, & la plus grande, le 4<sup>e</sup> qui sont à l'unisson.

IV. Le Son harmonique formé par la Sympathie d'une corde voisine, ou par un obsta-

cle leger, est d'autant plus sensible, qu'il a de plus grandes ondulations ; ainsi le 3<sup>e</sup> Son harmonique est plus sensible que le 4<sup>e</sup> ; ceux qui sont par sympathie deviennent bientôt insensibles , & ceux qui vont par des obstacles legers sont indefinis ; mais comme les plus petits ne se peuvent distinguer que très-difficilement , nous supposerons dans la suite , qu'une corde de trois pieds, peut faire entendre jusqu'au 32<sup>e</sup> Son harmonique , ou jusqu'à sa 5<sup>e</sup> Octave , quoiqu'on l'entende au de-là du 128<sup>e</sup> Son harmonique.

V. Selon cette supposition , toute division ou nœud qui forme un Son harmonique , en y mettant un obstacle leger , est éloigné du nœud le plus proche qui forme les autres Sons harmoniques au moins d'une 32<sup>e</sup> partie de son ondulation , par exemple le tiers de la corde qui forme le 3<sup>e</sup> Son harmonique est éloigné du plus prochain nœud des autres Sons harmoniques au moins d'une 32<sup>e</sup> partie de ce tiers , ou ce qui est la même chose, du tiers de la 32<sup>e</sup> partie de toute la corde ; car supposant que le 32<sup>e</sup> Son harmonique est le dernier de tous , divisant la 32<sup>e</sup> partie de la corde en trois , toute la corde sera divisée en 96, les nœuds du 3<sup>e</sup> & du 32<sup>e</sup> Son harmonique ne seront que sur quelqu'une de ces 96 divisions: donc ou ils seront éloignés l'un de l'autre au moins de la quantité de l'une de ces parties; ou s'ils ont un nœud commun, le nœud suivant sera au moins éloigné de la même quantité; dont le nœud du prochain Son harmonique est éloigné de celui du 3<sup>e</sup> Son au moins d'une 96<sup>e</sup> de toute la corde , ou d'une 32<sup>e</sup> du tiers de la corde , ou du tiers de la 32<sup>e</sup> partie de toute la corde , ce qui est la même chose.

VI. D'où il suit 1<sup>o</sup>, que le nœud du premier Son harmonique, c'est-à-dire les extrémités de la corde sont fort éloignées du nœud du Son harmonique le plus proche, puisqu'elles en sont éloignées au moins d'un 32<sup>e</sup>. de toute la corde. 2<sup>o</sup>. Que le nœud du 2<sup>e</sup>. Son harmonique est éloigné du plus proche de la moitié d'un 32<sup>e</sup>. que ceux du 3<sup>e</sup>. sont éloignés du tiers, &c. en sorte que les premiers Sons harmoniques sont fort éloignés des nœuds voisins, & les derniers le sont fort peu. C'est pourquoi les premiers Sons ont beaucoup d'étendue autour de leur nœud, & les derniers en ont peu.

VII. Il arrivera même que si le nœud d'un petit Son harmonique se trouve voisin de deux nœuds de Sons plus grands, le plus petit sera effacé par les deux plus grands, en sorte que l'on n'entendra distinctement les petits que quand ils seront d'ordre, comme ils sont vers les nœuds des premiers Sons harmoniques, c'est-à-dire des 1. 2. 3. 4<sup>e</sup>. &c. Sons.

VIII. Enfin en pinçant une corde à vuide, si l'on fait glisser l'obstacle léger le long de cette corde, on entendra un gazouillement de Sons harmoniques dont l'ordre paroîtra confus, & qui pourra néanmoins être déterminé par les principes que nous avons établis.

IX. De ces mêmes principes on en peut tirer d'autres conséquences; par exemple, que les petits Sons harmoniques déplacent autant d'air que les grands, &c.

X. L'expérience montre que les longues cordes, lorsqu'elles sont bonnes ou harmonieuses, font entendre les premiers Sons har-

moniques , principalement ceux qui ne sont pas en Octave l'un de l'autre , les cloches & les autres corps resonnans & harmonieux font le même effet.

XI. Les longs Instrumens à vent partagent aussi leur longueur en des especes d'ondulations égales , enforte que si une ondulation d'air ou de tremouffement des parties de l'instrument , qui occupe toute la longueur comprise depuis l'embouchure par où l'air entre , jusqu'à la premiere ouverture par où l'air peut sortir est forcée d'aller plus vîte , elle se partagera en deux ondulations égales , ensuite en 3 , en 4 , &c. selon la longueur de l'instrument ; & ainsi en soufflant lentement dans un instrument à vent , on entend le Son fondamental , si l'on force ce soufle , ou si dans la trompette , dans le serpent , ou dans le haut-bois on serre davantage les lèvres , ce Son se change dans le 2<sup>e</sup>. 3<sup>e</sup>. 4<sup>e</sup>. &c. Son harmonique ; mais pour découvrir toutes les proprietés des instrumens à vent , il faut un examen particulier.

## SECTION X.

*Application du Système général à la Trompette marine , au Cor de chasse , & aux grands instrumens à vent.*

CE principe de Sons harmoniques ayant été inconnu jusqu'à present , il ne faut pas s'étonner si les explications des Sons de la Trompette marine , & des Instrumens , dont les Sons vont par faults , ont été si imparfaites ;



tes ; & cette découverte donnera lieu à d'autres pour la perfection de l'Acoustique, & même pour trouver des Instrumens d'Aoustique qui répondent à ceux qu'on estime le plus dans l'Optique.

La *Trompette marine* est composée d'une grosse corde de boyaux, qui porte sur un chevalet, dont un pied est apuyé sur la table de la Trompette, & l'autre est un peu en l'air, en sorte que les vibrations de la corde font donner des coups par le pied du chevalet contre la table, qui produisent ce Son aigre de la Trompette marine.

Le pouce, qui s'applique le long de la corde de la Trompette marine, tient lieu d'obstacle léger, & lorsqu'il passe sur les divisions des parties aliquotes & même aliquantes, il se forme un Son harmonique, de sorte que la Trompette marine ne produit que les Sons harmoniques jusqu'au 16<sup>e</sup>. de la Table de la Section IX. dans laquelle sont marquez les Intervalles & les noms de ces Sons.

Cette même Table marque aussi les Sons de la Trompette ordinaire, du Cor de chasse & les ressaults des instrumens à vent qui ont des trous.

## SECTION XI.

*Des Intervalles reciproques des Sons d'un Système & d'un Instrument de Musique.*

PAR intervalles reciproques j'entens l'intervalle de chaque Son d'un Système ou d'un instrument à chacun de ceux qui le suivent dans l'étendue d'une Octave.

Dans les Sections précédentes nous avons donné la maniere de trouver les Intervalles des Sons en Merides & Eptamerides au Son fondamental ; mais pour avoir leurs Intervalles reciproques, il faut marquer de suite les nombres des Merides & des Eptamerides d'un Systême dans deux Octaves, & les nombres de celles d'un instrument dans l'étendue de tous les Sons qu'il rend. Ensuite en ôtant le nombre des Merides & des Eptamerides d'un Son, du nombre de celles d'un autre Son, l'on aura leur *Intervalle reciproque*, & faisant la même chose d'un Son à tout autre Son du même Systême ou Instrument, l'on aura tous leurs Intervalles reciproques.

L'usage des Intervalles reciproques est 1<sup>o</sup> de connoître si prenant un Son particulier du Systême ou de l'instrument pour Son fondamental, les Intervalles des autres Sons à celui-ci, sont des consonances, ou dissonances exactes ou altérées ; & si elles sont altérées, de combien est la difference. 2<sup>o</sup>. Quel est le Son qu'on peut prendre plus avantageusement ou plus commodément pour fondamental ou final d'un air proposé. 3<sup>o</sup>. En comparant les Sons reciproques d'un Instrument à touches réglées avec ceux d'un autre, l'on apercevra s'ils peuvent être d'accord, si les differences sont grandes ou petites, & si par art on peut rendre les Sons justes, lorsque la difference est petite.

Prenons pour exemple les touches du Clavecin ordinaire, dont chaque Octave en a 12. Pour avoir ses Intervalles reciproques, marquez de suite les Intervalles Diatoniques, & les Intervalles temperez par Merides de toutes

tes les touches de deux Octaves au Son fondamental, de cette forte.

*Intervalles Diatoniques.*

I. 2. II. 3. III. 4. IV. V. 6. VI. 7. VII.

*Intervalles par Merides.*

0. 3. 7. 11. 14. 18. 21. 25, (28.) 32. 36. 39.

*Intervalles Diatoniques.*

VIII. 9. IX. 10. X. 11. XI. XII. 13. XIII. 14. XIV.

*Intervalles par Merides.*

43. 46. 50. 54. 57. 61. 64. 68. (71.) 75. 79. 82.

Ensuite faites la Table suivante, dans laquelle la 1<sup>e</sup>. ligne marque les Intervalles Diatoniques. La 2<sup>e</sup>. les Noms anciens des Sons. La 3<sup>e</sup>. les Noms nouveaux ou du Système général. La 4<sup>e</sup>. les Intervalles reciproques au Son PA, [UT] qui sont les mêmes que ceux de la 1<sup>e</sup>. Octave marquée ci-dessus. La 5<sup>e</sup>. marque les Intervalles reciproques au Son pi, qu'on trouve en ôtant 3. Merides de toutes les Merides des Intervalles de la Table précédente. La 6<sup>e</sup>. les Intervalles reciproques au Son RA, qu'on trouve en ôtant 7 des Intervalles de la Table précédente, & ainsi des autres.

Nous avons mis la marque ( ) aux Intervalles Diatoniques alterez d'une Meride. Les autres Intervalles sont des Consonances ou Dissonances justes prises de la premiere Table de cette Section, ou plutôt de la Section VII.

L'on voit par cette Table, 1<sup>o</sup>. que si l'on prend RA & même LO pour Son fondamental  
ou

## Intervalles Diatoniques.

I. 2. II. 3. III. 4. IV. (5) V. 6. VI. 7. VII. VIII.

Noms Anciens.  
Noms Nouveaux.UT. d. RE. b. MI. FA. d. SOL. d. LA. b. SI. UT.  
PA. pi. RA. go. GA. SO. fa. BO. ba. LO. de. DO. PA.

## Sons fondamentaux des Intervalles reciproques.

|     |     |   |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|-----|-----|---|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| UT  | PA. | 0 | (3) | 7   | 11   | 14   | 18   | 21   | 25   | (28) | 32   | 36   | 39   | 43 |
| d   | pi. | 0 | 4   | (8) | 11   | (15) | 18   | (22) | 25   | 29   | (33) | 36   | (40) | 43 |
| RE  | RA. | 0 | 4   | 7   | 11   | 14   | 18   | 21   | 25   | 29   | 32   | 36   | 39   | 43 |
| b   | go. | 0 | (3) | 7   | (10) | 14   | (17) | 21   | 25   | (28) | 32   | (35) | 39   | 43 |
| MI  | GA. | 0 | 4   | 7   | 11   | 14   | 18   | 21   | 25   | 29   | 32   | 36   | 39   | 43 |
| FA  | SO. | 0 | (3) | 7   | (10) | 14   | 18   | 21   | 25   | (28) | 32   | 36   | 39   | 43 |
| d   | fa. | 0 | 4   | 7   | 11   | (15) | 18   | 21   | 25   | 29   | (33) | 36   | (40) | 43 |
| SOL | BO. | 0 | (3) | 7   | 11   | 14   | 18   | 21   | 25   | (28) | 32   | 36   | 39   | 43 |
| d   | ba. | 0 | 4   | (8) | 11   | (15) | 18   | (22) | (26) | 29   | (33) | 36   | (40) | 43 |
| LA  | LO. | 0 | 4   | 7   | 11   | 14   | 18   | 21   | 25   | 29   | 32   | 36   | 39   | 43 |
| b   | de. | 0 | (3) | 7   | (10) | 14   | 18   | 21   | 25   | (28) | 32   | (35) | 39   | 43 |
| SI  | DO. | 0 | 4   | 7   | 11   | (15) | 18   | (22) | 25   | 29   | 32   | 36   | (40) | 43 |

ou pour la finale d'un chant ou d'un air, tous les Intervalles Diatoniques temperez sont justes; que si l'on prend un autre Son pour finale, il y aura plus ou moins d'Intervalles alterez. 2<sup>o</sup>. Par cette Table l'on voit quel Son du Clavecin peut être le plus avantageux pour servir de finale à une piece qui seroit en Tierce majeure ou en Tierce mineure, ou dont les Intervalles justes ou alterez peuvent marquer plus pathetiquement la passion que l'on veut exprimer. 3<sup>o</sup>. Si l'on fait une semblable Table pour un Instrument dont on peut changer les Sons pour les pieces de differens modes, cette Table marquera les Sons qu'il faut hauser ou baisser. 4<sup>o</sup>. Si deux Instrumens differens doivent accompagner dans une piece de Musique, en faisant deux Tables des Intervalles reciproques pour ces deux Instrumens, l'on connoitra les Sons communs aux deux, les Sons qui sont differens, & la quantité de leur difference; d'où l'on connoitra ceux qu'on peut changer ou passer legèrement, & ceux qu'on doit éviter; ce qui sert de Principe pour la Composition.

## SECTION XII.

### *Maniere de trouver le Son fixe.*

**L**E *Son fixe*, c'est à dire le Son qui fait 100 vibrations dans une seconde, & dont on a donné les proprietes dans l'Histoire de l'Academie de l'année 1700 page 172, est d'un si grand usage dans l'Acoustique, & même dans la Musique, qu'il nous doit engager à chercher

cher tous les moïens de le connoître exactement pour lui comparer tous les autres : en voici deux.

Le 1<sup>er</sup> moien est en se servant d'une idée que le P. *Mersenne* Minime marque dans la proposition V. du 3<sup>e</sup> Livre des mouvemens & du Son des cordes\*, & selon laquelle dans la proposition XVII. du 3<sup>e</sup> Livre des Instrumens à cordes, il conclut les nombres des vibrations que les Sons de 8 Octaves font dans une seconde de temps ; il dit qu'ayant pris une corde d'Instrument longue de 17 pieds tendue par un poids de 8 livres, elle faisoit 8 vibrations dans une seconde. Suposant son experience exacte, il faudra faire cette regle de trois, comme 100 vibrations que fait le Son fixe dans une seconde, sont à 8 vibrations que fait cette corde dans le même temps ; ainsi la longueur de 17 pieds ou de 204 pouces de la corde, est à celle de 16 pouces  $3\frac{1}{2}$  lignes que doit avoir la partie de cette corde pour rendre le Son fixe.

Le second moien qui me paroît plus sûr, est en se servant de plusieurs tuyaux d'Orgue, qui étant ouverts ayent au moins deux pieds de long, & pour cela accordez les Sons de ces tuyaux par les Intervalles diatoniques suivans, qui soient si justes que l'oreille n'aperçoive pas le moindre battement dans ces Sons. Accordez 1<sup>o</sup>, l'Octave PA. pa. (UT. ut.) 2<sup>o</sup>, La Quinte PA, BOr (UT, sol) ou plutôt PA, BOr<sup>a</sup> ; car pour exprimer avec la précision requise les Intervalles de ces Sons, il faut y employer les decamerides. 3<sup>o</sup>, La Tierce majeure PA, GAn<sup>ũ</sup> (UT MI.) 4<sup>o</sup>, La tierce mineu-

re

\* Dans l'*Harmonie universelle*, imprimée en 1636.

re PA, *gose* (UT MI *b*). Après avoir bien vérifié ces Intervalles en comparant ces Sons réciproquement les uns aux autres, l'on aura enfin l'Intervalle juste du semi-ton mineur *gose*, GAnã (mi *b*, MI) dont le raport des vibrations est de 24 à 25; & en faisant jouer ces deux tuyaux, on entendra dans leurs sons un battement à chaque 25<sup>e</sup>. vibration du plus aigu GAnã (MI).

Si vous voulez que les battemens se fassent à chaque 50<sup>e</sup>. vibration du plus aigu, entre ces tuyaux *gose*, GAnã mettez en un moyen *g8ca*, qui soit tel que les battemens de *gose*, *g8ca* se fassent précisément dans le même temps que les battemens de *g8ca*, GAnã, ou des trois *gose*, *g8ca*, GAnã, qui feront en même temps 48, 49, 50 vibrations; au milieu des battemens de ces trois tuyaux on en entendra un petit causé par les extrêmes *gose*, GAnã.

Enfin si vous voulez que les battemens se fassent à chaque 100<sup>e</sup>. du plus aigu, entre les tuyaux *g8ca*, GAnã, mettez un moien *ganũ*, & pour avoir une plus grande preuve, entre *gose*, *g8ca*, mettez aussi le tuyau *guĩ*. Ces cinq tuyaux *gose*, *guĩ*, *g8ca*, *ganũ*, GAnã feront leur battement total aux 96, 97, 98, 99, 100 vibrations.

Pour mesurer la durée de ces battemens, servez-vous d'un pendule simple, dont chaque vibration soit isochrone, ou d'un temps égal à un battement de 100 vibrations du son GAn, ou à deux battemens de 50 vibrations, ou à quatre de 25 vibrations; mesurez la longueur du pendule (depuis le point de suspension jusqu'au centre de la ballé) \* avec la ligne de l'E-

cho-

\* Planche II.

chometre marquée *Pendule pour le son fixe*, si le pendule tombe sur o., le son *GAnã* sera le son fixe; autrement si le pendule tombe vers les sons aigus ou vers les sons graves de l'Echelle IV. vous aurez en Merides & Eptamerides l'intervalle du son *GAnã*, au son fixe. C'est pourquoi prenez sur un Monochorde l'unisson de *GAnã*, & éloignez-vous de ce son vers l'aigu ou vers le grave de la quantité marquée par le pendule, alors vous aurez le son fixe, qu'il faut enfin marquer sur un tuyau d'Orgue, ou sur un siflet qui vous servira dans la suite à trouver l'intervalle de toute sorte de sons à ce son fixe.

Pour être assuré d'avoir trouvé le son fixe, il faut 1<sup>o</sup>. avoir une oreille fine qui juge exactement des intervalles diatoniques justes. 2<sup>o</sup>. Il faut verifiser ces intervalles de toutes les manieres possibles, & donner aux tuyaux un vent égal. 3<sup>o</sup>. En comparant les battemens aux vibrations du pendule, pour être assuré qu'ils sont Ischrones, il faut comparer ces battemens à plus de 100 vibrations du Pendule. 4<sup>o</sup>. Si l'on fait cette experience dans les pays chauds, où les pendules à secondes sont plus courts qu'à *Paris*, sur chaque ligne de difference il faut ajoûter une demie Eptameride aux sons plus aigus que le son fixe, & l'ôter de ceux qui sont plus graves.

Comme ce son fixe est le même dans tous les temps & dans tous les lieux, il est très-utile pour les usages suivans. 1<sup>o</sup>. Ayant l'intervalle d'un son au son fixe, l'on connoît leur rapport par nôtre III. Table générale\*, & par conséquent combien ce son fait de vibrations dans

\* Planche I.



dans une seconde; & si l'on appelle le Son fixe PA, l'on saura le nom de ce son; aussi bien que la note qui l'exprime; & par ce moien l'on connoît le son absolu de tous les corps sonores, c'est-à-dire, le nombre des vibrations que fait ce son dans une seconde, ou son intervalle au son fixe, l'on connoît enfin le nom qui lui convient. 2°. Ayant trouvé le son absolu d'un corps sonore dans un temps, & le son qu'il a dans un autre temps, l'on connoît par le changement du son de ce corps, celui de sa substance; ce qui a son utilité pour la Physique. 3°. Les Mechaniques & l'Acoustique y trouvent aussi leurs avantages; car on saura combien le son le plus grave & le plus aigu, que l'oreille puisse appercevoir, font de vibrations par seconde; le chemin qu'une corde d'instrument fait par ses vibrations dans une seconde de temps, lorsque ce son est le plus foible ou le plus fort, en connoissant son intervalle au son fixe, & l'étendue de son ondulation; & enfin la quantité d'air que cette corde déplace par seconde.

La connoissance du son fixe & de nôtre Système général, qui divise l'intervalle des sons dans leurs plus petites parties, peut donner lieu à exprimer par notes les paroles & les chants qui ont peu d'étendue, comme d'un ton ou d'une tierce; ce qui donnera lieu à une nouvelle espece de Musique.

### *Addition à la Section VI.*

**D**ANS la voix il y a trois choses à considérer, son étendue, son degré d'aigu ou de grave; & sa partie.

Par

Par l'étendue d'une voix on entend la suite des Sons du Systême Diatonique qu'elle peut parcourir en chantant ; & cette étendue se marque par les Intervalles Diatoniques. Ainsi l'on dit qu'une voix n'a qu'une xie. d'étendue, & qu'une autre a jusqu'à une xvie. d'étendue ; nous désignerons cette étendue par deux fois la moitié de cet Intervalle, & pour avoir cette moitié, si l'Intervalle entier est impair, ajoutez 1, & prenez la moitié ; ainsi la moitié d'une xie. est une vie. Et si l'Intervalle entier est pair, ajoutez 2, & mettez le mot de *demi* à la moitié, ainsi la moitié d'une xvie. est une demi-ixe. ce qui signifiera qu'une xvie. est composée d'une viii<sup>e</sup>. & d'une ix<sup>e</sup>.

Par le degré d'une voix j'entends *le medium*, ou le Son moien de cette voix désigné par le nom de sa Note ; ainsi une voix est sub-BO, lorsque le milieu de cette voix est sub-Bo (sol) & qu'elle monte autant au-dessus de cette Note qu'elle descend au-dessous.

Par la partie d'une voix, j'entends ces deux choses jointes ensemble, c'est-à-dire le degré de la voix marqué par le nom du Son moien joint avec la moitié de son étendue. Ainsi nous dirons que la partie de la voix de *Madlle de la Lande* est LO Octave ; ce qui signifie que le milieu de sa voix est LO (la) & qu'elle monte au-dessus de LO, d'une Octave, & qu'elle descend au-dessous de la même quantité. De même la partie de M. *Du Four* est sub-DO demi-ixe ; c'est-à-dire que le milieu de sa voix est sub-DO (si) au-dessus duquel il monte d'une ix<sup>e</sup>. & descend d'une viii<sup>e</sup>. au-dessous du même Son.

D'où il suit qu'il y a autant de parties dans  
les

les voix que de Notes du Systême Diatonique, qui peuvent être les milieux de toutes les voix possibles ; & pour trouver ces Notes , il faut convenir de ces faits. 10. Que la voix la plus aigue monte au sem-DO (SI). Nous la suposerons monter jusqu'à bis-PA (UT) & que la voix la plus grave descend jusqu'au subbis-GA (MI). Je la suppose descendre jusqu'au subbis-PA, en sorte que le milieu de toutes les voix possibles sera le Son fondamental PA (C SOL UT).

20. L'étendue ordinaire des voix est supposée dans les portées du Plainchant être d'une ix<sup>e</sup>. ou de deux v<sup>es</sup>. & dans les portées de la Musique d'une xi<sup>e</sup>. ou de deux vi<sup>es</sup>. Les Compositeurs de Musique resserrent cette étendue tant pour empêcher qu'une partie ne se confonde avec sa voisine, que pour employer une voix dans ses Sons les plus agréables, & enfin pour trouver plus de voix qui puissent exécuter une partie au défaut l'une de l'autre. Dans nôtre Systême nous suposerons que l'étendue ordinaire d'une voix est d'une xi<sup>e</sup>. ou de deux vi<sup>es</sup>. & quand elle sera de plus ou moins d'une xi<sup>e</sup>. nous spécifierons la moitié de cette étendue. Ainsi nous dirons que la partie d'une telle voix est BO, pour signifier que le Son moyen de cette voix est BO, (G RE SOL) & que son étendue est de deux Sixtes, en sorte qu'elle monte d'une Sixte au-dessus de BO, & descend au-dessous de la même quantité, de même qu'une voix est PA Octave, pour dire que son milieu est PA (C SOL UT) & qu'elle monte & descend d'une Octave; enfin qu'une voix est sub-LO demi-vi<sup>e</sup>, lorsque son milieu est sub-LO (LA) qu'elle monte d'une vi<sup>e</sup>. & descend d'une vi<sup>e</sup>.

30. Supofant que la voix la plus aigue monte jufqu'au bis-PA , & que fon étendue foit d'une xie. ou de deux vies. Ôtant une Sixte de bis-PA , le milieu de la voix la plus aigue fera fem-GA. De même fupofant que la voix la plus grave defcende jufqu'au fubbis-PA , fi on lui ajoûte une Sixte , le milieu de la voix la plus grave fera fubbis-LO , & par conféquent les milieux de toutes les voix poffibles feront depuis fubbis-LO , jufqu'à fem-GA ; ce qui a l'étendue d'une xix<sup>e</sup>. ou de deux x<sup>es</sup>. ou enfin de 19 Notes. D'où nous conclurons qu'il y aura 19 parties dâns toutes les voix poffibles, dont les extrêmes font très-rares.

Voici l'ordre & le nom des parties fclon nôtre Syftême.

1. fem-GA (MI)
2. fem-RA (RE) *très-haut Delfus.*
3. fem-PA (Octave de C SOL UT) *haut Def-*
4. DO (SI) [*fus, ou premier Delfus.*]
5. LO (LA) *bas delfus, ou fecond Delfus.*
6. BO (G RE SOL) —
7. SO (Octave de F UT FA)
8. GA (MI) *très-haute contre.*
9. RA (RE) *haute contre.*
10. PA (C SOL UT) *très-haute taille.*
11. fub-DO (SI) *haute taille.*
12. fub-LO (LA) *Taille. [ou VIII<sup>e</sup>. concordant.*
13. fub-BO (Sous-octave de G RE SOL) *VIII<sup>e</sup>.*
14. fub-SO (F UT FA) *baffe taille.*
15. fub-GA (MI)
16. fub-RA (RE) *la baffe contre.*
17. fub-PA (Sous-octave de C SOL UT)
18. fubbis-DO (SI) *la baffe.*
19. fubbis-LO (LA)

Remarquez que comme nous avons réglé chaque partie dans l'étendue d'une XI<sup>e</sup>. ou de deux VI<sup>es</sup>. 1°. Si une voix a plus d'étendue, elle peut faire autant de parties qu'elle aura de Notes vers son milieu, éloignées de sa plus grave & de sa plus aigue au moins d'une Sixte. Ainsi une voix sub-DO demi-IX<sup>e</sup> peut faire les parties, 8. 9. 10. (11.) 12. 13. puisqu'elle peut monter d'une VI<sup>e</sup>. au-dessus de la plus aigue 8, & descendre d'une VI<sup>e</sup>. au-dessous de la plus grave 13. (Au reste ces parties extrêmes 13 & 8 ne peuvent être éloignées de la moyenne (11) que d'une VII<sup>e</sup> tout au plus.) De sorte que cette voix peut faire les parties suivantes *la très-Haute-contre, la Haute-contre, la très-Haute-taille, la Haute taille & la Taille*; néanmoins si cette voix est grêle, on ne lui attribue que les parties les plus hautes; & si elle est grosse, on ne lui donne que les plus basses auxquelles elle convient mieux. C'est pourquoi pour exprimer cette circonstance, nous dirons que la voix précédente est par exemple sub-DO-GA demi-IX<sup>e</sup>, pour marquer que son milieu absolu est sub-DO, & qu'elle monte à une IX<sup>e</sup>. & descend à une VIII<sup>e</sup>. mais que le milieu de sa belle voix est le GA prochain. Si cette voix étoit grosse, sa voix la plus agréable seroit dans les parties basses, ainsi elle pourroit être sub-DO-BO demi-IX<sup>e</sup>.

Remarquez en 2<sup>e</sup>. lieu, qu'en marquant la partie d'une voix il faut supposer qu'elle ne peut aller aux Notes extrêmes qu'en passant, & qu'elle ne peut s'arrêter que sur les moyennes. Ces notes extrêmes s'étendent à une ou deux, & quelquefois trois notes vers le terme aigu, & vers le terme grave, tantôt également & tan-

tôt inégalement. Enfin il y a des voix qui demandent à se promener sur certaines Notes vers un des termes, & ne s'y arrêter que rarement.

Remarquez en 3<sup>e</sup> lieu, que les parties des Voix marquées ci-dessus, regardent la disposition absolue de ces Voix ; mais les Compositeurs les considèrent ordinairement par rapport à la manière dont ils les font accompagner les unes avec les autres ; ainsi ils prendront pour *Dessus* & pour *Basse* deux voix, dont l'une sera par exemple une *Haute-contre*, & l'autre une *Taille*.

Dans la Musique ordinaire les parties sont marquées par les trois Clefs posées différemment sur les lignes d'une portée, ce qui fait absolument neuf parties différentes, qui sont équivoques dans l'étendue de la voix ; car par rapport à la situation des Clefs, deux parties voisines ont neuf Sons communs qui suffisent le plus souvent pour l'étendue d'une partie, qu'on peut par conséquent exprimer par ces deux Clefs.


Dans notre Système nous pouvons exprimer les parties de la voix de deux manières, 1<sup>o</sup>. en mettant devant la Clef la Note moienne qui marque la partie. 2<sup>o</sup>. En mettant devant la Clef deux Notes, dont l'une soit la plus aiguë, & l'autre la plus grave de celles que doit chanter une partie dans la pièce qu'elle commence, comme nous avons fait dans l'exemple pour la Musique, Section VI.

On peut marquer ces Notes mises devant les Clefs dans les valeurs qui conviennent à la mesure & à la durée que nous avons aussi mises devant les mêmes Clefs.











Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and noise.







DE LA  
CORRECTION  
GREGORIENNE

*Des mois Lunaires Ecclesiastiques.*

Par M. CASSINI.

LE dessein du Pape *Gregoire XIII.* dans la correction des mois Lunaires Ecclesiastiques fut de remettre les nouvelles Lunes, & les quatorzièmes Pascales au même état, où elles avoient été du temps du Concile de *Nicée*, d'où elles s'étoient éloignées depuis ce temps-là d'un peu plus de quatre jours.

C'est ce qu'il expose dans le Projet envoyé aux Princes Chrétiens, & aux Academies les plus célèbres l'an 1577. C'est aussi ce qu'il témoigne avoir pris soin de faire exécuter dans ses Lettres Apostoliques adressées à tout le Monde Chrétien l'an 1582. dans la publication de son Calendrier.

Comme le Concile de *Nicée* avoit entrepris de regler le temps de la Pâque, de sorte qu'elle pût être observée le même jour par toute la Terre, il ne faut pas douter qu'il n'ait eu soin de déterminer les nouvelles Lunes & les quatorzièmes Pascales de la manière la plus convenable à l'usage de l'Eglise.

L'on fait que ce Concile étoit composé de 318. Evêques de toutes les Nations, & qu'il y

avoit un concours d'autres Savans sous la protection de *Constantin* le Grand, le premier des Empereurs Chrétiens, qui y assista, & qui avoit fort à cœur que la Pâque fût célébrée d'une manière décente, & uniforme, ainsi qu'il paroît par la Lettre qu'il écrivit aux Evêques qui n'étoient point allés au Concile.

La plus grande partie du Monde Chrétien observoit depuis long-temps la regle Ecclesiastique de célébrer la Pâque en l'honneur de la Résurrection de N. Seigneur le Dimanche qui se rencontre depuis le 14. jusqu'au 21. du premier mois Lunaire du Printemps; au lieu que les *Juifs* devoient la célébrer en memoire de leur sortie d'*Egypte*, toujours au quatorzième de la Lune, sans aucun choix du jour de la semaine.

Mais tous ceux qui professoient d'observer la même regle Ecclesiastique, ne s'accordoient pas bien ensemble dans la détermination du premier mois, ni dans celle du premier jour de la Lune. Plusieurs Saints Evêques versés dans les Sciences divines & humaines avoient employé des cycles qui ne tenoient pas long-temps d'accord les nouvelles Lunes Ecclesiastiques avec les Astronomiques.

Saint *Hippolyte* Evêque de *Porto* les avoit réglées le siècle précédent par un cycle de 16. années *Juliennes*, où dans cet intervalle de temps les nouvelles Lunes Ecclesiastiques antici poient les Astronomiques de plus de trois jours. Saint *Anatolius* Evêque de *Laodicée* les avoit réglées par un cycle de 19. années différentes des années *Juliennes*, dont trois communes de 365. jours sont toujours suivies d'une Bissextile de 366. jours; au lieu qu'entre  
les

lès 19. années de ce cycle d'*Anatolius* il n'y en avoit que deux de 366. jours. Ainsi en un de ces cycles les nouvelles Lunes Ecclesiastiques antipoient les Astronomiques le plus souvent de trois jours. Il y avoit un cycle de 84. années qui n'éloignoit pas tant les nouvelles Lunes Ecclesiastiques des Astronomiques. Néanmoins en quatre de ces cycles, qui font 336. années il y auroit eu une anticipation de cinq jours, si on ne l'avoit pas corrigé auparavant. On avoit donc besoin d'un cycle encore plus conforme au mouvement du Soleil & de la Lune, où les nouvelles Lunes Ecclesiastiques fussent disposées d'une manière à ne pas tant s'éloigner des Astronomiques: C'est ce que l'on pouvoit faire en ce temps-là en se servant des Tables des nouvelles Lunes que *Ptolomé* avoit construites à *Alexandrie*, lesquelles étoient fondées sur la comparaison des observations des Eclipses de plusieurs siècles.

Saint *Ambroise* Docteur de l'Eglise dans la Lettre Pascale adressée aux Evêques de l'*Emilie* témoigne que le Concile de *Nicée* assembla les plus habiles dans le calcul, pour regler le cycle de 19. années; qui devoit servir à déterminer le temps de la Pâque; & S. *Cyrille* Evêque d'*Alexandrie*, qui conservoit les écrits authentiques de ce Concile, les envoyant aux Peres du Concile de *Carthage*, leur recommande de considerer attentivement les quatorzièmes Lunes mises en ordre par le Concile de *Nicée* dans le cycle de 19. années.

Ce cycle étoit composé de 19. années: *Julien*nes, qui l'une portant l'autre étoient censées presque égales à 19. années Solaires. Il

comprenoit 235. mois Lunairès , & ramenoit les nouvelles Lunes aux mêmes jours de l'année. Mais il ne pouvoit pas y ramener le Dimanche de Pâques n'étant pas composé de semaines entieres.

Cette fête ne pouvoit retourner aux mêmes jours de l'année par le même ordre qu'après 28. de ces cycles de 19. années qui composent la periode de 532. années, qui ne fut calculée que le siecle suivant par *Victorin d'Aquitaine*. On n'en détermina pas d'autres pour lors ; mais on chargea les Prélats d'*Alexandrie*, comme les plus versez dans cette Science , de déterminer tous les ans le jour de l'année , & le jour de la Lune auquel devoit arriver la Pâque, & de l'écrire à l'Eglise *Romaine*, qui par autorité Apostolique la devoit annoncer à l'Eglise universelle répandue par toute la Terre.

Il restoit encore à regler si le quatorzième de la Lune tombant en Dimanche on pourroit célébrer la Pâque le même jour , comme *S. Anatolius* dans son Canon Pascal l'annonçoit à la seconde , à la cinquième & à la dixhuitième année de son cycle inseré dans l'Ouvrage qui a merité l'éloge non seulement d'*Ensebe* , mais aussi de *S. Jérôme* ; & si le Dimanche tombant au quinzième de la Lune Pascale on ne différeroit point la Pâque au Dimanche suivant , comme *S. Hippolyte* faisoit dans son Canon Pascal suivant l'usage des *Latins*.

Le cycle de 19. années pouvoit servir également à ces usages différents , qui ne pouvoient pas subsister ensemble , puisque l'ordre du Concile de *Nicée* étoit que la Pâque fût célébrée par toute l'Eglise dans le même jour.

Les



Les *Alexandrins* préférèrent aux autres coutumes celle de célébrer la Pâque le premier Dimanche après le 14, la transférant au Dimanche suivant lorsque le quatorzième arrive le Dimanche: La raison que *Theophile*, *S. Cyrille*, *S. Ambroise* & *S. Protere* en rendent, est tirée de la coutume de ce temps-là, de rompre le jeûne le soir du Samedi Saint, ce que l'on ne devoit pas faire le treizième de la Lune, & de jeûner le 14<sup>e</sup>, ce que l'on ne devoit pas faire le Dimanche de Pâque.

La raison que des modernes en rendent, qui est pour ne jamais concourir avec les *Juifs*, n'est pas celle qui étoit alleguée par les premiers qui établirent cet usage.

On prit pour première année du cycle qui couroit au temps du Concile de *Nicée* la 39<sup>e</sup>. année de l'Empire de *Diocletien*, qui étoit éloignée de deux cycles entiers de cette époque, d'où l'on comptoit alors les années, & précédait de deux années le Concile, qui se tint l'an 325. de *Jésus-Christ*.

Les premières années des cycles de *Theophile*, de *Saint Cyrille*, de *Denis le Petit* & de *Be-de* sont toutes éloignées de la même époque d'un nombre de cycles entiers. Mais *Denis* ne pouvant souffrir que dans l'usage de l'Eglise on renouvelât toujours la mémoire de *Diocletien*, compta de cette époque en arrière quinze cycles, qui font 285. années, pour s'approcher de la Naissance de *Jésus-Christ*, & y établir l'époque des cycles. C'est celle que nous appellons présentement l'année de *Jésus-Christ*, ou la première année avant *Jésus-Christ*, qu'il prit pour première année des cycles, qui sont dans l'ordre de ceux du Concile de

*Nicée*, continue jusqu'à présent sans interruption.

Après qu'on eut pris pour jour de l'Equinoxe Ecclesiastique du Printemps le 21. de Mars, où l'Equinoxe Astronomique arrivoit le plus souvent en ce temps-là; au lieu du 25. de ce mois, que le Concile de *Cesarée* avoit emprunté de *Jules-Cesar*; on prit pour premier jour du mois Pascal de la premiere année du cycle le jour de la conjonction moienne de la Lune avec le Soleil, qui arriva l'an 323. troisième après la Bissextile le 23. de Mars un peu après le coucher du Soleil à *Alexandrie*. On la trouve à la même heure par les Tables de *Ptolomée*, qui avoient été calculées à ce meridien.

On préfera ce jour, dans lequel la conjonction moienne étoit arrivée si tard, au jour suivant. Ajoûtant treize jours au 23. de Mars, on eut pour quatorzième de la Lune Pascale le 5. d'Avril, qui précéda la pleine Lune astronomique de deux jours. La même anticipation arriva la cinquième année du même cycle, deux ans après le Concile.

Le cycle suivant, qui devoit commencer l'année 342, seconde après la Bissextile, la conjonction moienne devoit arriver sept heures & demie plutôt; & après avoir ainsi rétrogradé à proportion par trois cycles jusqu'au soir du 22. de Mars de l'année 380; l'année 399. premiere du cinquième cycle, elle devoit arriver vers le midi du 23. de Mars. Voilà la variation qui devoit arriver assez régulièrement au siecle du Concile de *Nicée* aux heures de la conjonction moienne aux premieres années des cycles, outre celle qui devoit arriver à diverses

ses années d'un cycle. La même variation devoit arriver au plein de la Lune à l'égard de la quatorzième Pascale qui la précédait souvent de plus d'un jour dans la première année du cycle.

Quoique l'on appelle quelquefois plein de la Lune le quatorzième, à cause de la proximité de cette phase, dont le changement est plus lent que celui de toute autre phase; on prend aussi pour plein de la Lune le quinzième, ou le seizième jour. Saint *Augustin* le fait au Livre sur la *Genèse*. C'est aussi la variation qui résulte des quatorzièmes *Nicénes* de divers cycles dans un même siècle, étant comparées avec les pleines Lunes astronomiques.

Ce n'étoit pas un usage nouveau, de prendre pour premier jour de la Lune le jour même de la conjonction astronomique en quelque heure qu'elle pût arriver. On le pratiquoit au premier siècle de l'Eglise, tant à *Rome* qu'à *Jérusalem*. *Plin*, Auteur de ce temps-là, prend pour axiome, que les éclipses du Soleil arrivent le premier jour de la Lune; *Luna novissima & prima*. Ce que *Thucydide* avoit fait plusieurs siècles auparavant. *Jules-César* avoit aussi pris pour premier jour de la Lune le premier jour de l'année *Julienne*, où la nouvelle Lune arriva le même jour au coucher du Soleil à *Rome*.

*Joseph* Historien célèbre parmi les *Juifs*, fait le rapport de quelques fêtes célébrées de son temps à *Jérusalem*, qui par la loi divine se célébroient en certains jours de la Lune, & comparées avec les Tables astronomiques, font voir qu'ils prenoient alors pour premier jour de la Lune le jour même de la conjonction

490 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
astronomique, quoique cela n'arrivât pas tous  
jours.

Car autant que l'on peut vérifier par l'Ecriture-sainte, sans s'arrêter à ce qu'y ajoutent *Philon* & *Joseph*, & d'autres Auteurs Juifs ver-  
sez dans les Sciences des Grecs après l'Empire  
d'*Alexandre* dans l'Orient, on ne voit pas en  
aucun endroit qu'ils fussent obligez par les  
Loix divines à aucune précision astronomique,  
eux qui n'avoient pour toute loi que de pren-  
dre pour premier mois du Printemps le mois  
des fruits nouveaux, & de faire la Pâque le  
quatorzième de ce mois.

C'étoit une détermination assez vague, qui  
leur laissoit la liberté d'un choix plus précis.  
Ils le firent lorsqu'à l'imitation des Astrono-  
mes ils prirent l'équinoxe pour le commence-  
ment du Printemps, & pour premier du mois  
le jour de la conjonction de la Lune avec le  
Soleil dans un temps que l'Astronomie étoit  
encore dans une grande imperfection.

Il n'est pas facile de représenter les circons-  
tances du temps de la Mort & de la Résurrec-  
tion de N. Seigneur, suivant les Evangelistes,  
& la tradition ancienne de l'Eglise, sans sup-  
poser que la quatorzième Judaïque précédoit  
de plus d'un jour la pleine Lune astronomi-  
que. Le savant P. *Bucher* dans son Commen-  
taire sur le Canon de *Victorius*, après plusieurs  
célèbres Chronologistes, trouve la Passion de  
Nôtre-Seigneur au quatorzième de la Lune  
Judaïque un Vendredi, la 31<sup>e</sup> année vulgaire  
de *Jésus-Christ*, le 23 Mars. En cette année  
la pleine Lune moienne arriva le 26 Mars un  
peu après le minuit suivant à *Jerusalem*, plus  
de deux jours après la quatorzième Judaïque  
&

& Victorienne de la même année. C'est-pourquoi ceux qui s'imaginent une quatorzième Judaïque, qui ne précède que d'un jour la pleine Lune astronomique, avec laquelle il ne faille point que la quinziesme déterminée par nôtre methode concoure jamais, auroient de la peine à produire des loix authentiques de cette détermination.

L'année qui suivit immédiatement le Concile de *Nicée*, eût la quatorzième Pascale le 2 d'Avril, la Pâque le 3, la pleine Lune astronomique arriva le 4. au matin. Les Saints Peres n'étoient pas pour cela des Quartodecimans, & ne judaïssoient point, quoique l'on prenne souvent pour quatorzième le jour qui précède la pleine Lune astronomique. Nous devons présentement ne pas célébrer la Pâque le jour que nous prenons pour quatorzième du mois Pascal, comme devoient faire toujours les *Juifs*; mais nous la devons célébrer le Dimanche qui suit nôtre quatorzième, sans nous mettre en peine si ce Dimanche concourt ou non avec la quatorzième déterminée par d'autres methodes plus ou moins conformes à l'astronomique, que les *Juifs* pourroient observer. C'est une précaution que le Concile de *Nicée* ne jugea pas devoir prendre, & que nous ne voyons pas prescrite par d'autres Conciles, comme quelques Modernes le supposent. Nous savons que dans le Concile de *Rome* tenu un peu après celui de *Nicée* avec un nombre peu inférieur d'Evêque, le Pape saint *Silvestre* confirma de sa propre bouche avec un applaudissement universel tout ce qui avoit été fait dans le Concile de *Nicée* pour l'édification de l'Eglise; & saint *Cyrille* témoigne qu'il fût arrêté

dans tous les Synodes qu'aucune Eglise, Ville, ou Province ne feroient rien qui fût contraire à ce que le Concile de *Nicée* avoit réglé sur la Pâque. Les saints Peres & Docteurs de l'Eglise du même siecle & du suivant, qui ont écrit de ces matieres après *Theophile* & saint *Cyrille*, & particulierement saint *Ambroise*, saint *Augustin*, saint *Protere*, & saint *Leon* le Grand, ont toujours consulté la détermination du Concile de *Nicée* sur la Pâque, & y ont acquiescé dans les difficultez qui se sont présentées.

Après avoir établi la nouvelle Lune Pascale de la premiere année du cycle au 23 de Mars, que l'on marqua dans le Calendrier par le nombre d'or I, l'on détermina les nouvelles Lunes Pascals des autres années d'une maniere facile & simple, proportionnée à la capacité populaire, à laquelle on jugea qu'il falloit avoir plus d'égard qu'à la subtilité scrupuleuse de l'Astronomie; ce que l'on fit à l'imitation des Anciens par l'anticipation d'onze jours par année, qui est l'épacte Lunaire civile; au lieu que l'épacte astronomique est de 10 jours, 15 heures, 11 minutes aux années communes, & un jour de plus aux Bissextiles. Par cette maniere on eût le 12 de Mars pour nouvelle Lune de la seconde année du cycle, où l'on mit le nombre d'or II, & le premier Mars pour la troisieme année, où l'on mit le nombre d'or III; mais cette nouvelle Lune n'étoit pas prise pour Pascale, parce qu'elle précédoit de plus de 14 jours le 21 de Mars assigné à l'Equinoxe. On y ajoûtoit 30 jours pour un mois plein surnumeraire, qui se termine au 31 Mars, où l'on mit le même nombre d'or III. Ce mois surnumeraire ajoûté aux autres fait une année  
em-

embolismique de 13 mois, dont l'usage est supposé si ancien, que saint *Cyrille*, & *Isidore* l'attribuent à *Moïse*.

En continuant cette operation uniformément, la 19<sup>e</sup> année, après le septième mois surnumeraire de 30 jours, on trouvoit la nouvelle Lune Pascale au 4 d'Avril. La vingtième année, qui est la première d'un autre cycle, on l'auroit trouvé au 24. de Mars, un jour plus tard qu'il ne falloit pour l'avoir au même jour qu'à la première année du cycle. Mais on reprenoit le 23. de Mars par l'addition d'un jour à l'Épacte ordinaire. On appelle cette addition extraordinaire, le saut de la Lune.

Les Épactes qui se prenoient du 23. de Mars en arriere, & qui ont servi aux Anciens à disposer les nombres d'or dans le Calendrier, sont marquées dans les Tables de *Bede* à toutes les années de chaque cycle.

Dans la Correction *Gregorienne* on a trouvé plus commode de compter les Épactes du Calendrier du 31. de Mars en arriere; de sorte qu'au 23. de Mars, qui précède le 31. de 8. jours, l'Épacte *Gregorienne* est 8; c'est celle qui suivant les Tables des Equations inserées dans le Canon second du Calendrier, & dans le Livre de l'Explication, doit être attribuée au nombre d'or I. au siècle du Concile de *Nicée*.

Les Épactes disposées dans le Calendrier *Gregorien* à tous les jours du mois de Mars marquent le nombre des jours, dont les nouvelles Lunes anticipent le 31. de ce mois, c'est pourquoi elles y sont placées jour par jour par ordre retrograde; l'Épacte 1. au 30. qui anticipe le 31. d'un jour; l'Épacte 29. au 2. de Mars, qui anticipe le 31. de 29. jours.

Le premier d'Avril a l'Epacte 29. suivant la disposition de *Clavius* qui est ici préférable à celle de *Lilius*, étant équivalente à la disposition ancienne des nombres d'or conforme à l'intention du Pape. Les Epactes suivantes en Avril diminuent aussi selon l'ordre retrograde jusqu'au 4. de ce mois, où il y a double Epacte aussi bien qu'au 5. L'usage, en est expliqué dans les préceptes, dont on n'a besoin que d'ici à deux cens ans.

Suivant la disposition présente des Epactes, les mois Lunaires, qui commencent par un des cinq premiers jours de Mars, sont toujours pleins de 30. jours, comme anciennement, & demandent la même Epacte après 30. jours. Mais ceux qui commencent après le 6. de Mars sont caves comme anciennement, & demandent la même Epacte après 29 jours. Celui qui commence par le 6. de Mars est présentement ambigu. Il est ordinairement plein comme anciennement; mais quand une nouvelle Lune est arrivée onze ans avant au 7. de Mars, qui n'avoit point de nombre d'or anciennement, on fait ce mois cave.

On a disposé toutes les Epactes dans le Calendrier par ces regles, observant toujours l'alternative des mois pleins & caves, si ce n'est qu'on fait cave le mois qui commence au 2. de Decembre la dernière année du cycle, quoiqu'il succède à un autre cave.

Il restoit anciennement aux nouvelles Lunes Ecclesiastiques disposées dans le cycle de 19. années un peu de retardement, qui après quatre siècles devint fort sensible. *Bede* témoigne qu'on voyoit à son temps la dernière année du cycle le croissant de la Lune deux jours



jours avant la nouvelle Lune Ecclesiastique. Il croyoit que la même chose arrivoit du temps du Concile de *Nicée*, qui pouvoit avoir observé ce retardement extraordinaire. Il établit des regles sur cette hypothese mal fondée, qui n'a pas laissé de faire impression sur l'esprit de plusieurs, qui ont crû que les nouvelles Lunes qui arrivent après le coucher du Soleil se doivent attribuer au jour suivant, & que les nouvelles Lunes Ecclesiastiques doivent toujours retarder à l'égard des Astronomiques. Nous savons présentement qu'il n'y avoit pas la moitié de cette difference au temps du Concile de *Nicée*, mais qu'elle étoit montée à ce point dans la suite des siècles.

Suivant les Tables modernes, verifiées par la comparaison des observations anciennes avec les plus récentes, après 76. années *Juliennes*, il reste aux nouvelles Lunes Astronomiques une anticipation de 5. heures 50. minutes 12. ou 13. secondes. Comme cette anticipation n'étoit pas encore établie avec une entière évidence au temps du Concile de *Nicée*, non plus que la difference entre l'année *Julienne* & l'année Solaire; & que par les Tables de *Ptolomé* elle ne montoit à un jour entier qu'en 314 années *Juliennes*, elle fut alors negligée.

Mais depuis ce temps-là jusqu'à l'année 1575. on trouva que les années Solaires antici poient presque de 10 jours les années *Juliennes*, & que l'anticipation des nouvelles Lunes Astronomiques dans le cycle de 19 années montoit à quatre jours. Ainsi pour remettre les années & les nouvelles Lunes Ecclesiastiques autant d'accord avec les Astronomiques qu'elles l'étoient au siècle du Concile de *Nicée*,

*cée*, il falloit retrancher 10 jours à l'année *Ju-lienne*, & augmenter les Epâctes attribuées aux mêmes nombres d'or de 4 jours. C'est ce que le Pape *Gregoire XIII.* proposa de faire dans son projet dressé l'an 1577, & qu'il supposa avoir été executé dans sa Bulle de la publication du Calendrier.

Après avoir arrêté qu'on ôteroit dix jours à l'année 1582. & établi que les centièmes années, à la reserve des quatre centièmes après *Jesus-Christ*, ne seroient point Bissextiles, on projetta de regler cette augmentation, que l'on appelle Equation des Epâctes, en cette maniere.

On prit pour époque des équations lunaires la premiere année de *Jesus-Christ*; & l'on assigna aux premieres années des cycles du premier siècle de *Jesus-Christ* & des deux suivans 7 jours d'épacte. C'est ainsi qu'on la tire des Tables des équations inserées dans le *Projet Gregorien*, & dans celle qui est inserée dans le second Canon du Calendrier.

Suivant le *Projet Gregorien* on devoit augmenter les Epâctes d'un jour de 300. en 300. années *Juliennes* jusqu'à l'an 2400, d'où l'on devoit transferer cette équation à l'année 2500. Dans cet intervalle de temps, l'augmentation des épâctes, qu'on appelle équation de la Lune, aux mêmes années des cycles auroit été de 8 jours, précisément conforme à l'Astronomie.

Au temps du Concile de *Nicée*, qui fut l'an 325. de *Jesus-Christ*, l'épacte devoit être de 8 jours aux premieres années des cycles, comme on la tire des mêmes Tables.

Depuis le Concile jusqu'au siècle de la Correction

rection *Gregorienne* en 1200 ans les épaques lunaires aux années *Juliennes* auroient augmenté de quatre jours sous le même nombre d'or, comme le Pape *Gregoire XIII.* le suppose dans son Projet & dans la Bulle. Ayant ajouté ces quatre jours à l'épacte 8, on auroit eu l'épacte 12 sous le nombre d'or I pour le seizième siècle, & pour les deux suivans.

Après la Correction *Gregorienne* on se sert encore de la même épacte, qui convient aux années *Juliennes*; mais on doit tenir compte des dix jours ôtez à l'année 1582. & des autres jours ôtez aux centièmes années non Bissextiles, comme est le jour que l'on a ômis au mois de Février de l'an 1700, qui présentement fait monter la difference entre les années *Juliennes*, & les *Gregoriennes* à onze jours. C'est l'Equation appelée du Soleil, qu'on doit toujours ôter de l'épacte lunaire dûe aux années *Juliennes*, empruntant un mois de 30 jours, quand il le faut. Ayant ôté cette Equation Solaire de l'épacte 12 trouvée ci-dessus pour trois siècles, reste l'épacte 1 sous le nombre d'or I pour le siècle présent depuis l'an 1700.

Cependant on n'attribue présentement au nombre d'or I. que l'épacte zero marquée par une étoile, qui est moindre d'un jour, que celle que les regles *Gregoriennes* demandent. De même toutes les autres épaques attribuées présentement aux autres nombres d'or sont diminuées d'un jour à l'égard de celles que les mêmes regles demandent au siècle présent.\*

La cause de cette diminution est, parce que dans la continuation de la nouvelle Table des Equations insérées dans le second Canon du Calendrier, à laquelle on s'est réglé, on n'a  
suivi

suivi la Table du Projet *Gregorien* qu'aux six premiers siècles après l'Epoque de *Jesus-Christ*. Pour les autres siècles suivans, après l'Equation lunaire faite à l'année 320. de *Jesus-Christ*, on n'en a fait qu'aux années 800, 1100, 1400, sans en faire à l'an 1700. d'où on a differé cette Equation à l'année 1800. Ainsi dans l'espace de 1480. dans la nouvelle Table des Equations, il y a un intervalle de 480, deux de 300, & un de 400; au lieu que suivant la regle *Gregorienne* conforme à l'Astronomie pour un intervalle de 400 années entre les Equations lunaires il y en doit avoir sept de 300 années, afin d'avoir 8 jours d'augmentation des Epâctes lunaires en 2500 années.

La diminution des Epâctes retarde les nouvelles Lunes & les quatorzièmes, comme leur augmentation les fait anticiper. Ainsi puisque dans la nouvelle Table on n'a augmenté que de trois jours les Epâctes lunaires depuis le Concile de *Nicée* jusqu'à present, on n'a anticipé les nouvelles Lunes & les quatorzièmes que de trois jours, au lieu de quatre que le Pape *Gregoire XIII.* demandoit.

Toutes les pleines Lunes inserées dans la grande Table des Fêtes mobiles aux centièmes années non Bissextiles y sont marquées un jour plus tard que ne les donnent les Tables astronomiques employées dans ce calcul, ce qui aura empêché de voir le retardement excessif des quatorzièmes Pascales de ces années, d'où dépendent celles de tout le siècle suivant.

Un jour de retardement des quatorzièmes de la Lune fait retarder la fête de Pâque d'une semaine, lorsque la quatorzième Pascale arrive un Samedi; car alors on doit faire la Pâque

le jour suivant qui sera Dimanche ; au lieu que retardant d'un jour quatorzième , elle tombe le Dimanche , & oblige à transférer la Pâque au Dimanche suivant.

Au contraire le même retardement d'un jour fera anticiper la Pâque d'un mois lorsque la quatorzième tombera au 20 de Mars avant l'Equinoxe Ecclesiastique. Car cette quatorzième doit être attribuée au dernier mois d'hiver , qui n'étant pas un mois Pascal oblige d'attendre le quatorzième du mois suivant ; au lieu que prenant pour quatorzième le 21 de Mars à la place du 20, on attribuera cette quatorzième au mois Pascal , & l'on célébrera la Pâque le Dimanche qui suit immédiatement.

Par toutes les Tables Astronomiques l'année 1700 première des centièmes non Bissextiles , la pleine Lune moyenne arriva le 23. de Mars *Julien*, qui fut le 3 d'Avril *Gregorien* vers les 11 heures après midi à Rome. Le 14 de la Lune , suivant l'Epaëte *Gregorienne* du Projet & de la Bulle, devoit être le 3 d'Avril qui fut un Samedi ; le 4 d'Avril , qui fut Dimanche devoit donc être le jour de Pâque. Mais dans la Table des Fêtes mobiles la même pleine Lune moyenne fut marquée au 4 d'Avril, un jour plus tard que par les Tables astronomiques , & le quatorzième de la Lune au 4 d'Avril , c'est pourquoi la Pâque fût différée au Dimanche suivant, qui fut le 11 d'Avril.

L'an 1704 la pleine Lune moyenne arrivera le 20 Mars à 11 heures après midi. Suivant l'Epaëte *Gregorienne* du Projet & de la Bulle le quatorzième de la Lune arrivera le 20 Mars , qui n'est point du mois Pascal. Il faudroit donc attendre le quatorzième de la Lune prochain-

chaine , qui sera le 18 d'Avril , & célébrer la Pâque le Dimanche suivant , qui sera le 20 d'Avril. Mais dans la Table des Fêtes mobiles le quatorzième de la Lune est marqué au 21 de Mars , & la Pâque le Dimanche suivant 23 de Mars , qui précède le 20 d'Avril de quatre semaines.

Nous avons été obligez d'indiquer à *Rome* cette difference dans le temps que les Princes du *Nord* , qui ont reçu depuis peu le Calendrier *Gregorien* dans l'usage civil , faisoient examiner si ce Calendrier est assez conforme aux regles Astronomiques pour être préféré aux autres que l'on pourroit inventer pour l'usage Ecclesiastique. Nous avons aussi été obligez d'indiquer l'origine de cette difference , & particulièrement aux siècles présens & aux autres à venir , pendant que dans la Congregation instituée à cet effet par Nôtre S. Pere le Pape on examine si elle peut être tolérée , ou si l'on doit suivre à l'avenir la regle du Projet *Gregorien* conforme à la Bulle de la publication du Calendrier.

En ce cas il n'y auroit rien à changer dans la distribution présente des Epâctes aux jours du Calendrier. Car les Epâctes , que la Table de leurs Equations inserée dans le Canon 2 donne aux nombres d'or au siècle du Concile de *Nicée* , montrent dans le Calendrier les nouvelles Lunes de toutes les années du cycle , aux mêmes jours qui leur furent assignez par ce Concile , & par conséquent telles que le Pape *Gregoire* demandoit.

L'Auteur de ce Canon , qui pour les siècles courans , depuis la correction , donne les Epâctes différentes de l'intention du Pape déclarée.

rée expressement dans la Bulle, dit que ces Epactes ont été mises exprès dans le Calendrier dans une disposition qui donne quelquefois les nouvelles Lunes un peu plus tard qu'il ne faut, de peur de célébrer la fête de Pâque avec les Heretiques quartodecimans le quatorzième de la Lune, ou avant. Mais puisque cette disposition représente exactement toutes les nouvelles Lunes établies par le Concile de *Nicée*; elle représentera comme il faut celles des siècles courans, si on attribue aux nombres d'or les Epactes qui conviennent à la Bulle de *Gregoire XIII.*

Pour ce qui est de la crainte de concourir avec les Quartodecimans, on ne concourra jamais avec eux, s'ils prennent pour quatorzièmes les mêmes jours que nous prenons, pour nous conformer à l'usage du Concile de *Nicée*. Ce sont ceux que nous devons reconnoître pour quatorzièmes Ecclesiastiques legitimes, après lesquels nous célébrons toujours la Pâque.

La Table perpetuelle du cycle des Epactes inserée dans le second Canon resteroit aussi en son entier. La Table de l'Equation du cycle des Epactes seroit corrigée de sorte qu'entre huit intervalles des Equations lunaires il y en eut toujours sept de 300 années, & un de 400. Cependant l'on prendroit les Tables particulieres des Epactes assignées aux nombres d'or pour les siècles courans dans le *Projet Gregorien.*

Si l'on observe les regles du *Projet*, lorsque les nouvelles Lunes astronomiques arriveront aux mêmes jours de l'année *Gregorienne* qu'elles étoient arrivées au siècle du Concile de *Nicée*

cée aux années *Julienues* correspondantes, les nouvelles Lunes Ecclesiastiques arriveront aussi ordinairement aux mêmes jours que les nouvelles Lunes Ecclesiastiques établies par le même Concile de *Nicée*. Nous en avons un bel exemple dans les nouvelles Lunes qui arriveront depuis l'année 1900, jusqu'à l'année 2099. Les Astronomiques arriveront aux mêmes jours des années *Gregoriennes*, & aux heures que celles qui arriveront depuis l'an 268, jusqu'à l'année 467 de *Jesus-Christ*, qui comprennent le temps du Concile de *Nicée*.

Alors la regle de *Gregoire XIII.* donne les nouvelles Lunes Ecclesiastiques aux mêmes jours des années correspondantes *Gregoriennes*, à la reserve de celles des deux dernieres années de chaque cycle, qui retardent d'un jour, pendant que celles de la Table qui est en usage présentement retardera de deux jours en ces deux années, & d'un jour en seize années n'y ayant qu'une année dans chaque cycle qui donne les nouvelles Lunes conformes aux anciennes.

La cause de la difference d'un jour, qui reste en ces deux années du cycle, vient de ce que le fault de la Lune, qui se faisoit entre la dernière année du cycle, à laquelle la Table des Equations donne l'Epaacte 26, & la première année du cycle suivant, à laquelle répondoit l'Epaacte 8, ne se fera plus aux mêmes Epaactes qui déterminent les nouvelles Lunes, ces Epaactes n'appartenant plus aux mêmes années des cycles. Si le fault de la Lune se faisoit encore de l'Epaacte 26 à l'Epaacte 8, comme anciennement, non seulement la plupart, mais toutes les nouvelles Lunes Ecclesiastiques déterminées par la methode

*Gre-*



*Gregorienne* dans ces siècles que nous venons de marquer, arriveroient aux mêmes jours qu'elles furent marquées aux années correspondantes du siècle du Concile de *Nicée*, qui est l'uniformité à laquelle aspiroit le Pape *Gregoire XIII.*

Dans la Correction *Gregorienne* on n'a rien changé à la methode du Concile de *Nicée*, de tirer les nouvelles Lunes des années suivantes de celles des précédentes dans le cours de 100, ou de 200 années. Quelque variation que cette methode souffre pendant un ou plusieurs cycles de 19 années, on trouve ces nouvelles Lunes Ecclesiastiques autant conformes aux Astronomiques qu'il suffit pour l'usage de l'Eglise. On n'en a jamais introduit dans cet usage d'autres qui leur soient plus conformes, si on les détermine par les Epâctes assignées aux nombres d'or dans le *Projet Gregorien*, & par leur disposition dans le Calendrier de la maniere qu'elle est réduite présentement.

On n'a introduit de nouveau d'autre variation à l'égard de la methode ancienne, que celle de substituer 30 Epâctes dans le Calendrier à la place des 19 nombres d'or; & d'augmenter, ou diminuer d'un jour les Epâctes aux centièmes années, comme demandent les découvertes sur les mouvemens du Soleil & de la Lune faites depuis le Concile de *Nicée*. Ce que l'on a fait pour tenir les nouvelles Lunes Ecclesiastiques aussi proche des Astronomiques aux siècles à venir, qu'elles l'étoient au siècle du Concile de *Nicée*, & aux deux siècles suivans.

Les Equations aux centièmes années de la maniere qu'elles sont prescrites dans le *Projet Gre-*

*Gregorien*, sont regulieres & uniformes, & se peuvent pratiquer aisément sans Tables & sans Livres, qui est la facilité qui convient à l'usage de l'Eglise.

Il n'en est pas de même de celles qu'on leur a substituées, qui n'ont pas la même regularité & uniformité.

Au reste, les termes des nouvelles Lunes Pascales depuis la correction du Calendrier, sont aux mêmes jours de l'année *Gregorienne*, qu'ils étoient auparavant dans la *Julienne*. Le premier au huitième de Mars, le dernier au 5 d'Avril. Le premier terme des quatorzièmes Pascales au 21 de Mars, jour assigné à l'Equinoxe; le dernier au 18 d'Avril. Le premier terme de Pâque au 22 de Mars, le dernier au 25 d'Avril, comme il résulte de la détermination des *Alexandrins*.

Ce dernier terme, auquel la Pâque n'arrive que rarement, ne fut pas reçu du commencement sans contestation, parce qu'il excédoit le limite du Concile de *Cesarée* qui étoit le 21 d'Avril. Mais *S. Ambroise* à l'occasion de la Pâque de l'an 387 qui étoit annoncée à ce terme pour la première fois, étant consulté là-dessus par des Evêques de l'Eglise *Romaine*, jugea qu'en la considérant attentivement, elle se trouvoit conforme à l'intention du Concile de *Nicée*. Et *S. Leon* Pape à l'occasion de la Pâque de l'an 455 qui dans le Canon Pascal dressé l'an 380 par *Theophile* Evêque d'*Alexandrie*, étoit marquée au 24 d'Avril, & dans les Annales de *Rome* au 17 de ce mois, fit examiner ce Canon en *Egypte* par l'entremise de l'Empereur *Marcien*; & après le rapport de cet Empereur &

& de *S. Protere* alors Evêque *Alexandrie*, il aimait mieux se conformer aux *Alexandrins*, que tolérer une diversité dans cette grande Fête.

En ce tems-là *Victorin d'Aquitaine* ayant été employé par *Hilaire* Archidiacre de *Rome*, à dresser le Canon Pascal, lorsque les *Alexandrins* transféroient la Pâque du 18 au 25 d'Avril, ne laissoit pas de la marquer aussi au 18 de ce mois, afin que le Pape pût choisir lequel de ces deux jours il trouveroit le plus convenable pour la célébration de cette Fête. Mais il prenoit pour seizième de la Lune ce même jour que les *Alexandrins* suivaient le Concile de *Nicée* prenoient pour quatorzième. C'est pourquoi l'on préféra la méthode *Alexandrine*, pratiquée dans les Cycles de *Theophile* & de *S. Cyrille*, qui furent continuez par l'Abbé *Denis* de la même manière, comme la plus conforme à la disposition de ce Concile.

Elle a été suivie dans la Correction *Gregorienne*, qui n'a eu d'autre objet que de se conformer à l'intention du Concile de *Nicée*.

*Fin des Memoires.*

# CATALOGUE

## DES

### LIVRES,

Qui ont été imprimez en 1701. & qui se trouvent à Amsterdam chez GERARD KUYPER à un prix raisonnable.

#### A.

- A** Bregé Chronologique de l'Histoire de France, par François de Mezeray N. Ed. augmentée de quelques pieces Originales & de l'Abregé de la Vie des Reines par l'Auteur. 7 voll. *in* 12. *fig.*  
 les Actes des Apôtres en Latin & en François sur la vulgate, traduits par Mr. de Sacy. 8 voll. *in* 12.  
 Annales de la Cour & de Paris, pour les Années de 1697. & 1698. 2 voll. *in* 12.  
 l'Année Chrétienne, contenant les Messes Votives de toute l'année en Latin & en François. *in* 12.  
 Arlington (le Comte d') ses Lettres au Chevalier Temple, contenant une Relation exacte des Traitez de l'Evêque de Munster, de Breda, d'Aix la Chapelle & de la Triple Alliance, avec les Instructions données à Mr. Temple, au Comte de Carlingford & à Mr. van Beuning, & une Relation de la Mort de Madame. *in* 12.  
 l'Art de plaire dans la Conversation. *in* 12. N. Ed.

#### B.

- L** Es Batailles Memorables des François, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent. 2 voll. *in* 12.  
 Bellegarde (l'Abbé de) Reflexions sur le Ridicule. VI. Ed. augmentée. *in* 12.  
 La Sainte Bible traduite en François sur la vulgate avec des courtes Notes pour l'intelligence de la Lettre, par Mr. de Sacy. 8 voll. *in* 12.  
 Bouclier d'Etat & de Justice contre le dessein de la France qui aspire ouvertement à la Monarchie Universelle, sous le vain Prétexte des pretentions de la Reine de France, par le Baron de Lisle. *in* 12. N. Ed.

Brouss-

## CATALOGUE DES LIVRES.

*Bronsson* (Claude) Lettres & Opuscules , avec un Abregé de sa Vie. *in* 12.

### C.

**C**arré, de l'Académie des Sciences, Methode pour la Mesure des Surfaces, la dimension des Solides, &c. *in* 4. *Paris*.

les Cent Nouvelles. Avec des Fig. gravées sur les desseins de Romain de Hooge. 2 voll. *in* 8.

le Chrétien réel, ou la Vie du Marquis de Renty, servant d'Apologie à la Theologie Mystique. *in* 12.

*Le Clerc* (David) Histoire de la Medecine, 3 Parties. *in* 4.  
Conseils & Moyens très-assurez & faciles pour vivre plus de 100. Ans dans une parfaite santé. Traduit de l'Italien de Louis Carnaro Noble Venitien. *in* 12.

*Crasset* (le P.) Considerations Chrétiennes pour tous les jours de l'Année, avec les Evangiles de tous les Dimanches. N. Ed. mise en meilleur ordre, & augmentée d'un Abregé de la Vie & des Vertus de l'Auteur. 4 voll. *in* 12.

### D.

**D**ampier (Guillaume) Nouveau Voyage autour du Monde, enrichi de Cartes & de Figures, & traduit de l'Anglois. Seconde Ed. corrigée & augmentée d'un Volume, 3 voll. *in* 12.

— Idem le 3 Tome à part.

le Dictionnaire Imperial représentant les 4. Langues Principales de l'Europe, savoir I. L'Italienne expliquée par la Françoisé, l'Allemande & la Latine. II. La Françoisé expliquée par l'Italienne, l'Allemande & la Latine. III. L'Allemande expliquée par la Françoisé, l'Italienne & la Latine. IV. La Latine expliquée par l'Italienne, la Françoisé & l'Allemande. Ouvrage composé premierement par Veneroni, & augmenté par d'autres habiles Maîtres. *in* 4.

— de Marine contenant les Termes de la Navigation & de l'Architecture Navale, avec les Regles & Proportions qui y doivent être observées. Par Mr. *Aubin*. Enrichi de Figures. *in* 4.

— Universel de *Furetiere*. Seconde Edition augmentée par M. *Basnage de Bauval*. 3 voll. *in Folio*.

Difficultez proposées à M. *Steyart* Professeur de Louvain sur differens Sujets, en 9 Parties. *in* 8.

le Directeur Spirituel, pour ceux qui n'en ont point. *in* 12.

## CATALOGUE DES LIVRES

- Differtation Apologetique pour Robert d'Arbriffelles, Fondateur de l'ordre de Font-Evraud, sur ce qu'en a dit M. Bayle dans son Dictionnaire. *in 8.*  
*Drelincourt*, Sonnets Chrétiens sur divers sujets. Dern. Ed. à laquelle on a ajouté les Pseaumes Penitenciaux en vers Heroïques. *in 8.*

### E.

- E**sopé en belle humeur. N. Ed. divisée en 2 Tomes & augmentée de quelques Fables. *in 8. fig.*  
 l'Esprit d'Yves de Chartres dans la conduite de son Diocèse, & dans les Cours de France & de Rome. *in 12. Paris.*  
 l'Etat de la France. N. Edition. 3 voll. *in 12. Paris.*

### F.

- L**es Fables d'Esopé, illustrées de Discours Moraux Philosophiques & Politiques. N. Ed. augmentée par J. Baudoin. *in 12. avec fig.*  
*Fleury*, Precepteur du Duc de Vermandois, les Mœurs des Chrétiens. N. Ed. *in 12.*  
*Fontenelle*, Auteur de l'Histoire de l'Académie des Sciences, ses Oeuvres diverses. 3 voll. *in 8.*

### G.

- G**abillon (Auguste de) La Verité de la Religion Reformée. *in 12.*  
*Gautruche* (le P.) Histoire Poétique. Dern. Edition. *in 12.*  
 le Genie, la Politesse, l'Esprit & la Delicatesse de la Langue Française. Nouvelles Remarques, revues & approuvées par l'Académie Française, par l'Auteur de l'Eloquence du Témis. *in 12.*  
 Germaine de Foix Reine d'Espagne. Nouvelle Historique. *in 12.*

### H.

- H**istoire Abregée des Provinces-Unies des Pays-bas, où l'on voit leur Progrès, leurs conquêtes, leur gouvernement & celui de leurs Compagnies en Orient & en Occident, comme aussi les Hommes Illustres dans les Armes & les Savans dans les Lettres. Enrichie d'un grand Nombre de Figures. *in Folio.*  
 — de l'Isle de Ceylan, Traduite du Portugais par l'Abbé le Grand, enrichie de fig. en taille douce. *in 12.*

Hif-

# I M P R I M E Z B N 1701.

**Histoire des Flagellans**, où l'on fait voir le bon & le mauvais usage des Flagellations parmi les Chrétiens, traduite du Latin de l'Abbé Bolleau. *in 12.*

— de l'Origine du Royaume de Sicile & de Naples, contenant les Aventures & les Conquêtes des Princes Normands qui l'ont établi. 2 voll. *in 12. Paris.*

— de la Republique de Venise par Baptiste Nani Chevalier & Procureur de S. Marc. Seconde Partie. 2 voll. *in 12. Enrichie de figures en taille d'ouë.*

**L'Homme de Cour** de Baltazar Gracian. Traduit & commenté par M. Amelot de la Houslaye. V. Edit. *in 12.*

**Huet (P. D.) Evêque d'Avranches**, de l'Acad. Fr. **Traité de la situation du Paradis Terrestre.** VII. Bd. revue & augmentée. *in 8.*

## K.

**Kenisps Commun ou les quatre Livres de l'Imitation de J. C.** Nouv. Ed. *in 12.*

## L.

**L'Amberiti**, Memoires de la dernière Revolution d'Angleterre, contenant l'Abdication de Jaques II. l'Avènement du Roi Guillaume III. à la Couronne, & plusieurs choses arrivées sous son Regne. 2 voll. *in 12.*

**Lami (le P. Bernard)** **Traité de Perspective**, où sont contenus les fondemens de la Peinture. *in 8. Paris.*

**Lettre écrite de Cologne sur le Mémoire présenté à Mr. Vernon**, Secrétaire d'Etat du Roi d'Angleterre de la part de la France, par M. Poussin. *in 12.*

**Liger (Louis)** **Oeconomie générale de la Campagne ou Nouvelle Maison Rustique.** 2 voll. *in 4.*

## M.

**LA Maison Reglée & l'Art de diriger la Maison d'un Grand Seigneur.** III. Edition. *in 8.*

**Mallebranche (le P.)** **Traité de la Nature & de la Grâce.** dern. Ed. corrigée & augmentée, *in 12.*

**Maximes & Remarques Morales & Politiques.** *in 12.*

**Meditations Chrétiennes pour la Consolation & l'Instruction des Ames pieuses.** Traduites de l'Anglois du Docteur J. Gerard. *in 12.*

**Memoires de la Marquise de Fresne.** enrichis de figures. *in 12.*

— du Marquis de Montbrun, enrichis de figures. *in 12.*

## CATALOGUE DES LIVRES

Memoires du Duc de Navailles de la Valette, Maréchal de France & Gouverneur de Mr. le Duc de Chartres. *in 12.*  
*Meré* (le Chevalier de) ses Oeuvres Posthumes. *in 12.*  
 Moyens de Briller, dédier aux Troupes Auxiliaires des Pais-Bas, pour leur servir de Récréation. *in 12.*

### N.

**N**euville (Lequien de la) Histoire générale du Portugal. 2 voll. *in 4.* Paris.

Nicole, Instructions Theologiques & Morales sur les Sacremens. *in 12.*

Nodot, la Contre-Critique de Petrone, ou Réponse aux Observations sur les Fragmens trouvez à Belgrade en 1688.

— Relation de la Cour de Rome, où l'on voit le vrai caractère de cette Cour, & de quelle maniere on s'y conduit pour parvenir aux souverains honneurs. Ce qui concerne le Pape & sa Parenté. Ce qui s'observe à sa mort. Ce que c'est que le Conclave, sa construction, & ce qui se pratique avant & après sa clôture entre les Cardinaux Papables, les Chefs des factions, & les Ambassadeurs. Les trois manieres dont on procède à l'élection du Souverain Pontife. La visite des anciens Monumens de Rome, avec les inscriptions & les citations des Auteurs qui en ont parlé; & deux Cartes qui représentent l'Ancienne & la Nouvelle Rome. 2 voll. *in 12.* Paris.

— Histoire de Melusine & de ses Fils. 2 voll. *in 12.* Paris.

### P.

**L**E Païsan de Qualité, Nouvelle Galante. *in 12.*

Pelletier (J. le) Memoires pour le Retablissement du Commerce en France, redigez par ordre de Mrs. les Juges & Consuls de Rome pour être présentez à Nosseigneurs du Conseil de Commerce. *in 12.*

Pensées de Montagne propres à former l'Esprit & les Mœurs, seconde Edition considerablement augmentée. *in 12.*

— de M. Pascal. N. Ed. *in 12.*

le Philosophe Chretien, qui prouve combien sont certains & conformes aux lumieres du Bon Sens les premiers principes de la Religion & de la Morale de l'Evangile. *in 12.*

Piffet (B.) Professeur en Theologie à Geneve, la Theologie Chrétienne. 2 voll. *in 4.*



# I M P R I M E Z E N 1701.

*Pin* (Ellies du) Dissertation Preliminaires, ou Prolegomenes sur la Bible pour servir de supplement à la Bibliothèque des Auteurs Ecclesiastiques. 2 voll. *in* 4.

*Placette* (la) Morale Chrétienne Sec. Ed. augmentée par l'Auteur. *in* 12.

——— Traité du Serment divisé en deux Livres, où l'on trouvera la solution des cas de Conscience qui ont du rapport à cette matiere. *in* 12.

## R.

**R**eflexions sur la maniere d'instruire les petits Enfans. *in* 12.

Relation de la Cour de Portugal sous D. Pedre II. à présent regnant. Avec des Remarques sur les Intérêts de cette Couronne par rapport aux autres Souverains ; & l'Histoire des plus considerables Traitez, qu'elle ait faits avec eux. Traduite de l'Anglois. 2 voll. *in* 12.

——— des Societez établies ad Angleterre, & en Irlande pour la Reformation des Moeurs. *in* 8.

*Remi* (Saint) Memoires contenant ce qui s'est passé de plus memorable en France depuis l'Etablissement de la Monarchie jusqu'à présent. 2 voll. *in* 12.

*Renoult* (J. B.) ci devant Cordelier & à présent Ministre du S. Evangile, le vrai Tableau du Papisme. *in* 12.

*Roux* (N. le) Arithmeticien, le Thresor de l'Arithmetique. VI. Ed. *in* 12.

## S.

**S**aurin (Elie) Pasteur de l'Eglise Wallonne d'Utrecht, Traité de l'Amour de Dieu. 2 voll. *in* 8.

Sentimens Critiques sur les Caractères de M. de la Bruyere. *in* 12.

Sermons sur le Catechisme des Eglises Reformées, par M. Daillé. 3 voll. *in* 8.

——— sur divers Textes de l'Ecriture Sainte, par P. du Bosc. 3 voll. *in* 8.

——— par Daniel de Superville, Ministre de l'Eglise Wallonne de Rotterdam. 2 voll. *in* 8.

Le Sort de l'Honnête Homme & du Scelerat. 2 voll. *in* 12.

*Sursry* de S. Remi, Memoires d'Artillerie. 2 voll. *in* 4.

## T.

**T**Axe de la Chancellerie Romaine & la Banque du Pape. Traduite de l'ancienne Edit. Latine. Avec des Remarques. *in* 8. le

## CATALOGUE DES LIVRES.

le Theatre de P. & de Th. Corpeille. N. Ed. Augmentée des Pièces dont l'Avis au Lecteur fait mention & enrichie de figures en taille-douce. 10 vols. *in* 12.

— de M. de la Fontaine. *in* 12.

— Italien, ou Recueil général de toutes les Comedies ou Scenes Françaises jouées par les Comediens Italiens du Roi, pendant tout le temps qu'ils ont été au service de sa Majesté. Première Edit. sur la nouvelle de Paris, divisée en six Tomes, revue, augmentée & enrichie d'Estampes en taille-douce à la tête de chaque Comedie. *in* 12.

le Telemaque Moderne, ou les Intrigues d'un Grand Seigneur pendant son Exil. *in* 12.

Traité de l'Orthographe Française. *in* 12.

### V.

**V**allone, ci devant Chanoine de l'Abbaye Royale de Ste. Genevieve, & à présent Ministre du S. Evangile, sa Profession de Foi, précédée de l'Histoire de sa Conversion. *in* 8.

— Apologie pour les Reformez contre les Calomnies du Sr. Faerlin Ministre Lutherien, au sujet de la Prédestination. *in* 12.

Venete (Nicolas) Doyen des Medecins de la Rochelle, Traité des Pierres qui s'engendrent dans les Terres, dans les Animaux, où l'on parle exactement des causes qui les forment dans les hommes. *in* 12.

La Vie de Charles V. Duc de Lorraine. N. Ed. *in* 12.

Voyages Historiques de l'Europe. Tome VIII. qui traite du Gouvernement & de ce qu'il y a de plus curieux en Pologne & en Lithuanie, en Suede. en Danemarck, en Norwege & dans l'Isle d'Island, avec les Cartes de ces Royaumes. *in* 12.

### W.

**W**ernerus, le Saint Refugie, ou la Vie & la mort édifiantes de Wernerus mort en 1699. *in* 12.

### F I N.

